

表 5.26 悪性新生物の主要部位別にみた性・

Table 5.26 Trends of age-adjusted death rates (per 100,000 population) from

男 Male

Table with 9 columns: ICD-9 International detailed listcode, Causes of death, 1950 (昭和25年), 1955 (30年), 1960 (35年), 1965 (40年), 1970 (45年), 1975 (50年), 1977 (52年). Rows include categories like 悪性新生物, 口唇, 口腔及び咽頭, 消化器及び腹膜道, etc.

女 Female

Table with 9 columns: ICD-9 International detailed listcode, Causes of death, 1950 (昭和25年), 1955 (30年), 1960 (35年), 1965 (40年), 1970 (45年), 1975 (50年), 1977 (52年). Rows include categories like 悪性新生物, 口唇, 口腔及び咽頭, etc.

注: 1) 年齢調整死亡率の基準人口は, 昭和60年モデル人口である。なお, 計算方法は, 51ページ(3)死亡を参照されたい。 2) 結腸と直腸S状結腸移行部及び直腸を示す。但し, 昭和40年までは直腸肛門部を含む。

年次別年齢調整死亡率<sup>1)</sup> (人口10万対) malignant neoplasms by sex and site: Japan

男 Male

Table with 15 columns: 1978 (53年), 1979 (54年), 1980 (55年), 1981 (56年), 1982 (57年), 1983 (58年), 1984 (59年), 1985 (60年), 1986 (61年), 1987 (62年), 1988 (63年), 平成元年 (平均年), 1990 (2年), 1991 (3年), ICD-9 International detailed listcode. Rows include categories like 140~208, 140~149, etc.

女 Female

Table with 15 columns: 1978 (53年), 1979 (54年), 1980 (55年), 1981 (56年), 1982 (57年), 1983 (58年), 1984 (59年), 1985 (60年), 1986 (61年), 1987 (62年), 1988 (63年), 平成元年 (平均年), 1990 (2年), 1991 (3年), ICD-9 International detailed listcode. Rows include categories like 140~208, 140~149, etc.