

死 亡

表 5. 25 悪性新生物の主要部位¹⁾別にみた性・

Table 5. 25 Trends of death rates (per 100,000 population)

男(6-1) 29胃の悪性新生物

Male Malignant neoplasm of stomach

年 齢 Age	1950 昭和25年	1955 30年	1960 35年	1965 40年	1970 45年	1975 50年	1980 55年	1985 60年	1986 61年	1987 62年	1988 63年	1989 平成元年	1990 2年
総 数 Total	46.6	52.2	57.3	59.4	58.8	55.6	53.9	51.1	50.7	50.6	50.0	50.3	49.6
0~4歳 Years	0.1	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5~9	0.1	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10~14	0.2	—	0.0	0.0	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—
15~19	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2
20~24	0.7	0.7	1.1	1.6	1.4	1.3	0.7	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4
25~29	2.3	2.8	3.1	3.8	3.6	3.0	2.3	2.2	1.4	1.5	1.6	1.3	1.2
30~34	7.0	7.0	8.0	8.5	8.4	6.7	5.7	4.3	4.1	3.9	3.9	3.2	2.6
35~39	15.1	17.0	17.0	16.4	15.3	13.4	11.5	8.4	8.5	8.4	7.7	6.5	7.0
40~44	35.8	36.7	34.7	28.6	27.8	24.4	19.3	16.0	16.2	14.4	14.4	13.0	12.1
45~49	69.6	73.4	67.2	58.8	52.4	45.0	39.4	29.4	28.2	26.5	24.5	24.0	24.6
50~54	128.3	128.0	121.9	110.5	93.3	74.0	69.8	56.5	53.8	50.6	48.8	47.4	44.4
55~59	219.3	211.3	206.2	189.9	159.2	139.5	105.5	95.9	93.6	88.6	86.8	84.6	79.1
60~64	324.6	336.2	317.8	307.2	267.8	218.3	186.4	147.6	139.1	139.5	135.2	134.7	131.8
65~69	435.3	456.4	467.2	449.8	412.0	341.1	289.0	230.5	230.2	214.8	199.4	198.5	186.4
70~74	463.6	546.2	597.8	568.1	545.1	489.1	417.0	333.2	319.3	309.0	299.2	293.8	273.5
75~79	397.1	509.3	607.6	666.1	640.1	602.0	560.7	471.7	443.7	437.0	423.7	401.5	385.5
80~	260.6	330.9	449.9	499.2	539.0	607.6	607.1	607.5	586.0	591.4	568.5	570.3	550.0

女(8-1) 29胃の悪性新生物

Female Malignant neoplasm of stomach

年 齢 Age	1950 昭和25年	1955 30年	1960 35年	1965 40年	1970 45年	1975 50年	1980 55年	1985 60年	1986 61年	1987 62年	1988 63年	1989 平成元年	1990 2年
総 数 Total	28.8	31.7	34.6	35.5	36.7	34.4	33.2	30.6	29.5	29.3	29.0	28.8	28.1
0~4歳 Years	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5~9	0.1	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10~14	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—
15~19	0.2	0.2	0.2	0.2	0.5	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0
20~24	1.0	1.0	1.3	1.4	1.6	1.4	1.1	0.5	0.5	0.9	0.6	0.4	0.6
25~29	3.4	3.1	3.7	4.7	5.2	4.6	4.0	3.2	2.7	2.4	2.3	2.1	1.9
30~34	8.5	8.7	10.3	10.5	9.2	10.1	8.1	6.5	6.1	4.5	5.1	4.6	4.7
35~39	15.5	17.7	18.2	17.9	16.0	15.0	13.5	10.6	10.6	10.8	10.0	11.0	8.7
40~44	29.7	29.9	31.2	26.5	25.7	21.4	17.9	15.2	14.3	15.3	14.0	13.7	12.8
45~49	45.4	44.0	45.0	42.2	37.8	31.2	24.8	21.0	20.9	18.8	17.8	16.8	15.8
50~54	69.8	69.3	64.7	63.9	53.9	45.1	35.6	28.1	27.8	26.1	24.0	24.6	23.0
55~59	108.7	104.8	96.7	88.6	82.5	64.0	52.9	39.8	37.6	36.5	34.7	33.7	30.0
60~64	158.3	153.6	142.1	128.9	119.6	97.2	80.9	63.2	53.8	52.7	51.1	46.7	45.2
65~69	219.4	223.0	208.7	192.9	177.0	145.6	116.5	88.4	80.4	75.3	74.4	71.2	68.6
70~74	235.0	264.2	282.8	275.0	253.0	211.3	173.9	132.2	124.8	119.4	109.1	106.2	98.1
75~79	229.4	284.1	321.3	316.1	317.2	279.0	250.9	199.2	174.2	170.7	162.4	157.1	150.0
80~	160.0	228.3	286.5	286.1	300.1	297.9	302.7	285.0	279.4	270.7	272.0	262.2	254.5

注: 1) 表頭の死因名等は, 第9回簡単分類による。

Death

年齢・年次別死亡率(人口10万対)

from malignant neoplasms by sex, age and site: Japan

男(6-2) 30直腸, 直腸S状結腸移行部及び肛門の悪性新生物

Male Malignant neoplasms of rectum, rectosigmoid junction and anus

年 齢 Age	1950 昭和25年	1955 30年	1960 35年	1965 40年	1970 45年	1975 50年	1980 55年	1985 60年	1986 61年	1987 62年	1988 63年	1989 平成元年	1990 2年
総 数 Total	2.9	3.1	3.2	4.1	5.0	5.8	6.9	7.9	8.0	8.2	8.5	8.9	9.2
0~4歳 Years	—	0.0	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5~9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10~14	—	0.0	—	0.0	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—
15~19	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	—	—	0.0	0.0	0.1	0.0
20~24	0.1	0.1	0.2	0.6	0.4	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
25~29	0.6	0.3	0.1	0.5	1.1	0.6	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1
30~34	0.8	0.6	0.7	0.9	1.2	1.5	0.9	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.6
35~39	1.3	1.2	0.6	1.0	2.1	2.2	2.1	1.6	1.5	1.4	1.6	1.3	1.4
40~44	1.9	2.3	2.0	1.9	2.8	3.2	3.6	3.3	3.2	2.8	2.6	2.9	2.9
45~49	4.8	3.8	2.7	4.2	4.4	4.9	6.0	5.5	6.4	5.9	5.2	5.5	5.9
50~54	7.0	4.9	4.9	6.4	7.1	6.4	9.2	10.3	10.4	10.3	10.4	10.4	10.4
55~59	11.5	9.6	8.9	10.7	12.0	12.2	12.0	16.2	15.9	16.1	16.9	18.0	17.3
60~64	17.8	17.2	17.4	17.7	19.2	19.9	19.9	21.1	21.9	24.0	24.5	26.2	25.1
65~69	25.0	25.8	23.6	29.3	30.5	32.2	32.4	31.7	30.1	32.1	30.6	30.4	33.5
70~74	34.4	39.2	41.1	39.5	44.1	47.2	51.9	46.9	46.1	43.1	46.2	48.0	44.5
75~79	38.5	46.2	44.6	52.9	59.5	65.6	69.6	68.5	60.4	61.5	57.4	59.2	60.2
80~	19.3	37.0	46.5	67.5	69.4	79.8	94.2	94.7	95.4	91.6	96.5	94.7	99.1

女(8-2) 30直腸, 直腸S状結腸移行部及び肛門の悪性新生物

Female Malignant neoplasms of rectum, rectosigmoid junction and anus

年 齢 Age	1950 昭和25年	1955 30年	1960 35年	1965 40年	1970 45年	1975 50年	1980 55年	1985 60年	1986 61年	1987 62年	1988 63年	1989 平成元年	1990 2年
総 数 Total	2.5	2.8	3.2	3.6	4.1	4.9	5.0	5.4	5.6	5.6	5.8	5.9	5.9
0~4歳 Years	0.0	0.0	0.0	—	0.0	—	—	0.0	—	—	—	—	—
5~9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10~14	—	—	0.0	0.0	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—
15~19	—	0.1	0.1	—	0.0	—	0.0	—	—	0.0	0.1	0.0	—
20~24	0.1	0.2	0.1	0.4	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0
25~29	0.4	0.3	0.3	0.6	0.9	0.4	0.3	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	0.1
30~34	1.0	0.3	0.5	0.9	1.3	1.3	0.8	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5
35~39	1.7	1.1	1.1	1.2	1.6	2.0	1.7	0.9	1.3	0.9	1.2	0.8	1.0
40~44	3.0	2.9	2.0	2.3	2.3	2.6	2.8	2.4	2.6	2.2	2.1	2.0	1.6
45~49	4.5	3.5	4.0	3.9	3.3	4.3	4.0	4.0	3.9	3.3	4.1	4.2	4.3
50~54	6.9	6.7	6.0	5.6	7.0	6.1	6.0	5.9	6.0	5.8	6.4	5.8	6.5
55~59	10.2	10.1	9.6	9.2	8.3	9.6	7.9	8.1	7.9	8.7	8.3	9.2	8.2
60~64	12.6	13.5	13.3	11.6	11.9	12.3	11.4	11.3	11.6	11.5	11.1	11.5	11.3
65~69	18.2	17.1	18.5	19.9	19.4	18.8	15.8	15.7	17.3	16.5	15.9	14.1	14.7
70~74	18.6	21.8	29.0	28.5	27.1	30.8	26.5	23.8	21.5	20.5	21.1	22.5	20.2
75~79	15.3	27.2	33.7	36.5	41.8	41.0	40.8	33.1	31.9	33.0	30.0	29.2	29.5
80~	15.8	23.0	28.1	37.1	42.4	53.3	53.6	51.7	51.9	52.0	51.4	51.1	49.6

表 5. 25 悪性新生物の主要部位¹⁾別にみた性・

Table 5. 25 Trends of death rates (per 100,000 population)

男 (6-3) 31肝の悪性新生物
Male Malignant neoplasm of liver

年 齢 Age	1950 昭和25年 ¹⁾	1955 30年 ²⁾	1960 35年	1965 40年	1970 45年	1975 50年	1980 55年	1985 60年	1986 61年	1987 62年	1988 63年	1989 平成元年	1990 2年
総 数 Total	8.8	11.1	11.3	10.4	11.7	12.4	17.5	24.2	25.4	27.1	27.9	29.3	30.5
0~4歳 Years	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3	0.2
5~9	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	—
10~14	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	—	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
15~19	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
20~24	0.2	0.2	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
25~29	0.3	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.6	0.3	0.2
30~34	1.4	1.4	1.1	0.9	0.9	1.4	1.3	1.1	0.9	1.1	1.3	1.0	0.7
35~39	2.5	3.7	2.4	2.8	3.1	2.6	3.1	3.7	3.4	3.6	3.1	2.9	2.8
40~44	7.4	7.7	6.3	6.3	6.5	6.9	6.5	7.5	7.6	7.3	7.2	7.3	7.4
45~49	13.4	16.1	12.5	13.1	12.5	13.5	21.0	18.1	15.7	15.6	14.8	14.8	15.6
50~54	27.0	28.7	28.6	20.5	23.7	23.4	38.1	51.7	50.7	47.1	43.1	40.7	35.4
55~59	38.9	43.1	42.6	33.0	37.4	38.9	51.5	74.0	80.5	88.3	91.2	91.4	95.7
60~64	61.6	69.7	64.1	53.3	51.0	51.0	72.0	90.1	91.0	98.5	100.9	110.5	117.6
65~69	79.8	94.6	83.9	71.7	77.2	74.1	82.4	101.4	109.3	113.3	116.2	118.7	121.6
70~74	79.6	114.7	115.3	90.0	94.5	92.3	110.4	121.7	121.7	132.0	133.4	135.5	133.5
75~79	84.4	110.8	127.2	114.9	115.5	101.0	118.8	145.6	146.3	144.5	148.3	154.4	147.6
80~	51.5	89.1	84.7	112.7	111.7	111.7	129.2	154.7	156.9	159.6	162.9	165.3	171.4

女 (8-3) 31肝の悪性新生物
Female Malignant neoplasm of liver

年 齢 Age	1950 昭和25年 ¹⁾	1955 30年 ²⁾	1960 35年	1965 40年	1970 45年	1975 50年	1980 55年	1985 60年	1986 61年	1987 62年	1988 63年	1989 平成元年	1990 2年
総 数 Total	6.1	8.1	7.6	7.0	6.9	6.7	7.6	9.1	9.2	9.7	10.0	10.4	11.1
0~4歳 Years	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2
5~9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0
10~14	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
15~19	—	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	—
20~24	0.1	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1
25~29	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2
30~34	1.0	1.3	0.7	0.9	0.7	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4
35~39	1.5	2.4	2.0	1.5	1.3	1.2	1.1	0.7	0.7	0.4	0.6	0.6	0.6
40~44	4.8	5.6	4.3	3.0	2.7	2.4	2.1	1.6	1.5	1.6	1.2	1.3	1.0
45~49	8.2	10.5	7.9	6.5	5.3	4.5	3.6	3.5	2.6	2.5	2.9	2.4	2.3
50~54	15.9	18.0	13.1	11.0	9.4	7.8	6.5	6.8	6.5	6.3	5.6	5.8	5.3
55~59	23.2	26.5	20.8	18.0	15.7	13.1	13.0	13.9	14.2	13.5	12.7	14.3	13.5
60~64	37.6	43.3	36.7	28.3	24.0	20.9	20.4	23.9	22.2	22.8	23.4	22.6	25.2
65~69	47.1	60.6	49.8	45.4	37.5	32.9	31.9	33.0	36.0	33.8	37.2	36.7	38.4
70~74	52.1	76.9	70.0	57.5	54.0	47.5	47.9	47.2	44.8	50.3	50.4	50.0	51.9
75~79	56.9	78.5	80.3	74.8	71.6	59.6	63.7	65.9	59.4	61.9	62.4	61.0	62.8
80~	37.7	56.3	69.4	60.5	61.1	62.4	69.7	76.7	80.0	80.2	78.8	81.2	87.8

注: 1) 260ページの同番号の注を参照されたい。
2) 31肝の昭和25, 30年は、「胆路および肝臓」である。

年齢・年次別死亡率 (人口10万対) (つづき)

from malignant neoplasms by sex, age and site: Japan-con.

男 (6-4) 32膵の悪性新生物
Male Malignant neoplasm of pancreas

年 齢 Age	1950 昭和25年	1955 30年	1960 35年	1965 40年	1970 45年	1975 50年	1980 55年	1985 60年	1986 61年	1987 62年	1988 63年	1989 平成元年	1990 2年
総 数 Total	0.8	1.4	2.5	3.6	5.1	5.8	7.8	10.1	10.6	11.4	11.5	12.1	12.1
0~4歳 Years	—	0.0	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—
5~9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10~14	0.0	—	—	—	0.1	0.0	—	—	—	—	—	—	—
15~19	—	—	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	—	—
20~24	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	—	0.0	0.0	0.1	0.0
25~29	—	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.0
30~34	0.3	0.3	0.3	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.7	0.3
35~39	0.6	0.6	0.9	0.9	1.4	1.1	1.4	0.9	1.1	1.4	0.9	0.9	1.3
40~44	1.4	1.5	1.9	1.9	2.4	2.2	3.1	2.8	3.2	2.7	2.8	2.8	2.8
45~49	1.7	2.3	4.4	4.5	4.2	5.2	6.1	6.3	5.7	5.7	5.6	5.6	6.3
50~54	2.7	5.0	6.6	9.1	10.1	9.7	10.9	11.5	10.0	10.7	10.6	11.6	11.0
55~59	4.7	7.0	11.1	13.4	18.2	17.0	19.1	20.8	20.2	20.8	19.7	20.0	18.5
60~64	6.2	9.3	13.9	20.6	25.7	26.6	32.3	32.1	32.3	33.3	32.1	34.0	33.0
65~69	4.0	11.8	20.4	25.5	36.9	38.8	45.2	51.4	52.8	54.5	52.3	50.9	49.0
70~74	3.7	9.9	17.3	30.2	42.6	47.6	57.6	70.1	71.9	75.7	71.0	75.0	71.5
75~79	1.5	5.6	19.6	28.5	35.2	52.0	71.2	91.0	93.3	99.1	99.7	95.7	99.5
80~	2.4	2.3	8.9	20.3	32.0	38.9	64.1	92.8	103.4	115.0	123.3	124.0	119.0

女 (8-4) 32膵の悪性新生物
Female Malignant neoplasm of pancreas

年 齢 Age	1950 昭和25年	1955 30年	1960 35年	1965 40年	1970 45年	1975 50年	1980 55年	1985 60年	1986 61年	1987 62年	1988 63年	1989 平成元年	1990 2年
総 数 Total	0.5	1.1	1.7	2.6	3.5	4.4	5.7	7.3	8.0	8.4	9.1	9.2	9.6
0~4歳 Years	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5~9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10~14	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15~19	—	—	0.0	0.0	—	0.0	0.0	—	0.0	0.0	—	0.0	0.0
20~24	0.1	—	0.0	0.0	0.1	0.1	—	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
25~29	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	—	0.1	0.1	0.1
30~34	0.2	0.2	0.4	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3	0.1	0.3	0.3	0.3	0.4
35~39	0.3	0.7	0.4	0.5	0.8	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.7	0.8	1.0
40~44	0.6	1.5	1.3	1.7	1.5	1.4	1.3	1.6	1.4	1.2	1.2	1.2	1.2
45~49	1.0	1.8	2.6	3.0	2.9	3.5	3.0	3.0	2.7	3.0	2.8	2.6	2.8
50~54	1.1	2.6	5.0	5.3	5.9	6.6	5.9	5.0	4.7	5.2	5.6	5.3	5.0
55~59	3.0	5.0	7.4	10.3	9.4	10.0	9.3	9.4	9.6	9.9	9.5	9.8	9.7
60~64	3.3	5.4	8.2	14.0	15.6	15.5	17.7	17.2	17.4	17.0	16.3	16.0	16.1
65~69	2.4	8.1	12.7	17.2	21.2	23.2	26.7	26.1	26.4	27.7	27.1	26.4	27.5
70~74	1.6	5.8	11.6	15.9	27.2	31.0	40.3	43.6	43.4	42.7	43.8	45.1	42.2
75~79	1.4	5.1	9.5	18.5	26.9	36.6	42.1	55.6	57.7	61.7	67.2	62.3	63.3
80~	1.2	2.9	5.4	9.5	15.1	24.6	39.6	60.6	76.0	75.7	87.0	85.7	88.6

表 5. 25 悪性新生物の主要部位¹⁾別にみた性・

Table 5. 25 Trends of death rates (per 100,000 population)

男 (6-5) 33気管, 気管支及び肺の悪性新生物
Male Malignant neoplasms of trachea, bronchus and lung

年 齢 Age	1950 昭和25年	1955 30年	1960 35年	1965 40年	1970 45年	1975 50年	1980 55年	1985 60年	1986 61年	1987 62年	1988 63年	1989 平成元年	1990 2年
総 数 Total	1.9	4.3	7.9	11.2	14.9	19.6	27.0	35.3	36.1	38.7	40.6	43.0	44.6
0~4歳 Years	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	0.1	—
5~9	—	—	0.0	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—
10~14	0.1	0.1	—	0.1	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—
15~19	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
20~24	0.1	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1
25~29	0.2	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.5	0.2	0.4
30~34	0.1	0.5	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	1.1	0.8	0.9	1.4	1.0
35~39	0.4	0.8	1.1	1.8	1.6	1.9	2.5	2.9	2.8	3.0	2.7	3.0	3.3
40~44	0.9	2.0	2.7	3.6	4.6	4.9	5.0	6.1	5.7	6.1	6.2	6.5	6.8
45~49	2.1	4.9	7.7	8.5	8.5	11.4	11.2	11.1	11.2	10.4	10.8	12.2	12.9
50~54	4.9	10.1	15.8	18.7	20.2	20.8	26.4	25.2	24.3	23.8	22.5	23.6	23.0
55~59	7.7	15.5	30.5	32.0	40.9	43.9	48.8	53.6	54.5	58.0	55.9	55.5	53.4
60~64	13.7	29.5	46.5	66.3	72.1	79.7	96.0	98.8	97.3	104.0	105.8	108.6	113.0
65~69	21.9	43.2	71.4	93.1	125.9	139.4	157.2	179.1	176.6	179.3	183.5	194.9	190.2
70~74	20.4	51.5	86.9	118.5	156.5	210.5	252.7	284.5	280.7	290.0	299.2	305.9	300.3
75~79	21.3	36.3	81.8	126.1	158.0	238.3	329.1	403.1	384.4	406.8	410.4	417.5	419.7
80~	7.2	24.3	55.9	87.0	112.0	173.4	298.3	422.3	436.9	463.0	489.2	499.0	509.1

女 (8-5) 33気管, 気管支及び肺の悪性新生物
Female Malignant neoplasms of trachea, bronchus and lung

年 齢 Age	1950 昭和25年	1955 30年	1960 35年	1965 40年	1970 45年	1975 50年	1980 55年	1985 60年	1986 61年	1987 62年	1988 63年	1989 平成元年	1990 2年
総 数 Total	0.8	1.8	3.2	4.6	5.7	7.2	9.9	12.7	13.1	13.9	14.6	15.4	15.4
0~4歳 Years	—	0.0	0.0	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	—
5~9	—	0.1	0.0	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—
10~14	0.1	0.0	0.0	—	0.0	—	—	—	—	—	0.0	—	—
15~19	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	—	0.0	0.0	0.0	—	—	0.0
20~24	0.0	0.1	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.2	—
25~29	0.1	0.2	0.1	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2
30~34	0.2	0.6	0.8	0.9	0.8	0.7	0.8	0.4	0.7	0.8	0.9	0.8	0.7
35~39	0.4	1.1	1.3	1.8	1.2	1.7	1.7	1.8	2.1	1.9	1.9	1.7	2.0
40~44	0.8	1.9	1.8	2.7	2.9	2.4	2.9	3.3	3.5	3.6	3.5	3.4	3.1
45~49	1.1	3.0	4.9	3.9	5.2	5.4	5.1	5.3	5.4	5.4	5.4	6.1	5.7
50~54	2.7	4.4	6.4	9.3	8.0	9.4	9.6	9.4	9.9	9.7	10.7	10.3	10.4
55~59	3.6	6.6	10.5	14.1	14.2	15.9	15.9	16.4	15.7	16.5	16.9	17.4	15.7
60~64	4.1	9.4	16.7	20.7	24.7	23.3	27.4	28.0	25.2	25.9	25.9	25.7	25.3
65~69	5.0	13.2	22.1	27.8	32.4	35.8	42.1	43.6	44.8	44.9	45.9	42.7	42.7
70~74	5.9	14.1	23.3	35.9	41.1	51.1	63.7	66.1	69.4	68.3	69.6	69.0	69.3
75~79	4.5	9.4	25.4	41.8	46.1	58.5	84.4	96.8	95.0	98.3	99.5	103.3	99.6
80~	2.8	5.9	18.6	26.7	40.1	53.8	82.6	116.7	115.9	124.1	126.1	140.6	132.0

注: 1) 260ページの同番号の注を参照されたい。

年齢・年次別死亡率 (人口10万対) (つづき)

from malignant neoplasms by sex, age and site: Japan-con.

男 (6-6) 36白血 病
Male Leukaemia

年 齢 Age	1950 昭和25年	1955 30年	1960 35年	1965 40年	1970 45年	1975 50年	1980 55年	1985 60年	1986 61年	1987 62年	1988 63年	1989 平成元年	1990 2年
総 数 Total	1.8	2.8	3.2	3.7	4.0	4.2	4.6	5.1	5.2	5.6	5.4	5.6	5.4
0~4歳 Years	2.4	4.1	4.5	4.4	4.6	3.9	2.8	1.3	1.7	1.8	1.2	1.7	1.4
5~9	1.5	2.8	2.9	3.7	3.5	3.5	3.3	2.6	2.5	2.1	1.9	1.9	1.4
10~14	1.5	2.3	2.8	3.0	2.3	2.3	2.6	2.2	2.2	2.2	1.8	1.7	2.0
15~19	1.7	2.5	2.8	3.3	3.2	2.8	2.5	2.7	1.8	2.1	2.0	2.3	2.2
20~24	1.2	2.1	2.4	2.7	2.4	2.6	2.0	2.2	1.7	2.0	1.8	2.0	2.3
25~29	1.3	2.3	2.2	2.6	2.7	2.4	2.8	2.1	2.3	2.4	2.1	2.5	2.1
30~34	1.7	2.2	2.4	2.4	2.9	3.4	2.8	2.3	2.9	2.1	2.7	2.7	2.2
35~39	1.7	2.6	2.5	3.2	3.4	3.5	3.5	3.4	3.2	3.7	2.9	3.5	3.1
40~44	1.9	3.4	3.5	3.0	3.9	4.0	4.0	3.8	3.8	3.8	3.5	3.9	3.5
45~49	2.1	3.0	3.7	4.6	5.1	4.9	4.9	4.8	4.3	4.9	4.9	4.7	4.3
50~54	2.3	2.8	4.0	4.9	5.1	5.6	5.7	5.8	6.8	6.8	6.8	6.3	6.0
55~59	1.9	3.3	5.4	5.2	6.2	6.4	7.1	7.5	8.9	8.8	9.0	9.0	8.3
60~64	2.5	3.2	4.6	7.1	7.5	8.5	8.4	10.2	12.1	12.0	10.5	11.7	11.9
65~69	2.0	3.0	5.0	7.0	9.0	10.2	12.5	14.6	16.9	16.1	15.7	15.3	13.2
70~74	0.7	2.9	5.6	5.2	9.7	11.7	16.8	20.4	20.6	21.9	21.6	20.7	18.2
75~79	1.9	1.8	3.2	5.1	8.0	13.1	19.6	25.8	23.0	27.4	28.3	26.8	24.5
80~	0.8	0.6	3.5	2.3	3.9	9.3	20.1	25.1	26.6	28.3	29.8	31.6	32.4

女 (8-6) 36白血 病
Female Leukaemia

年 齢 Age	1950 昭和25年	1955 30年	1960 35年	1965 40年	1970 45年	1975 50年	1980 55年	1985 60年	1986 61年	1987 62年	1988 63年	1989 平成元年	1990 2年
総 数 Total	1.2	1.8	2.4	2.8	3.0	3.3	3.3	3.6	3.7	3.7	3.8	3.8	3.9
0~4歳 Years	2.0	2.7	3.7	3.5	3.6	3.1	2.0	1.4	1.5	1.4	1.5	1.2	1.4
5~9	1.0	1.8	2.2	2.7	2.8	2.7	2.3	1.7	1.5	1.3	1.5	1.4	1.4
10~14	1.1	1.8	2.1	2.4	2.3	1.9	1.9	1.6	1.7	1.6	1.6	1.8	1.2
15~19	1.0	1.4	2.0	2.6	2.3	2.2	2.2	1.7	1.4	1.7	1.7	1.5	1.2
20~24	1.0	1.4	2.1	1.8	2.0	2.0	1.7	1.3	1.3	1.4	1.7	1.4	1.2
25~29	1.1	1.9	1.7	2.0	1.8	2.1	1.5	1.5	1.6	1.5	1.4	1.3	1.3
30~34	0.7	1.2	2.6	2.1	1.6	2.5	2.2	1.9	1.7	1.8	1.5	1.5	1.6
35~39	1.3	1.7	2.4	2.8	2.7	2.4	2.5	2.3	2.0	1.8	2.2	2.2	2.5
40~44	1.0	2.3	2.6	2.9	3.0	3.1	3.4	3.0	2.8	2.7	2.8	2.5	2.6
45~49	1.5	2.2	3.3	3.3	4.2	3.5	3.3	3.6	4.3	3.2	2.9	3.2	3.7
50~54	1.6	1.9	2.3	3.7	2.9	4.1	4.5	4.7	4.1	4.3	4.8	4.2	4.3
55~59	1.2	2.3	2.9	4.1	5.6	5.6	4.3	5.4	4.7	5.3	4.9	5.2	5.6
60~64	1.4	1.9	2.9	4.6	5.1	5.4	6.0	6.4	6.6	6.2	7.1	6.6	6.5
65~69	1.1	1.7	3.3	3.8	5.2	6.8	7.1	7.6	8.6	8.2	8.3	8.6	8.2
70~74	0.8	1.3	1.8	3.3	5.5	6.4	8.4	9.9	11.7	12.3	10.1	12.3	10.6
75~79	—	0.4	2.2	3.1	2.6	8.6	9.4	12.9	13.0	13.7	13.9	13.8	12.0
80~	—	—	0.7	0.8	2.3	4.3	7.8	12.3	15.0	15.5	14.4	13.4	16.2

表 5. 25 悪性新生物の主要部位¹⁾別にみた性・
Table 5. 25 Trends of death rates (per 100,000 population)

女 (8-7) 34乳房の悪性新生物
Female Malignant neoplasm of breast

年 齢 Age	1950 昭和25年	1955 30年	1960 35年	1965 40年	1970 45年	1975 50年	1980 55年	1985 60年	1986 61年	1987 62年	1988 63年	1989 平成元年	1990 2年
総 数 Total	3.3	3.5	3.5	3.9	4.8	5.8	7.0	8.0	8.3	8.5	9.0	9.2	9.4
0~4歳 Years	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5~9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10~14	—	0.0	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—
15~19	—	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	—	0.0	—	0.0	—
20~24	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0
25~29	0.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	1.0	0.8	0.8	0.5	0.8	0.6	0.8
30~34	1.8	1.8	1.6	1.7	2.0	2.3	2.5	3.0	2.8	2.4	2.7	2.9	2.6
35~39	3.6	4.3	4.1	4.0	4.2	4.6	5.5	5.5	5.7	5.8	6.3	6.9	6.4
40~44	7.0	6.4	6.4	6.8	7.3	8.6	8.6	9.5	10.1	9.5	10.7	10.2	10.8
45~49	9.0	8.7	9.5	9.4	10.7	12.3	13.3	13.1	14.6	14.3	15.1	14.5	15.8
50~54	10.9	10.1	9.6	12.6	13.1	17.1	17.2	18.0	18.2	18.1	19.0	20.6	19.2
55~59	13.6	11.6	11.5	12.6	14.3	16.4	19.9	20.7	20.3	21.2	23.0	22.1	22.5
60~64	15.2	13.6	10.3	11.9	14.0	15.8	17.2	19.9	21.2	21.9	20.3	21.0	20.2
65~69	15.0	14.7	11.9	12.9	12.6	14.6	18.2	19.1	18.5	19.3	18.5	19.6	19.6
70~74	14.8	16.9	15.6	12.6	15.2	14.8	18.0	19.7	17.7	18.3	19.7	18.8	20.1
75~79	17.0	18.4	17.8	12.7	14.2	15.4	18.2	18.0	19.3	16.5	19.1	20.1	18.5
80~	15.4	19.5	23.6	18.2	25.5	20.3	21.2	21.9	22.1	22.6	23.2	21.4	21.8

注：1) 260ページの同番号の注を参照されたい。

年齢・年次別死亡率 (人口10万対) (つづき)
from malignant neoplasms by sex, age and site: Japan-con.

女 (8-8) 35子宮の悪性新生物
Female Malignant neoplasm of uterus

年 齢 Age	1950 昭和25年	1955 30年	1960 35年	1965 40年	1970 45年	1975 50年	1980 55年	1985 60年	1986 61年	1987 62年	1988 63年	1989 平成元年	1990 2年
総 数 Total	19.7	16.0	14.9	13.4	12.2	10.7	9.2	8.0	7.7	7.5	7.6	7.4	7.4
0~4歳 Years	0.0	0.0	0.0	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—
5~9	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10~14	—	0.1	—	0.1	—	—	—	0.0	0.0	—	—	—	—
15~19	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	—	—	0.0	0.0	0.0	—	0.0	—
20~24	0.8	0.5	0.8	0.6	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3
25~29	3.0	2.3	2.3	1.7	1.2	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5
30~34	8.8	5.1	4.5	3.8	2.6	1.7	1.1	1.3	1.2	1.1	1.3	1.1	1.0
35~39	23.5	12.4	9.9	7.3	5.6	2.9	2.2	1.9	2.1	2.3	2.2	1.8	2.4
40~44	43.8	27.0	19.0	13.7	12.0	7.1	4.7	3.9	3.6	3.3	3.2	3.5	3.2
45~49	62.7	43.7	34.5	23.5	19.6	14.8	9.5	7.1	6.3	5.6	5.9	5.7	5.4
50~54	76.8	58.8	46.9	36.5	26.7	22.1	14.9	10.9	9.5	9.4	9.3	8.6	7.9
55~59	80.3	65.6	55.7	46.6	37.1	28.7	21.0	14.2	15.8	14.2	12.6	12.5	12.3
60~64	84.1	70.2	64.7	57.0	49.6	36.9	27.8	20.6	17.6	18.1	17.3	17.1	14.3
65~69	85.5	71.9	68.0	63.3	53.1	47.5	35.7	26.8	23.5	21.4	19.8	20.2	20.0
70~74	72.2	79.9	71.9	65.5	61.6	57.0	43.8	32.7	30.8	28.9	27.3	26.1	25.2
75~79	53.6	65.8	71.6	70.2	61.5	59.5	54.2	42.2	41.4	35.9	40.9	33.8	34.1
80~	44.2	47.2	49.4	57.0	55.4	55.1	60.7	54.7	49.7	48.6	51.4	49.9	49.0