

表3 年次・死因 (B分類)・性別

Table 3 Trends of deaths and death rates (per 100,000 population) by sex and causes

総数

国際50項目 死因分類番号	死 因 ¹⁾	死 亡 数							
		昭和25年	30年	35年	40年	45年	50年	51年	52年
	総 数	904 876	693 523	706 599	700 438	712 962	702 275	703 270	690 074
B 1	コ レ ラ	-	-	-	-	-	-	-	1
B 2	腸 チ フ ス	630	105	39	9	3	1	3	4
B 3	細菌性赤痢およびアメーバ症	11 968	6 042	2 048	270	51	6	6	11
B 4	腸炎およびその他の下痢性疾患	53 142	20 030	13 203	7 255	4 691	3 059	2 564	2 400
B 5	呼吸器系の結核	101 355	40 115	29 176	21 033	15 132	10 100	9 137	8 419
B 6	その他の結核	20 414	6 620	2 783	1 333	767	467	441	384
B 7	ペ ス ト	-	-	-	-	-	-	-	-
B 8	ジ フ テ リ ア	1 182	913	497	39	6	5	2	2
B 9	百日咳	8 426	401	65	22	5	5	20	20
B10	レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	35	62	23	14	3	2	1	-
B11	髄膜炎菌感染症	367	161	112	50	18	10	11	13
B12	急性灰白髄炎	775	314	317	28	11	3	-	-
B13	痘 瘡	2	-	-	-	-	-	-	-
B14	麻疹	3 745	2 258	1 346	598	556	232	268	138
B15	チフスおよびその他のリケッチア症	105	24	9	1	1	-	-	1
B16	マ ラ リ ア	73	20	10	3	4	1	2	3
B17	梅毒および続発症	5 176	2 882	2 068	1 611	660	348	310	230
B18	その他の伝染病および寄生虫病	14 442	7 228	4 536	3 025	2 255	2 566	2 563	2 630
B18.a	癩	90	21	7	-	-	1	-	1
B18.b	破 傷 風	1 558	887	605	384	160	85	82	79
B18.c	敗 血 症	2 098	1 413	1 051	759	727	719	738	802
B18.d	日 本 脳 炎	2 430	1 373	650	658	167	25	19	9
B18.e	伝 染 性 肝 炎	543	582	367	175	479	1 022	966	1 040
B18.f	カ ン ジ ダ 症	83	70	62	33	35	39
B18.g	日本住血吸虫症	81	80	41	27	16	19	9	14
B18.h	糸 状 虫 症	59	54	44	33	14	8	8	8
B18.i	そ の 他	1 688	919	630	654	706	638
B19	悪 性 新 生 物	64 428	77 721	93 773	106 536	119 977	136 383	140 893	145 772
B19.a	食道の悪性新生物	2 763	2 973	3 467	3 958	4 823	4 997	5 090	5 241
B19.b	胃の悪性新生物	31 211	37 306	42 750	46 385	48 823	49 857	50 092	50 132
B19.c	肝臓の悪性新生物 ²⁾	6 179	8 577	8 817	8 503	9 516	10 588	11 492	11 999
B19.d	膵臓の悪性新生物	526	1 102	1 975	3 066	4 399	5 635	5 929	6 345
B19.e	気管、気管支および肺の悪性新生物	1 119	2 711	5 171	7 725	10 489	14 759	15 869	17 235
B19.f	乳房の悪性新生物	1 448	1 589	1 703	1 995	2 509	3 289	3 369	3 609
B19.g	子宮の悪性新生物	8 356	7 289	7 068	6 689	6 373	6 075	5 879	5 694

注: 1) 死因は第8回B分類による。
昭和42年以前については概略的に計上したものであるので留意されたい。なお、内容を合計しても総数にはあわない。
2) 昭和25年、30年のB19.cは胆膵も含む。

死亡数・率 (人口10万対)

of death (the 50 rubrics list for tabulation of mortality : B list) : Japan

53年	死 亡 率								
	昭和25年	30年	35年	40年	45年	50年	51年	52年	53年
695 821	1 087.6	776.8	756.4	712.7	691.4	631.2	625.6	608.0	607.6
1	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
1	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	14.4	6.8	2.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2 317	63.9	22.4	14.1	7.4	4.5	2.7	2.3	2.1	2.0
7 917	121.8	44.9	31.2	21.4	14.7	9.1	8.1	7.4	6.9
344	24.5	7.4	3.0	1.4	0.7	0.4	0.4	0.3	0.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1.4	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
32	10.1	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
6	0.4	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-	0.9	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	-	-	-
-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
181	4.5	2.5	1.4	0.6	0.5	0.2	0.2	0.1	0.2
-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	-
4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
215	6.2	3.2	2.2	1.6	0.6	0.3	0.3	0.2	0.2
2 744	17.4	8.1	4.9	3.1	2.2	2.3	2.3	2.3	2.4
2	0.1	0.0	0.0	-	-	0.0	-	0.0	0.0
63	1.9	1.0	0.6	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
955	2.5	1.6	1.1	0.8	0.7	0.6	0.7	0.7	0.8
49	2.9	1.5	0.7	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
984	0.7	0.7	0.4	0.2	0.5	0.9	0.9	0.9	0.9
37	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
633	1.8	0.9	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
150 336	77.4	87.1	100.4	108.4	116.3	122.6	125.3	128.4	131.3
5 325	3.3	3.3	3.7	4.0	4.7	4.5	4.5	4.6	4.7
49 564	37.5	41.8	45.8	47.2	47.3	44.8	44.6	44.2	43.3
13 051	7.4	9.6	9.4	8.7	9.2	9.5	10.2	10.6	11.4
6 807	0.6	1.2	2.1	3.1	4.3	5.1	5.3	5.6	5.9
18 530	1.3	3.0	5.5	7.9	10.2	13.3	14.1	15.2	16.2
3 788	1.7	1.8	1.8	2.0	2.4	3.0	3.0	3.2	3.3
5 710	10.0	8.2	7.6	6.8	6.2	5.5	5.2	5.0	5.0

表3 年次・死因 (B分類)・性別
Table 3 Trends of deaths and death rates (per 100,000 population) by sex and causes

死亡数・率 (人口10万対) (つづき)
of death (the 50 rubrics list for tabulation of mortality : B list) : Japan-con.

総数

国際50項目 死因分類番号	死 因 ¹⁾	死 亡 数								
		昭和25年	30年	35年	40年	45年	50年	51年	52年	53年
B19.h	白 血 病	1 226	2 038	2 628	3 159	3 559	4 164	4 302	4 411	
B19.i	そ の 他	29 486	37 019	38 871	41 106	
B20	良性および性質不詳の新生物	4 433	5 068	4 723	5 277	5 801	6 485	6 519	6 196	
B21	糖 尿 病	2 034	2 191	3 195	5 115	7 642	9 032	9 183	9 509	
B22	ビタミン欠乏症およびその他の 栄養欠乏症	16 771	4 906	1 993	878	598	459	506	480	
B23	貧 血	1 242	1 430	1 420	1 478	1 616	1 715	1 540	1 418	
B24	髄 膜 炎	6 657	2 499	1 249	922	861	868	824	785	
B25	活動性リウマチ熱	960	867	1 120	693	523	342	308	254	
B26	慢性リウマチ性心疾患	6 481	5 496	4 195	3 948	3 663	3 573	
B27	高 血 圧 性 疾 患	9 935	9 073	15 115	18 987	18 303	19 831	19 829	19 333	
B27.a	高 血 圧 性 心 疾 患	735	2 016	6 578	10 715	12 400	14 511	14 823	14 542	
B27.b	その他の高血圧性疾患	9 200	7 057	8 537	8 272	5 903	5 320	5 006	4 791	
B28	虚 血 性 心 疾 患	8 272	10 368	19 859	28 034	39 086	43 820	44 590	45 166	
B29	そ の 他 の 心 疾 患	42 060	42 142	46 130	51 458	55 385	54 825	
B29.a	心内膜の慢性疾患	11 143	6 861	4 577	2 959	2 772	2 446	
B29.b	その他の心筋機能不全	4 575	9 869	14 840	21 206	31 736	40 608	44 989	44 790	
B29.c	その他の心疾患	14 069	13 009	16 077	14 075	9 817	7 891	7 624	7 589	
B30	脳 血 管 疾 患*	105 728	121 504	150 109	172 773	181 315	174 367	173 745	170 029	
B30.a	脳 出 血	...	104 793	115 230	104 099	85 518	64 744	61 390	57 438	
B30.b	脳 硬 塞	...	7 968	19 999	42 654	59 003	68 547	70 292	71 435	
B30.c	そ の 他	...	8 743	14 880	26 020	36 794	41 076	42 063	41 156	
B31	イ ン フ ル エ ン ザ	1 250	539	4 012	5 024	3 707	1 391	2 654	682	
B32	肺 炎	54 169	34 309	37 534	29 868	27 929	30 441	29 913	26 440	
B33	気管支炎、肺気腫および喘息	14 944	13 288	13 178	12 148	
B33.a	気 管 支 炎	13 492	5 260	4 352	3 818	4 318	4 603	4 427	4 138	
B33.b	肺 気 腫	1 513	1 757	1 803	1 849	
B33.c	喘 息	16 231	11 309	11 221	10 812	9 113	6 928	6 948	6 161	
B34	消 化 性 潰 瘍	19 323	13 387	11 057	9 165	7 997	6 865	6 311	5 924	
B35	虫 垂 炎	3 038	1 399	1 020	705	572	426	314	269	
B36	腸閉塞およびヘルニア	6 457	4 784	4 314	3 707	3 109	2 711	2 573	2 532	
B37	肝 硬 変	5 678	7 644	9 078	9 791	12 898	15 129	15 462	15 453	
B38	腎炎およびネフローゼ	26 978	19 122	15 429	11 515	9 188	7 038	6 816	6 274	
B38.a	急性腎炎およびネフローゼ	7 195	5 575	4 388	2 752	1 996	1 593	1 550	1 454	
B38.b	そ の 他	19 783	13 547	11 041	8 763	7 192	5 445	5 266	4 820	
B39	前立腺肥大症	220	311	420	639	637	778	696	696	
B40	流 産	4 117	3 095	2 097	1 597	41	21	16	11	
B41	その他の妊娠、分娩、産褥の合併 症および合併症の記載のない分娩 先 天 異 常	6 691	4 624	4 231	5 176	5 828	5 993	5 787	5 692	
B42	出生時損傷、難産およびその他 の無酸素症、低酸素症	2 462	1 825	2 494	3 264	3 757	3 314	3 315	2 902	
B44	その他の周産期の死因	8 880	6 165	5 167	4 741	

53年	死 亡 率								
	昭和25年	30年	35年	40年	45年	50年	51年	52年	53年
4 354	1.5	2.3	2.8	3.2	3.5	3.7	3.8	3.9	3.8
43 207	28.6	33.3	34.6	36.2	37.7
6 186	5.3	5.7	5.1	5.4	5.6	5.8	5.8	5.5	5.4
9 685	2.4	2.5	3.4	5.2	7.4	8.1	8.2	8.4	8.5
465	20.2	5.5	2.1	0.9	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4
1 445	1.5	1.6	1.5	1.5	1.6	1.5	1.4	1.2	1.3
895	8.0	2.8	1.3	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8
269	1.2	1.0	1.2	0.7	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2
3 619	6.9	5.6	4.1	3.5	3.3	3.1	3.2
18 779	11.9	10.2	16.2	19.3	17.7	17.8	17.6	17.0	16.4
14 342	0.9	2.3	7.0	10.9	12.0	13.0	13.2	12.8	12.5
4 437	11.1	7.9	9.1	8.4	5.7	4.8	4.5	4.2	3.9
45 620	9.9	11.6	21.3	28.5	37.9	39.4	39.7	39.8	39.8
57 547	45.0	42.9	44.7	46.3	49.3	48.3	50.3
2 308	11.9	7.0	4.4	2.7	2.5	2.2	2.0
47 646	5.5	11.1	15.9	21.6	30.8	36.5	40.0	39.5	41.6
7 593	16.9	14.6	17.2	14.3	9.5	7.1	6.8	6.7	6.6
167 452	127.1	136.1	160.7	175.8	175.8	156.7	154.5	149.8	146.2
53 986	...	117.4	123.3	105.9	82.9	58.2	54.6	50.6	47.1
73 068	...	8.9	21.4	43.4	57.2	61.6	62.5	62.9	63.8
40 398	...	9.8	15.9	26.5	35.7	36.9	37.4	36.3	35.3
707	1.5	0.6	4.3	5.1	3.6	1.3	2.4	0.6	0.6
28 241	65.1	38.4	40.2	30.4	27.1	27.4	26.6	23.3	24.7
12 186	14.5	11.9	11.7	10.7	10.6
4 478	16.2	5.9	4.7	3.9	4.2	4.1	3.9	3.6	3.9
1 940	1.5	1.6	1.6	1.6	1.7
5 768	19.5	12.7	12.0	11.0	8.8	6.2	6.2	5.4	5.0
5 810	23.2	15.0	11.8	9.3	7.8	6.2	5.6	5.2	5.1
262	3.7	1.6	1.1	0.7	0.6	0.4	0.3	0.2	0.2
2 477	7.8	5.4	4.6	3.8	3.0	2.4	2.3	2.2	2.2
16 077	6.8	8.6	9.7	10.0	12.5	13.6	13.8	13.6	14.0
6 632	32.4	21.4	16.5	11.7	8.9	6.3	6.1	5.5	5.8
1 626	8.6	6.2	4.7	2.8	1.9	1.4	1.4	1.3	1.4
5 006	23.8	15.2	11.8	8.9	7.0	4.9	4.7	4.2	4.4
622	0.3	0.3	0.4	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5
11	4.9	3.5	2.2	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
367	0.9	0.5	0.4	0.3	0.3
5 551	8.0	5.2	4.5	5.3	5.7	5.4	5.1	5.0	4.8
2 739	3.0	2.0	2.7	3.3	3.6	3.0	2.9	2.6	2.4
3 890	8.6	5.5	4.6	4.2	3.4

注: 1) 402ページの注を参照。
* 昭和25年の脳血管疾患は、第6回分類のB22にB46.b (B22の後遺症及び1年以上経過したもの)を含めてあるが、B46.bは脳出血、脳硬塞の内訳の分類をしていないので総数のみを計上してある。(58頁注5参照)
なお、55年までの報告書にはB46.bを含まない数値を計上してあるため、本表とは異なるので留意されたい。

表3 年次・死因 (B分類)・性別
Table 3 Trends of deaths and death rates (per 100,000 population) by sex and causes

死亡数・率 (人口10万対) (つづき)
of death (the 50 rubrics list for tabulation of mortality : B list) : Japan-con.

総数

国際50項目 死因分類番号	死 因 ¹⁾	死 亡 数								
		昭和25年	30年	35年	40年	45年	50年	51年	52年	53年
B45	症状およびその他の診断名不明確の状態	79 781	78 715	68 942	62 513	50 610	38 169	37 086	35 545	
B45.a	精神病の記載のない老衰	58 412	59 932	54 139	49 092	39 277	29 916	29 659	28 381	
B45.b	その他の他	21 369	18 783	14 803	13 421	11 333	8 253	7 427	7 164	
B46	その他のすべての疾患	49 619	48 102	47 199	45 212	
B46.a	精神障害	4 331	3 935	4 052	3 639	3 467	3 083	3 061	2 793	
B46.b	中枢神経系の非炎症性疾患	21 337	5 713	5 597	4 842	4 338	4 104	4 148	4 112	
B46.c	その他の循環器系の疾患	4 341	3 900	4 458	5 218	5 886	6 549	6 317	6 504	
B46.d	急性気管支炎および細気管支炎	9 904	3 585	4 159	2 977	2 895	2 418	2 276	1 852	
B46.e	胃炎、十二指腸炎および慢性胃腸炎	15 398	8 259	6 588	5 450	3 896	3 185	2 948	2 615	
B46.f	肝臓の疾患 (肝硬変を除く)	2 952	4 183	4 311	3 872	4 199	2 972	2 818	2 720	
B46.g	その他の他	24 938	25 791	25 631	24 616	
"BE"	不慮の事故、中毒および暴力の二重分類 (外因)	51 079	57 861	60 889	56 057	62 069	56 406	54 012	53 562	
BE47	自動車事故	3 046	5 973	13 429	16 257	21 535	14 206	13 006	12 095	
BE48	その他の不慮の事故	29 804	27 292	25 535	23 931	22 267	19 504	18 483	18 257	
BE48.a	自動車以外の交通事故	4 496	4 527	4 328	3 259	2 561	1 985	1 781	1 764	
BE48.b	不慮の墜落	3 132	3 441	4 116	4 383	4 911	4 735	4 651	4 380	
BE48.c	火災および火焰による不慮の事故	1 973	1 610	1 545	1 637	
BE48.d	天災	517	167	239	197	51	149	180	27	
BE48.e	不慮の溺死	9 713	8 485	6 467	5 561	4 342	4 155	3 930	3 868	
BE48.f	工業性の不慮の事故	3 924	2 664	2 348	2 333	
BE48.g	その他の他	4 505	4 206	4 048	4 248	
BE49	自殺	16 311	22 477	20 143	14 444	15 728	19 975	19 786	20 269	
BE50	その他の外因	2 539	2 721	2 737	2 941	
BE50.a	他殺	1 883	2 091	1 715	1 402	1 362	1 429	1 412	1 370	
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害	1 140	1 266	1 304	1 558	
BE50.c	法的介入および戦争行為 (再掲)	37	28	67	23	37	26	21	13	
B1~B18	伝染病および寄生虫病	221 837	87 175	56 232	35 291	24 163	16 805	15 328	14 256	
B5, B6	全結核	121 769	46 735	31 959	22 366	15 899	10 567	9 578	8 803	
(B25~B30, B38.b, B46.c, B26, B28, B29)	脳心腎血管疾患	176 816	203 242	250 243	282 106	302 630	305 760	309 103	304 504	
	心疾患	53 377	54 351	68 400	75 672	89 411	99 226	103 638	103 564	
B26, B29.a	慢性リウマチ性心疾患および心内膜の慢性疾患	26 461	21 105	17 624	12 357	8 772	6 907	6 435	6 019	
(B32, B33.a, B46.d)	肺炎および気管支炎	77 565	43 154	46 045	36 663	35 142	37 462	36 616	32 430	
B33.a, B46.d	気管支炎	23 396	8 845	8 511	6 795	7 213	7 021	6 703	5 990	
B40, B41	妊娠、分娩および産褥の合併症	4 117	3 095	2 097	1 597	1 008	546	474	406	
B4, B46.e	胃腸炎	68 540	28 289	19 791	12 705	8 587	6 244	5 512	5 015	
BE47, BE48	不慮の事故	32 850	33 265	38 964	40 188	43 802	33 710	31 489	30 352	

注: 1) 402ページの注を参照。

53年	死 亡 率									
	昭和25年	30年	35年	40年	45年	50年	51年	52年	53年	
34 364	95.9	88.2	73.8	63.6	49.1	34.3	33.0	31.3	30.0	
27 976	70.2	67.1	58.0	50.0	38.1	26.9	26.4	25.0	24.4	
6 388	25.7	21.0	15.8	13.7	11.0	7.4	6.6	6.3	5.6	
46 735	48.1	43.2	42.0	39.8	40.8	
2 719	5.2	4.4	4.3	3.7	3.4	2.8	2.7	2.5	2.4	
4 385	25.6	6.4	6.0	4.9	4.2	3.7	3.7	3.6	3.8	
6 559	5.2	4.4	4.8	5.3	5.7	5.9	5.6	5.7	5.7	
1 963	11.9	4.0	4.5	3.0	2.8	2.2	2.0	1.6	1.7	
2 550	18.5	9.3	7.1	5.5	3.8	2.9	2.6	2.3	2.2	
2 712	3.5	4.7	4.6	3.9	4.1	2.7	2.5	2.4	2.4	
25 847	24.2	23.2	22.8	21.7	22.6	
53 086	61.4	64.8	65.2	57.0	60.2	50.7	48.0	47.2	46.4	
12 030	3.7	6.7	14.4	16.5	20.9	12.8	11.6	10.7	10.5	
17 987	35.8	30.6	27.3	24.4	21.6	17.5	16.4	16.1	15.7	
1 656	5.4	5.1	4.6	3.3	2.5	1.8	1.6	1.6	1.4	
4 427	3.8	3.9	4.4	4.5	4.8	4.3	4.1	3.9	3.9	
1 564	1.9	1.4	1.4	1.4	1.4	
67	0.6	0.2	0.3	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	
3 803	11.7	9.5	6.9	5.7	4.2	3.7	3.5	3.4	3.3	
2 338	3.8	2.4	2.1	2.1	2.0	
4 132	4.4	3.8	3.6	3.7	3.6	
20 199	19.6	25.2	21.6	14.7	15.3	18.0	17.6	17.9	17.6	
2 870	2.5	2.4	2.4	2.6	2.5	
1 304	2.3	2.3	1.8	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	1.1	
1 557	1.1	1.1	1.2	1.4	1.4	
9	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
13 766	266.6	97.6	60.2	35.9	23.4	15.1	13.6	12.6	12.0	
8 261	146.4	52.3	34.2	22.8	15.4	9.5	8.5	7.8	7.2	
304 851	212.5	227.7	267.9	287.1	293.5	274.8	275.0	268.3	266.2	
106 786	64.2	60.9	73.2	77.0	86.7	89.2	92.2	91.2	93.3	
5 927	31.8	23.6	18.9	12.6	8.5	6.2	5.7	5.3	5.2	
34 682	93.2	48.3	49.3	37.3	34.1	33.7	32.6	28.6	30.3	
6 441	28.1	9.9	9.1	6.9	7.0	6.3	6.0	5.3	5.6	
378	4.9	3.5	2.2	1.6	1.0	0.5	0.4	0.4	0.3	
4 867	82.4	31.7	21.2	12.9	8.3	5.6	4.9	4.4	4.3	
30 017	39.5	37.3	41.7	40.9	42.5	30.3	28.0	26.7	26.2	

表3 年次・死因 (B分類)・性別
Table 3 Trends of deaths and death rates (per 100,000 population) by sex and causes

男

国際50項目 死因分類番号	死 因 ¹⁾	死 亡 数								
		昭和25年	30年	35年	40年	45年	50年	51年	52年	53年
	総 数	467 073	365 246	377 526	378 716	387 880	377 827	378 630	372 175	
B1	コ レ ラ	-	-	-	-	-	-	-	1	
B2	腸 チ フ ス	303	56	24	4	1	1	1	1	
B3	細菌性赤痢およびアメーバ症	5 818	2 866	920	136	32	4	4	6	
B4	腸炎およびその他の下痢性疾患	26 304	9 344	5 943	3 270	2 043	1 281	1 092	1 013	
B5	呼吸器系の結核	55 894	23 571	18 472	14 166	10 527	7 192	6 627	6 103	
B6	その他の結核	9 195	3 030	1 297	615	387	214	208	206	
B7	ペ ス ト	-	-	-	-	-	-	-	-	
B8	ジ フ テ リ ア	649	488	275	21	2	3	2	-	
B9	百日咳	3 666	190	35	13	3	3	10	10	
B10	レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	15	28	12	8	2	1	-	-	
B11	髄膜炎菌感染症	215	97	69	36	12	5	6	5	
B12	急性灰白髄炎	401	176	168	13	6	3	-	-	
B13	痘 瘡	2	-	-	-	-	-	-	-	
B14	麻疹	1 845	1 107	697	300	290	126	129	75	
B15	チフスおよびその他のリケッチア症	70	13	7	1	1	-	-	1	
B16	マ ラ リ ア	68	18	8	3	4	1	1	3	
B17	梅毒および続発症	3 535	2 102	1 511	1 117	466	252	214	155	
B18	その他の伝染病および寄生虫病	7 363	3 818	2 418	1 615	1 188	1 324	1 344	1 404	
B18.a	癩	63	15	4	-	-	-	-	1	
B18.b	破 傷 風	1 008	574	402	259	106	52	52	48	
B18.c	敗 血 症	1 096	729	526	367	350	359	374	389	
B18.d	日 本 脳 炎	1 287	715	333	327	82	15	8	5	
B18.e	伝 染 性 肝 炎	292	314	185	90	237	522	502	566	
B18.f	カ ン ジ ダ 症	41	35	41	22	19	23	
B18.g	日 本 住 血 吸 虫 症	46	46	22	12	10	14	5	9	
B18.h	糸 状 虫 症	30	30	29	19	9	4	4	4	
B18.i	そ の 他	876	506	353	336	380	359	
B19	悪 性 新 生 物	32 670	41 223	50 898	58 899	67 074	76 922	79 995	83 088	
B19.a	食道の悪性新生物	1 961	2 102	2 472	2 870	3 673	3 862	3 924	4 057	
B19.b	胃の悪性新生物	19 023	22 899	26 283	28 636	29 653	30 403	30 537	30 326	
B19.c	肝臓の悪性新生物 ²⁾	3 601	4 877	5 204	5 006	5 908	6 795	7 520	7 937	
B19.d	膵臓の悪性新生物	328	625	1 150	1 748	2 549	3 155	3 430	3 688	
B19.e	気管、気管支および肺の悪性新生物	789	1 893	3 638	5 404	7 502	10 711	11 440	12 542	
B19.f	乳房の悪性新生物	29	17	20	29	23	27	22	39	
B19.g	子宮の悪性新生物	

注: 1), 2) 402ページの注を参照。

死亡数・率 (人口10万対) (つづき)
of death (the 50 rubrics list for tabulation of mortality : B list) : Japan-con.

53年	死 亡 率								
	昭和25年	30年	35年	40年	45年	50年	51年	52年	53年
375 625	1 144.5	832.7	822.9	785.0	766.6	690.4	684.3	666.3	666.5
1	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
-	0.7	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
3	14.3	6.5	2.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
962	64.5	21.3	13.0	6.8	4.0	2.3	2.0	1.8	1.7
5 780	137.0	53.7	40.3	29.4	20.8	13.1	12.0	10.9	10.3
169	22.5	6.9	2.8	1.3	0.8	0.4	0.4	0.4	0.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1.6	1.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
18	9.0	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-
3	0.5	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-	1.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	-	-	-
-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
100	4.5	2.5	1.5	0.6	0.6	0.2	0.2	0.1	0.2
-	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	-
4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
147	8.7	4.8	3.3	2.3	0.9	0.5	0.4	0.3	0.3
1 491	18.0	8.7	5.3	3.3	2.3	2.4	2.4	2.5	2.6
1	0.2	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0	0.0
36	2.5	1.3	0.9	0.5	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
499	2.7	1.7	1.1	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.9
26	3.2	1.6	0.7	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
562	0.7	0.7	0.4	0.2	0.5	1.0	0.9	1.0	1.0
25	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
331	1.9	1.0	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6
85 630	80.1	94.0	110.9	122.1	132.6	140.6	144.6	148.7	151.9
4 130	4.8	4.8	5.4	5.9	7.3	7.1	7.1	7.3	7.3
30 136	46.6	52.2	57.3	59.4	58.6	55.6	55.2	54.3	53.5
8 743	8.8	11.1	11.3	10.4	11.7	12.4	13.6	14.2	15.5
3 894	0.8	1.4	2.5	3.6	5.0	5.8	6.2	6.6	6.9
13 417	1.9	4.3	7.9	11.2	14.8	19.6	20.7	22.5	23.8
33	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
.

表3 年次・死因 (B分類)・性別
Table 3 Trends of deaths and death rates (per 100,000 population) by sex and causes

男

国際50項目 死因分類番号	死 因 ¹⁾	死 亡 数								
		昭和25年	30年	35年	40年	45年	50年	51年	52年	53年
B19.h	白 血 病	718	1 214	1 473	1 765	2 005	2 321	2 458	2 527	
B19.i	そ の 他	15 761	19 648	20 664	21 972	
B20	良性および性質不詳の新生物	2 061	2 498	2 413	2 773	3 109	3 498	3 593	3 367	
B21	糖 尿 病	1 005	1 020	1 482	2 463	3 753	4 377	4 347	4 550	
B22	ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症	8 845	2 638	1 027	446	298	216	259	240	
B23	貧 血	544	711	661	690	707	713	675	660	
B24	髄 膜 炎	3 514	1 332	675	485	470	466	448	448	
B25	活 動 性 リウマチ熱	415	381	444	253	192	115	99	84	
B26	慢性リウマチ性心疾患	2 599	2 112	1 594	1 576	1 413	1 450	
B27	高 血 圧 性 疾 患	4 639	4 385	7 360	9 176	8 423	8 683	8 620	8 255	
B27.a	高 血 圧 性 心 疾 患	376	1 051	3 284	5 245	5 681	6 378	6 500	6 266	
B27.b	その他の高血圧性疾患	4 263	3 334	4 076	3 931	2 742	2 305	2 120	1 989	
B28	虚 血 性 心 疾 患	5 127	6 291	11 926	16 458	22 441	24 106	24 576	24 976	
B29	そ の 他 の 心 疾 患	20 230	20 257	21 953	24 713	26 684	26 653	
B29.a	心内膜の慢性疾患	4 587	2 666	1 713	1 092	1 071	910	
B29.b	その他の心筋機能不全	2 328	4 881	7 122	10 118	15 035	19 482	21 569	21 718	
B29.c	その他の心疾患	7 386	7 160	8 521	7 473	5 205	4 139	4 044	4 025	
B30	脳 血 管 疾 患	52 188	62 737	78 965	92 723	96 910	89 924	89 189	86 807	
B30.a	脳 出 血	...	54 121	60 726	56 577	46 864	34 981	33 050	30 944	
B30.b	脳 硬 塞	...	4 109	10 435	22 225	30 604	34 130	35 030	35 229	
B30.c	そ の 他	...	4 507	7 804	13 921	19 442	20 813	21 109	20 634	
B31	イ ン フ ル エ ン ザ	619	265	2 143	2 607	1 984	684	1 326	328	
B32	肺 炎	28 090	17 965	20 152	15 962	15 030	16 371	16 234	14 341	
B33	気管支炎、肺気腫および喘息	9 094	8 130	8 130	7 636	
B33.a	気 管 支 炎	7 184	2 883	2 272	1 996	2 414	2 643	2 544	2 427	
B33.b	肺 気 腫	1 152	1 380	1 415	1 469	
B33.c	喘 息	9 459	6 737	6 756	6 591	5 528	4 107	4 171	3 740	
B34	消 化 性 潰 瘍	13 656	9 422	7 640	6 367	5 419	4 472	3 969	3 777	
B35	虫 垂 炎	1 555	725	507	365	321	229	179	130	
B36	腸閉塞およびヘルニア	3 745	2 730	2 371	2 045	1 616	1 380	1 263	1 246	
B37	肝 硬 変	3 299	4 522	5 666	6 473	8 873	10 898	11 332	11 191	
B38	腎炎およびネフローゼ	12 224	9 085	7 599	5 859	4 741	3 513	3 393	3 170	
B38.a	急性腎炎およびネフローゼ	3 426	2 686	2 181	1 403	1 048	783	786	744	
B38.b	そ の 他	8 798	6 399	5 418	4 456	3 693	2 730	2 607	2 426	
B39	前立腺肥大症	220	311	420	639	637	778	696	696	
B40	流 産	
B41	その他の妊娠、分娩、産褥の合併症および合併症の記載のない分娩	
B42	先天性異常	3 704	2 554	2 284	2 816	3 148	3 285	3 093	3 028	
B43	出生時損傷、難産およびその他の無酸素症、低酸素症	1 422	1 130	1 474	1 988	2 334	1 962	1 999	1 744	
B44	その他の周産期の死因	5 211	3 596	3 039	2 719	

注： 1) 402ページの注を参照。

死亡数・率 (人口10万対) (つづき)
of death (the 50 rubrics list for tabulation of mortality : B list) : Japan-con.

53年	死 亡 率								
	昭和25年	30年	35年	40年	45年	50年	51年	52年	53年
2 505	1.8	2.8	3.2	3.7	4.0	4.2	4.4	4.5	4.4
22 772	31.1	35.9	37.3	39.3	40.4
3 328	5.1	5.7	5.3	5.7	6.1	6.4	6.5	6.0	5.9
4 632	2.5	2.3	3.2	5.1	7.4	8.0	7.9	8.1	8.2
240	21.7	6.0	2.2	0.9	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4
622	1.3	1.6	1.4	1.4	1.4	1.3	1.2	1.2	1.1
527	8.6	3.0	1.5	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.9
114	1.0	0.9	1.0	0.5	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2
1 435	5.7	4.4	3.2	2.9	2.6	2.6	2.5
8 062	11.4	10.0	16.0	19.0	16.6	15.9	15.6	14.8	14.3
6 211	0.9	2.4	7.2	10.9	11.2	11.7	11.7	11.2	11.0
1 851	10.4	7.6	8.9	8.1	5.4	4.2	3.8	3.6	3.3
25 187	12.6	14.3	26.0	34.1	44.3	44.0	44.4	44.7	44.7
28 021	44.1	42.0	43.4	45.2	48.2	47.7	49.7
851	10.0	5.5	3.4	2.0	1.9	1.6	1.5
23 180	5.7	11.1	15.5	21.0	29.7	35.6	39.0	38.9	41.1
3 990	18.1	16.3	18.6	15.5	10.3	7.6	7.3	7.2	7.1
85 308	127.9	143.0	172.1	192.2	191.5	164.3	161.2	155.4	151.4
28 929	...	123.4	132.4	117.3	92.6	63.9	59.7	55.4	51.3
36 440	...	9.4	22.7	46.1	60.5	62.4	63.3	63.1	64.7
19 939	...	10.3	17.0	28.9	38.4	38.0	38.1	36.9	35.4
368	1.5	0.6	4.7	5.4	3.9	1.2	2.4	0.6	0.7
15 653	68.8	41.0	43.9	33.1	29.7	29.9	29.3	25.7	27.8
7 623	18.0	14.9	14.7	13.7	13.5
2 622	17.6	6.6	5.0	4.1	4.8	4.8	4.6	4.3	4.7
1 553	2.3	2.5	2.6	2.6	2.8
3 448	23.2	15.4	14.7	13.7	10.9	7.5	7.5	6.7	6.1
3 641	33.5	21.5	16.7	13.2	10.7	8.2	7.2	6.8	6.5
127	3.8	1.7	1.1	0.8	0.6	0.4	0.3	0.2	0.2
1 204	9.2	6.2	5.2	4.2	3.2	2.5	2.3	2.2	2.1
11 678	8.1	10.3	12.4	13.4	17.5	19.9	20.5	20.0	20.7
3 338	30.0	20.7	16.6	12.1	9.4	6.4	6.1	5.7	5.9
833	8.4	6.1	4.8	2.9	2.1	1.4	1.4	1.3	1.5
2 505	21.6	14.6	11.8	9.2	7.3	5.0	4.7	4.3	4.4
622	0.5	0.7	0.9	1.3	1.3	1.4	1.3	1.2	1.1
...
3 010	9.1	5.8	5.0	5.8	6.2	6.0	5.6	5.4	5.3
1 673	3.5	2.6	3.2	4.1	4.6	3.6	3.6	3.1	3.0
2 213	10.3	6.6	5.5	4.9	3.9

表3 年次・死因 (B分類)・性別
Table 3 Trends of deaths and death rates (per 100,000 population) by sex and causes

男

国際50項目 死因分類番号	死 因 ¹⁾	死 亡 数								
		昭和25年	30年	35年	40年	45年	50年	51年	52年	53年
B45	症状およびその他の診断名不明確の状態	35 108	33 878	28 831	25 331	20 223	15 119	14 576	13 986	
B45.a	精神病の記載のない老衰	23 474	23 581	20 547	17 504	13 580	10 287	10 301	9 831	
B45.b	その他	11 634	10 297	8 284	7 827	6 643	4 832	4 275	4 155	
B46	その他のすべての疾患	23 816	23 313	23 082	21 982	
B46.a	精神障害	2 052	1 880	2 032	1 865	1 809	1 714	1 660	1 532	
B46.b	中枢神経系の非炎症性疾患	11 844	3 205	3 143	2 661	2 386	2 306	2 309	2 281	
B46.c	その他の循環器系の疾患	2 262	2 015	2 330	2 682	3 048	3 473	3 333	3 432	
B46.d	急性気管支炎および細気管支炎	4 986	1 749	1 966	1 376	1 441	1 172	1 138	886	
B46.e	胃炎、十二指腸炎および慢性胃腸炎	6 936	3 638	2 763	2 235	1 593	1 237	1 135	994	
B46.f	肝臓の疾患 (肝硬変を除く)	1 588	2 227	2 347	2 109	2 174	1 563	1 587	1 517	
B46.g	その他	11 365	11 848	11 920	11 340	
BE	不慮の事故、中毒および暴力の二重分類 (外因)	34 753	40 114	42 521	39 931	43 545	38 378	36 783	36 640	
BE47	自動車事故	2 247	4 649	10 681	12 904	16 540	10 875	9 916	9 226	
BE48	その他の不慮の事故	21 536	20 259	19 106	17 770	16 572	13 990	13 320	13 181	
BE48.a	自動車以外の交通事故	3 548	3 595	3 489	2 595	2 089	1 591	1 473	1 449	
BE48.b	不慮の墜落	2 563	2 754	3 075	3 263	3 609	3 175	3 181	3 039	
BE48.c	火災および火傷による不慮の事故	1 164	964	961	988	
BE48.d	天災	315	92	129	112	27	78	102	12	
BE48.e	不慮の溺死	6 435	5 925	4 768	4 026	3 146	3 006	2 846	2 795	
BE48.f	工業性の不慮の事故	3 500	2 274	2 011	2 032	
BE48.g	その他	3 037	2 902	2 746	2 866	
BE49	自殺	9 820	13 836	11 506	8 330	8 761	11 744	11 744	12 299	
BE50	その他の外因	1 672	1 769	1 803	1 934	
BE50.a	他殺	1 115	1 342	1 167	906	861	869	831	807	
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害	776	875	953	1 115	
BE50.c	法的介入および戦争行為 (再掲)	37	28	61	21	35	25	19	12	
B1~B18	伝染病および寄生虫病	115 343	46 904	31 856	21 318	14 964	10 410	9 638	8 983	
B5, B6	全結核	65 089	26 601	19 769	14 781	10 914	7 406	6 835	6 309	
B25~B30, B38.b, B46.c	脳心腎血管疾患	84 890	103 199	129 272	148 117	158 254	155 320	156 521	154 083	
B26, B28, B29	心疾患	26 108	27 282	34 755	38 827	45 988	50 395	52 673	53 079	
B26, B29.a	慢性リウマチ性心疾患および心内膜の慢性疾患	11 267	8 950	7 186	4 778	3 307	2 668	2 484	2 360	
B32, B33.a, B46.d	肺炎および気管支炎	40 260	22 597	24 390	19 334	18 885	20 186	19 916	17 654	
B33.a, B46.d	気管支炎	12 170	4 632	4 238	3 372	3 855	3 815	3 682	3 313	
B4, B46.e	胃腸炎	33 240	12 982	8 706	5 505	3 636	2 518	2 227	2 007	
BE47, BE48	不慮の事故	23 783	24 908	29 787	30 674	33 112	24 865	23 236	22 407	

注: 1) 402ページの注を参照。

死亡数・率 (人口10万対) (つづき)
of death (the 50 rubrics list for tabulation of mortality : B list) : Japan-con.

53年	死 亡 率								
	昭和25年	30年	35年	40年	45年	50年	51年	52年	53年
13 598	86.0	77.2	62.8	52.5	40.0	27.6	26.3	25.0	24.1
9 907	57.5	53.8	44.8	36.3	26.8	18.8	18.6	17.6	17.6
3 691	28.5	23.5	18.1	16.2	13.1	8.8	7.7	7.4	6.5
22 755	47.1	42.6	41.7	39.4	40.4
1 466	5.0	4.3	4.4	3.9	3.6	3.1	3.0	2.7	2.6
2 430	29.0	7.3	6.9	5.5	4.7	4.2	4.2	4.1	4.3
3 524	5.5	4.6	5.1	5.6	6.0	6.3	6.0	6.1	6.3
979	12.2	4.0	4.3	2.9	2.8	2.1	2.1	1.6	1.7
1 002	17.0	8.3	6.0	4.6	3.1	2.3	2.1	1.8	1.8
1 493	3.9	5.1	5.1	4.4	4.3	2.9	2.9	2.7	2.6
11 861	22.5	21.7	21.5	20.3	21.0
36 338	85.2	91.5	92.7	82.8	86.1	70.1	66.5	65.6	64.5
9 118	5.5	10.6	23.3	26.7	32.7	19.9	17.9	16.5	16.2
12 931	52.8	46.2	41.6	36.8	32.8	25.6	24.1	23.6	22.9
1 360	8.7	8.2	7.6	5.4	4.1	2.9	2.7	2.6	2.4
3 011	6.3	6.3	6.7	6.8	7.1	5.8	5.7	5.4	5.3
920	2.3	1.8	1.7	1.8	1.6
35	0.8	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1
2 808	15.8	13.5	10.4	8.3	6.2	5.5	5.1	5.0	5.0
2 009	6.9	4.2	3.6	3.6	3.6
2 788	6.0	5.3	5.0	5.1	4.9
12 409	24.1	31.5	25.1	17.3	17.3	21.5	21.2	22.0	22.0
1 880	3.3	3.2	3.3	3.5	3.3
752	2.7	3.1	2.5	1.9	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3
1 119	1.5	1.6	1.7	2.0	2.0
9	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
8 678	282.6	106.9	69.4	44.2	29.6	19.0	17.4	16.1	15.4
5 949	159.5	60.6	43.1	30.6	21.6	13.5	12.4	11.3	10.6
154 156	208.0	235.3	281.8	307.0	312.8	283.8	282.9	275.8	273.5
54 643	64.0	62.2	75.8	80.5	90.9	92.1	95.2	95.0	97.0
2 286	27.6	20.4	15.7	9.9	6.5	4.9	4.5	4.2	4.1
19 254	98.6	51.5	53.2	40.1	37.3	36.9	36.0	31.6	34.2
3 601	29.8	10.6	9.2	7.0	7.6	7.0	6.7	5.9	6.4
1 964	81.4	29.6	19.0	11.4	7.2	4.6	4.0	3.6	3.5
22 049	58.3	56.8	64.9	63.6	65.4	45.4	42.0	40.1	39.1

表3 年次・死因（B分類）・性別

Table 3 Trends of deaths and death rates (per 100,000 population) by sex and causes

女

国際50項目 死因分類番号	死 因 ¹⁾	死 亡 数								
		昭和25年	30年	35年	40年	45年	50年	51年	52年	53年
	総 数	437 803	328 277	329 073	321 722	325 082	324 448	324 640	317 899	
B1	コ レ ラ	—	—	—	—	—	—	—	—	
B2	腸 チ フ ス	327	49	15	5	2	—	2	3	
B3	細菌性赤痢およびアメーバ症	6 150	3 176	1 128	134	19	2	2	5	
B4	腸炎およびその他の下痢性疾患	26 838	10 686	7 260	3 985	2 648	1 778	1 472	1 387	
B5	呼吸器系の結核	45 461	16 544	10 704	6 867	4 605	2 908	2 510	2 316	
B6	そ の 他 の 結 核	11 219	3 590	1 486	718	380	253	233	178	
B7	ペ ス ト	—	—	—	—	—	—	—	—	
B8	ジ フ テ リ ア	533	425	222	18	4	2	—	2	
B9	百 日 咳	4 760	211	30	9	2	2	10	10	
B10	レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	20	34	11	6	1	1	1	—	
B11	髄 膜 炎 菌 感 染	152	64	43	14	6	5	5	8	
B12	急 性 灰 白 髄 炎	374	138	149	15	5	—	—	—	
B13	痘 瘡	—	—	—	—	—	—	—	—	
B14	麻 疹	1 900	1 151	649	298	266	106	139	63	
B15	チフスおよびその他のリケッチア症	35	11	2	—	—	—	—	—	
B16	マ ラ リ ア	5	2	2	—	—	—	1	—	
B17	梅毒および続発症	1 641	780	557	494	194	96	96	75	
B18	その他の伝染病および寄生虫病	7 079	3 410	2 118	1 410	1 067	1 242	1 219	1 226	
B18.a	癩	27	6	3	—	—	1	—	—	
B18.b	破 傷 風	550	313	203	125	54	33	30	31	
B18.c	敗 血 症	1 002	684	525	392	377	360	364	413	
B18.d	日 本 脳 炎	1 143	658	317	331	85	10	11	4	
B18.e	伝 染 性 肝 炎	251	268	182	85	242	500	464	474	
B18.f	カ ン ジ ダ 症	—	—	42	35	21	11	16	16	
B18.g	日 本 住 血 吸 虫 症	35	34	19	15	6	5	4	5	
B18.h	糸 状 虫 症	29	24	15	14	5	4	4	4	
B18.i	そ の 他	—	—	812	413	277	318	326	279	
B19	悪 性 新 生 物	31 758	36 498	42 875	47 637	52 903	59 461	60 898	62 684	
B19.a	食道の悪性新生物	802	871	995	1 088	1 150	1 135	1 166	1 184	
B19.b	胃の悪性新生物	12 188	14 407	16 467	17 749	19 170	19 454	19 555	19 806	
B19.c	肝臓の悪性新生物 ²⁾	2 578	3 700	3 613	3 497	3 608	3 793	3 972	4 062	
B19.d	膵臓の悪性新生物	198	477	825	1 318	1 850	2 480	2 499	2 657	
B19.e	気管、気管支および肺の悪性新生物	330	818	1 533	2 321	2 987	4 048	4 429	4 693	
B19.f	乳房の悪性新生物	1 419	1 572	1 683	1 966	2 486	3 262	3 347	3 570	
B19.g	子宮の悪性新生物	8 356	7 289	7 068	6 689	6 373	6 075	5 879	5 694	

注： 1). 2) 402ページの注を参照。

死亡数・率（人口10万対）（つづき）

of death (the 50 rubrics list for tabulation of mortality : B list) : Japan—con.

53年	死 亡 率									
	昭和25年	30年	35年	40年	45年	50年	51年	52年	53年	53年
320 196	1 032.8	722.8	692.2	643.1	619.0	574.0	568.7	551.5	550.6	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	
1	14.5	7.0	2.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
1 355	63.3	23.5	15.3	8.0	5.0	3.1	2.6	2.4	2.3	
2 137	107.3	36.4	22.5	13.7	8.8	5.1	4.4	4.0	3.7	
175	26.5	7.9	3.1	1.4	0.7	0.4	0.4	0.3	0.3	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1.3	0.9	0.5	0.0	0.0	0.0	—	0.0	—	
14	11.2	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	
—	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	—	
3	0.4	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
—	0.9	0.3	0.3	0.0	0.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
81	4.5	2.5	1.4	0.6	0.5	0.2	0.2	0.1	0.1	
—	0.1	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	
—	0.0	0.0	0.0	—	—	—	0.0	—	—	
68	3.9	1.7	1.2	1.0	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	
1 253	16.7	7.5	4.5	2.8	2.0	2.2	2.1	2.1	2.2	
1	0.1	0.0	0.0	—	—	0.0	—	—	0.0	
27	1.3	0.7	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	
456	2.4	1.5	1.1	0.8	0.7	0.6	0.6	0.7	0.8	
23	2.7	1.4	0.7	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	
422	0.6	0.6	0.4	0.2	0.5	0.9	0.8	0.8	0.7	
12	—	—	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
6	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
4	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
302	—	—	1.7	0.8	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	
64 706	74.9	80.4	90.2	95.2	100.7	105.2	106.7	108.8	111.3	
1 195	1.9	1.9	2.1	2.2	2.2	2.0	2.0	2.1	2.1	
19 428	28.8	31.7	34.6	35.5	36.5	34.4	34.3	34.4	33.4	
4 308	6.1	8.1	7.6	7.0	6.9	6.7	7.0	7.0	7.4	
2 913	0.5	1.1	1.7	2.6	3.5	4.4	4.4	4.6	5.0	
5 113	0.8	1.8	3.2	4.6	5.7	7.2	7.8	8.1	8.8	
3 755	3.3	3.5	3.5	3.9	4.7	5.8	5.9	6.2	6.5	
5 710	19.7	16.0	14.9	13.4	12.1	10.7	10.3	9.9	9.8	

表3 年次・死因 (B分類)・性別
Table 3 Trends of deaths and death rates (per 100,000 population) by sex and causes

女

国際50項目 死因分類番号	死 因 ¹⁾	死 亡 数								
		昭和25年	30年	35年	40年	45年	50年	51年	52年	53年
B19.h	白 血 病	508	824	1 155	1 394	1 554	1 843	1 844	1 884	1 884
B19.i	そ の 他	13 725	17 371	18 207	19 134	19 134
B20	良性および性質不詳の新生物	2 372	2 570	2 310	2 504	2 692	2 987	2 926	2 829	2 829
B21	糖 尿 病	1 029	1 171	1 713	2 652	3 889	4 655	4 836	4 959	4 959
B22	ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症	7 926	2 268	966	432	300	243	247	240	240
B23	貧 血	698	719	759	788	909	1 002	865	758	758
B24	髄 膜 炎	3 143	1 167	574	437	391	402	376	337	337
B25	活 動 性 リウマチ熱	545	486	676	440	331	227	209	170	170
B26	慢 性 リウマチ性心疾患	3 882	3 384	2 601	2 372	2 250	2 123	2 123
B27	高 血 圧 性 疾 患	5 296	4 688	7 755	9 811	9 880	11 148	11 209	11 078	11 078
B27.a	高 血 圧 性 心 疾 患	359	965	3 294	5 470	6 719	8 133	8 323	8 276	8 276
B27.b	その他の高血圧性疾患	4 937	3 723	4 461	4 341	3 161	3 015	2 886	2 802	2 802
B28	虚 血 性 心 疾 患	3 145	4 077	7 933	11 576	16 645	19 714	20 014	20 190	20 190
B29	そ の 他 の 心 疾 患	21 830	21 885	24 177	26 745	28 701	28 172	28 172
B29.a	心内膜の慢性疾患	6 556	4 195	2 864	1 867	1 701	1 536	1 536
B29.b	その他の心筋機能不全	2 247	4 988	7 718	11 088	16 701	21 126	23 420	23 072	23 072
B29.c	その他の心疾患	6 683	5 849	7 556	6 602	4 612	3 752	3 580	3 564	3 564
B30	脳 血 管 疾 患	53 540	58 767	71 144	80 050	84 405	84 443	84 556	83 222	83 222
B30.a	脳 出 血	...	50 672	54 504	47 522	38 654	29 763	28 340	26 494	26 494
B30.b	脳 硬 塞	...	3 859	9 564	20 429	28 399	34 417	35 262	36 206	36 206
B30.c	そ の 他	...	4 236	7 076	12 099	17 352	20 263	20 954	20 522	20 522
B31	イ ン フ ル エ ン ザ	631	274	1 869	2 417	1 723	707	1 328	354	354
B32	肺 炎	26 079	16 344	17 382	13 906	12 899	14 070	13 679	12 099	12 099
B33	気管支炎、肺気腫および喘息	5 850	5 158	5 048	4 512	4 512
B33.a	気 管 支 炎	6 308	2 377	2 080	1 822	1 904	1 960	1 883	1 711	1 711
B33.b	肺 気 腫	361	377	388	380	380
B33.c	喘 息	6 772	4 572	4 465	4 221	3 585	2 821	2 777	2 421	2 421
B34	消 化 性 潰 瘍	5 667	3 965	3 417	2 798	2 578	2 393	2 342	2 147	2 147
B35	虫 垂 炎	1 483	674	513	340	251	197	135	139	139
B36	腸閉塞およびヘルニア	2 712	2 054	1 943	1 662	1 493	1 331	1 310	1 286	1 286
B37	肝 硬 変	2 379	3 122	3 412	3 318	4 025	4 231	4 130	4 262	4 262
B38	腎炎およびネフローゼ	14 754	10 037	7 830	5 656	4 447	3 525	3 423	3 104	3 104
B38.a	急性腎炎およびネフローゼ	3 769	2 889	2 207	1 349	948	810	764	710	710
B38.b	そ の 他	10 985	7 148	5 623	4 307	3 499	2 715	2 659	2 394	2 394
B39	前立腺肥大症
B40	流産	4 117	3 095	2 097	1 597	41	21	16	11	11
B41	その他の妊娠、分娩、産褥の合併症および合併症の記載のない分娩	967	525	458	395	395
B42	出生時損傷、難産およびその他	2 987	2 070	1 947	2 360	2 680	2 708	2 694	2 664	2 664
B43	先産、無酸素症、低酸素症	1 040	695	1 020	1 276	1 423	1 352	1 316	1 158	1 158
B44	その他の周産期の死因	3 669	2 569	2 128	2 022	2 022

注： 1) 402ページの注を参照。

死亡数・率 (人口10万対) (つづき)
of death (the 50 rubrics list for tabulation of mortality : B list) : Japan-con.

53年	死 亡 率								
	昭和25年	30年	35年	40年	45年	50年	51年	52年	53年
1 849	1.2	1.8	2.4	2.8	3.0	3.3	3.2	3.3	3.2
20 435	26.1	30.7	31.9	33.2	35.1
2 858	5.6	5.7	4.9	5.0	5.1	5.3	5.1	4.9	4.9
5 053	2.4	2.6	3.6	5.3	7.4	8.2	8.5	8.6	8.7
225	18.7	5.0	2.0	0.9	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4
823	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.8	1.5	1.3	1.4
368	7.4	2.6	1.2	0.9	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6
155	1.3	1.1	1.4	0.9	0.6	0.4	0.4	0.3	0.3
2 184	8.2	6.8	5.0	4.2	3.9	3.7	3.8
10 717	12.5	10.3	16.3	19.6	18.8	19.7	19.6	19.2	18.4
8 131	0.8	2.1	6.9	10.9	12.8	14.4	14.6	14.4	14.0
2 586	11.6	8.2	9.4	8.7	6.0	5.3	5.1	4.9	4.4
20 433	7.4	9.0	16.7	23.1	31.7	34.9	35.1	35.0	35.1
29 526	45.9	43.7	46.0	47.3	50.3	48.9	50.8
1 457	13.8	8.4	5.5	3.3	3.0	2.7	2.5
24 466	5.3	11.0	16.2	22.2	31.8	37.4	41.0	40.0	42.1
3 603	15.8	12.9	15.9	13.2	8.8	6.6	6.3	6.2	6.2
82 144	126.3	129.4	149.6	160.0	160.7	149.4	148.1	144.4	141.3
25 057	...	111.6	114.6	95.0	73.6	52.7	49.6	46.0	43.1
36 628	...	8.5	20.1	40.8	54.1	60.9	61.8	62.8	63.0
20 459	...	9.3	14.9	24.2	33.0	35.8	36.7	35.6	35.2
339	1.5	0.6	3.9	4.8	3.3	1.3	2.3	0.6	0.6
12 588	61.5	36.0	36.6	27.8	24.6	24.9	24.0	21.0	21.6
4 563	11.1	9.1	8.8	7.8	7.8
1 856	14.9	5.2	4.4	3.6	3.6	3.5	3.3	3.0	3.2
387	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2 320	16.0	10.1	9.4	8.4	6.8	5.0	4.9	4.2	4.0
2 169	13.4	8.7	8.2	5.6	4.9	4.2	4.1	3.7	3.7
135	3.5	1.5	1.1	0.7	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2
1 273	6.4	4.5	4.1	3.3	2.8	2.4	2.3	2.2	2.2
4 399	5.6	6.9	7.2	6.6	7.7	7.5	7.2	7.4	7.6
3 294	34.8	22.1	16.5	11.3	8.5	6.2	6.0	5.4	5.7
793	8.9	6.4	4.6	2.7	1.8	1.4	1.3	1.2	1.4
2 501	25.9	15.7	11.8	8.6	6.7	4.8	4.7	4.2	4.3
11	9.7	6.8	4.4	3.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
367	1.8	0.9	0.8	0.7	0.6
2 541	7.0	4.6	4.1	4.7	5.1	4.8	4.7	4.6	4.4
1 066	2.5	1.5	2.1	2.6	2.7	2.4	2.3	2.0	1.8
1 677	7.0	4.5	3.7	3.5	2.9

表3 年次・死因 (B分類)・性別
Table 3 Trends of deaths and death rates (per 100,000 population) by sex and causes

女

国際50項目 死因分類番号	死 因 ¹⁾	死 亡 数							
		昭和25年	30年	35年	40年	45年	50年	51年	52年
B45	症状およびその他の診断名不明確の状態	44 673	44 837	40 111	37 182	30 387	23 050	22 510	21 559
B45.a	精神病の記載のない老衰	34 938	36 351	33 592	31 588	25 697	19 629	19 358	18 550
B45.b	その他	9 735	8 486	6 519	5 594	4 690	3 421	3 152	3 009
B46	その他のすべての疾患	25 803	24 789	24 117	23 230
B46.a	精神障害	2 279	2 055	2 020	1 774	1 658	1 369	1 401	1 261
B46.b	中枢神経系の非炎症性疾患	9 493	2 508	2 454	2 181	1 952	1 798	1 839	1 831
B46.c	その他の循環器系の疾患	2 079	1 885	2 128	2 536	2 838	3 076	2 984	3 072
B46.d	急性気管支炎および細気管支炎	4 918	1 836	2 193	1 601	1 454	1 246	1 138	966
B46.e	胃炎、十二指腸炎および慢性胃腸炎	8 462	4 621	3 825	3 215	2 303	1 948	1 813	1 621
B46.f	肝臓の疾患 (肝硬変を除く)	1 364	1 956	1 964	1 763	2 025	1 409	1 231	1 203
B46.g	その他	13 573	13 943	13 711	13 276
"BE"	不慮の事故、中毒および暴力の二重分類 (外因)	16 326	17 747	18 368	16 126	18 524	18 028	17 229	16 922
BE47	自動車事故	799	1 324	2 748	3 353	4 995	3 331	3 090	2 869
BE48	その他の不慮の事故	8 268	7 033	6 429	6 161	5 695	5 514	5 163	5 076
BE48.a	自動車以外の交通事故	948	932	839	664	472	394	308	315
BE48.b	不慮の墜落	569	687	1 041	1 120	1 302	1 560	1 470	1 341
BE48.c	火災および火傷による不慮の事故	809	646	584	649
BE48.d	天災	202	75	110	85	24	71	78	15
BE48.e	不慮の溺死	3 278	2 560	1 699	1 535	1 196	1 149	1 084	1 073
BE48.f	工業性の不慮の事故	424	390	337	301
BE48.g	その他	1 468	1 304	1 302	1 382
BE49	自殺	6 491	8 641	8 637	6 114	6 967	8 231	8 042	7 970
BE50	その他の外因	867	952	934	1 007
BE50.a	他殺	768	749	548	496	501	560	581	563
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害	364	391	351	443
BE50.c	法的介入および戦争行為 (再掲)	—	—	6	2	2	1	2	1
B1~B18	伝染病および寄生虫病	106 494	40 271	24 376	13 973	9 199	6 395	5 690	5 273
B5, B6	全結核	56 680	20 134	12 190	7 585	4 985	3 161	2 743	2 494
B25~B30, B38.b, B46.c, B26, B28, B29	脳心腎血管疾患	91 926	100 043	120 971	133 989	144 376	150 440	152 582	150 421
	心疾患	27 269	27 069	33 645	36 845	43 423	48 831	50 965	50 485
B26, B29.a B32, B33.a B46.d	慢性リウマチ性心疾患および心内膜の慢性疾患	15 194	12 155	10 438	7 579	5 465	4 239	3 951	3 659
B33.a, B46.d	肺炎および気管支炎	37 305	20 557	21 655	17 329	16 257	17 276	16 700	14 776
B40, B41	気管支炎	11 226	4 213	4 273	3 423	3 358	3 206	3 021	2 677
B4, B46.e	妊娠、分娩および産褥の合併症	4 117	3 095	2 097	1 597	1 008	546	474	406
BE47, BE48	胃腸炎	35 300	15 307	11 085	7 200	4 951	3 726	3 285	3 008
	不慮の事故	9 067	8 357	9 177	9 514	10 690	8 845	8 253	7 945

注: 1) 402ページの注を参照。

死亡数・率 (人口10万対) (つづき)
of death (the 50 rubrics list for tabulation of mortality : B list) : Japan—con.

53年	死 亡 率								
	昭和25年	30年	35年	40年	45年	50年	51年	52年	53年
20 766	105.4	98.7	84.4	74.3	57.9	40.8	39.4	37.4	35.7
18 069	82.4	80.0	70.7	63.1	48.9	34.7	33.9	32.2	31.1
2 697	23.0	18.7	13.7	11.2	8.9	6.1	5.5	5.2	4.6
23 980	49.1	43.9	42.2	40.3	41.2
1 253	5.4	4.5	4.2	3.5	3.2	2.4	2.5	2.2	2.2
1 955	22.4	5.5	5.2	4.4	3.7	3.2	3.2	3.2	3.4
3 035	4.9	4.2	4.5	5.1	5.4	5.4	5.2	5.3	5.2
984	11.6	4.0	4.6	3.2	2.8	2.2	2.0	1.7	1.7
1 548	20.0	10.2	8.0	6.4	4.4	3.4	3.2	2.8	2.7
1 219	3.2	4.3	4.1	3.5	3.9	2.5	2.2	2.1	2.1
13 986	25.8	24.7	24.0	23.0	24.1
16 748	38.5	39.1	38.6	32.2	35.3	31.9	30.2	29.4	28.8
2 912	1.9	2.9	5.8	6.7	9.5	5.9	5.4	5.0	5.0
5 056	19.5	15.5	13.5	12.3	10.8	9.8	9.0	8.8	8.7
296	2.2	2.1	1.8	1.3	0.9	0.7	0.5	0.5	0.5
1 416	1.3	1.5	2.2	2.2	2.5	2.8	2.6	2.3	2.4
644	1.5	1.1	1.0	1.1	1.1
32	0.5	0.2	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1
995	7.7	5.6	3.6	3.1	2.3	2.0	1.9	1.9	1.7
329	0.8	0.7	0.6	0.5	0.6
1 344	2.8	2.3	2.3	2.4	2.3
7 790	15.3	19.0	18.2	12.2	13.3	14.6	14.1	13.8	13.4
990	1.7	1.7	1.6	1.7	1.7
552	1.8	1.6	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
438	0.7	0.7	0.6	0.8	0.8
—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
5 088	251.2	88.7	51.3	27.9	17.5	11.3	10.0	9.1	8.7
2 312	133.7	44.3	25.6	15.2	9.5	5.6	4.8	4.3	4.0
150 695	216.9	220.3	254.5	267.8	274.9	266.1	267.3	261.0	259.2
52 143	64.3	59.6	70.8	73.6	82.7	86.4	89.3	87.6	89.7
3 641	35.8	26.8	22.0	15.1	10.4	7.5	6.9	6.3	6.3
15 428	88.0	45.3	45.6	34.6	31.0	30.6	29.3	25.6	26.5
2 840	26.5	9.3	9.0	6.8	6.4	5.7	5.3	4.6	4.9
378	9.7	6.8	4.4	3.2	1.9	1.0	0.8	0.7	0.7
2 903	83.3	33.7	23.3	14.4	9.4	6.6	5.8	5.2	5.0
7 968	21.4	18.4	19.3	19.0	20.4	15.6	14.5	13.8	13.7