

表 5.25 悪性新生物の主要部位¹⁾別にみた性・
Table 5.25 Trends of death rates (per 100,000 population)

男 (6-1) 29胃の悪性新生物
Male Malignant neoplasm of stomach

年 齢 Age	1950 昭和25年	1955 30年	1960 35年	1965 40年	1970 45年	1975 50年	1980 *55年	1981 56年	1982 57年	1983 58年	1984 59年	1985 60年	1986 61年
総 数 Total	46.6	52.2	57.3	59.4	58.8	55.6	53.9	53.6	51.7	52.4	52.5	51.1	50.7
0~4歳Years	0.1	—	—	0.0	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—
5~9	0.1	0.0	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—
10~14	0.2	—	0.0	0.0	—	0.0	—	—	—	—	0.0	—	—
15~19	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2	0.1	0.1	0.0	0.3	0.2	0.1	0.0
20~24	0.7	0.7	1.1	1.6	1.4	1.3	0.7	0.8	0.7	0.7	0.5	0.5	0.4
25~29	2.3	2.8	3.1	3.8	3.6	3.0	2.3	2.0	2.2	2.4	2.3	2.2	1.4
30~34	7.0	7.0	8.0	8.5	8.4	6.7	5.7	5.7	5.3	4.7	4.8	4.3	4.1
35~39	15.1	17.0	17.0	16.4	15.3	13.4	11.5	10.5	9.3	9.1	9.6	8.4	8.5
40~44	35.8	36.7	34.7	28.6	27.8	24.4	19.3	19.2	19.0	17.7	16.7	16.0	16.2
45~49	69.6	73.4	67.2	58.8	52.4	45.0	39.4	36.9	34.9	36.1	30.6	29.4	28.2
50~54	128.3	128.0	121.9	110.5	93.3	74.0	69.8	66.9	61.3	65.0	61.2	56.5	53.8
55~59	219.3	211.3	206.2	189.9	159.2	139.5	105.5	108.2	103.5	101.9	102.5	95.9	93.6
60~64	324.6	336.2	317.8	307.2	267.8	218.3	186.4	179.3	167.6	159.4	159.5	147.6	139.1
65~69	435.3	456.4	467.2	449.8	412.0	341.1	289.0	274.4	260.9	250.0	243.7	230.5	230.2
70~74	463.6	546.2	597.8	568.1	545.1	489.1	417.0	402.5	371.4	360.2	346.6	333.2	319.3
75~79	397.1	509.3	607.6	666.1	640.1	602.0	560.7	536.3	507.5	496.8	489.9	471.7	443.7
80~	260.6	330.9	449.9	499.2	539.0	607.6	607.1	616.3	589.8	612.7	627.8	607.5	586.0

女 (8-1) 29胃の悪性新生物
Female Malignant neoplasm of stomach

年 齢 Age	1950 昭和25年	1955 30年	1960 35年	1965 40年	1970 45年	1975 50年	1980 *55年	1981 56年	1982 57年	1983 58年	1984 59年	1985 60年	1986 61年
総 数 Total	28.8	31.7	34.6	35.5	36.7	34.4	33.2	32.3	31.7	31.1	31.1	30.6	29.5
0~4歳Years	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5~9	0.1	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10~14	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	—
15~19	0.2	0.2	0.2	0.2	0.5	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0
20~24	1.0	1.0	1.3	1.4	1.6	1.4	1.1	1.1	0.7	1.1	0.9	0.5	0.5
25~29	3.4	3.1	3.7	4.7	5.2	4.6	4.0	4.1	3.3	3.1	3.4	3.2	2.7
30~34	8.5	8.7	10.3	10.5	9.2	10.1	8.1	7.9	7.6	7.0	7.1	6.5	6.1
35~39	15.5	17.7	18.2	17.9	16.0	15.0	13.5	12.8	12.4	11.7	11.7	10.6	10.6
40~44	29.7	29.9	31.2	26.5	25.7	21.4	17.9	17.7	17.1	17.0	15.9	15.2	14.3
45~49	45.4	44.0	45.0	42.2	37.8	31.2	24.8	25.9	23.1	22.4	22.5	21.0	20.9
50~54	69.8	69.3	64.7	63.9	53.9	45.1	35.6	33.0	32.6	33.5	30.1	28.1	27.8
55~59	108.7	104.8	96.7	88.6	82.5	64.0	52.9	50.5	46.8	46.2	42.1	39.8	37.6
60~64	158.3	153.6	142.1	128.9	119.6	97.2	80.9	71.7	71.8	65.2	62.6	63.2	53.8
65~69	219.4	223.0	208.7	192.9	177.0	145.6	116.5	108.0	102.2	98.1	93.9	88.4	80.4
70~74	235.0	264.2	282.8	275.0	253.0	211.3	173.9	162.5	154.8	143.8	138.3	132.2	124.8
75~79	229.4	284.1	321.3	316.1	317.2	279.0	250.9	240.9	222.5	200.7	208.2	199.2	174.2
80~	160.0	228.3	286.5	286.1	300.1	297.9	302.7	297.7	288.8	290.2	290.7	285.0	279.4

注: 1) 表頭の死因名等は第9回簡単分類による。
2) 31肝臓の昭和25, 30年は「胆路および肝臓」である。
*55年は「国勢調査確定数」により再計算したものである。(以下同様)

年齢・年次別死亡率 (人口10万対)

from malignant neoplasms by sex, age and site : Japan

男 (6-2) 30直腸, 直腸S状結腸移行部及び肛門の悪性新生物
Male Malignant neoplasms of rectum, rectosigmoid junction and anus

年 齢 Age	1950 昭和25年	1955 30年	1960 35年	1965 40年	1970 45年	1975 50年	1980 *55年	1981 56年	1982 57年	1983 58年	1984 59年	1985 60年	1986 61年
総 数 Total	2.9	3.1	3.2	4.1	5.0	5.8	6.9	7.2	7.1	7.4	7.6	7.9	8.0
0~4歳Years	—	0.0	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5~9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10~14	—	0.0	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15~19	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	—	—
20~24	0.1	0.1	0.2	0.6	0.4	0.2	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0
25~29	0.6	0.3	0.1	0.5	1.1	0.6	0.4	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3
30~34	0.8	0.6	0.7	0.9	1.2	1.5	0.9	0.9	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6
35~39	1.3	1.2	0.6	1.0	2.1	2.2	2.1	1.9	1.3	1.8	1.7	1.6	1.5
40~44	1.9	2.3	2.0	1.9	2.8	3.2	3.6	2.8	2.4	2.8	3.2	3.3	3.2
45~49	4.8	3.8	2.7	4.2	4.4	4.9	6.0	5.6	5.7	6.4	5.4	5.5	6.4
50~54	7.0	4.9	4.9	6.4	7.1	6.4	9.2	9.7	10.0	9.6	9.5	10.3	10.4
55~59	11.5	9.6	8.9	10.7	12.0	12.2	12.0	14.9	13.7	15.6	15.4	16.2	15.9
60~64	17.8	17.2	17.4	17.7	19.2	19.9	19.9	20.6	21.7	19.2	22.6	21.1	21.9
65~69	25.0	25.8	23.6	29.3	30.5	32.2	32.4	32.8	30.4	30.6	32.4	31.7	30.1
70~74	34.4	39.2	41.1	39.5	44.1	47.2	51.9	48.8	46.7	47.1	45.9	46.9	46.1
75~79	38.5	46.2	44.6	52.9	59.5	65.6	69.6	71.7	69.7	67.9	68.8	68.5	60.4
80~	19.3	37.0	46.5	67.5	69.4	79.8	94.2	96.3	97.9	95.4	92.7	94.7	95.4

女 (8-2) 30直腸, 直腸S状結腸移行部及び肛門の悪性新生物
Female Malignant neoplasms of rectum, rectosigmoid junction and anus

年 齢 Age	1950 昭和25年	1955 30年	1960 35年	1965 40年	1970 45年	1975 50年	1980 *55年	1981 56年	1982 57年	1983 58年	1984 59年	1985 60年	1986 61年
総 数 Total	2.5	2.8	3.2	3.6	4.1	4.9	5.0	5.3	5.3	5.5	5.5	5.4	5.6
0~4歳Years	0.0	0.0	0.0	—	0.0	—	—	—	—	—	—	0.0	—
5~9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
10~14	—	—	0.0	0.0	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—
15~19	—	0.1	0.1	—	0.0	—	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	—	—
20~24	0.1	0.2	0.1	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1
25~29	0.4	0.3	0.3	0.6	0.9	0.4	0.3	0.1	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1
30~34	1.0	0.3	0.5	0.9	1.3	1.3	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5	0.4
35~39	1.7	1.1	1.1	1.2	1.6	2.0	1.7	1.8	1.5	1.2	1.1	0.9	1.3
40~44	3.0	2.9	2.0	2.3	2.3	2.6	2.8	2.6	2.4	2.4	3.2	2.4	2.6
45~49	4.5	3.5	4.0	3.9	3.3	4.3	4.0	3.8	3.7	4.0	4.4	4.0	3.9
50~54	6.9	6.7	6.0	5.6	7.0	6.1	6.0	5.8	5.8	6.5	6.4	5.9	6.0
55~59	10.2	10.1	9.6	9.2	8.3	9.6	7.9	8.5	7.5	8.2	8.5	8.1	7.9
60~64	12.6	13.5	13.3	11.6	11.9	12.3	11.4	11.7	11.7	12.5	12.1	11.3	11.6
65~69	18.2	17.1	18.5	19.9	19.4	18.8	15.8	17.3	17.0	17.7	17.2	15.7	17.3
70~74	18.6	21.8	29.0	28.5	27.1	30.8	26.5	27.1	26.9	22.1	22.6	23.8	21.5
75~79	15.3	27.2	33.7	36.5	41.8	41.0	40.8	38.8	37.0	40.1	32.5	33.1	31.9
80~	15.8	23.0	28.1	37.1	42.4	53.3	53.6	56.9	54.4	56.1	54.5	51.7	51.9

表 5.25 悪性新生物の主要部位¹⁾別にみた性・
Table 5.25 Trends of death rates (per 100,000 population)

男 (6-3) 31肝の悪性新生物
Male Malignant neoplasm of liver

年 齢 Age	1950 昭和25年 ²⁾	1955 30年 ²⁾	1960 35年	1965 40年	1970 45年	1975 50年	1980 *55年	1981 56年	1982 57年	1983 58年	1984 59年	1985 60年	1986 61年
総 数 Total	8.8	11.1	11.3	10.4	11.7	12.4	17.5	18.5	20.1	21.6	22.7	24.2	25.4
0~4歳 Years	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4
5~9	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1
10~14	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	—	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
15~19	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0
20~24	0.2	0.2	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2
25~29	0.3	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3	0.2
30~34	1.4	1.4	1.1	0.9	0.9	1.4	1.3	1.4	1.4	1.3	1.4	1.1	0.9
35~39	2.5	3.7	2.4	2.8	3.1	2.6	3.1	3.6	3.1	2.7	3.5	3.7	3.4
40~44	7.4	7.7	6.3	6.3	6.5	6.9	6.5	6.8	6.7	7.1	6.6	7.5	7.6
45~49	13.4	16.1	12.5	13.1	12.5	13.5	21.0	19.9	22.3	19.7	19.6	18.1	15.7
50~54	27.0	28.7	28.6	20.5	23.7	23.4	38.1	40.1	45.2	45.6	48.5	51.7	50.7
55~59	38.9	43.1	42.6	33.0	37.4	38.9	51.5	54.9	59.3	65.4	68.5	74.0	80.5
60~64	61.6	69.7	64.1	53.3	51.0	51.0	72.0	70.5	72.1	76.5	79.2	90.1	91.0
65~69	79.8	94.6	83.9	71.7	77.2	74.1	82.4	91.6	93.1	95.5	101.7	101.4	109.3
70~74	79.6	114.7	115.3	90.0	94.5	92.3	110.4	107.5	117.0	123.8	119.8	121.7	121.7
75~79	84.4	110.8	127.2	114.9	115.5	101.0	118.8	125.9	129.4	142.8	139.6	145.6	146.3
80~	51.5	89.1	84.7	112.7	111.7	111.7	129.2	126.8	137.1	154.4	159.9	154.7	156.9

女 (8-3) 31肝の悪性新生物
Female Malignant neoplasm of liver

年 齢 Age	1950 昭和25年 ²⁾	1955 30年 ²⁾	1960 35年	1965 40年	1970 45年	1975 50年	1980 *55年	1981 56年	1982 57年	1983 58年	1984 59年	1985 60年	1986 61年
総 数 Total	6.1	8.1	7.6	7.0	6.9	6.7	7.6	8.0	8.1	8.4	8.7	9.1	9.2
0~4歳 Years	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.5	0.3	0.3	0.0	0.3	0.3
5~9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	0.0
10~14	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0
15~19	—	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
20~24	0.1	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1
25~29	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.1
30~34	1.0	1.3	0.7	0.9	0.7	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.2
35~39	1.5	2.4	2.0	1.5	1.3	1.2	1.1	0.9	0.9	1.0	0.7	0.7	0.7
40~44	4.8	5.6	4.3	3.0	2.7	2.4	2.1	1.5	1.7	1.5	1.5	1.6	1.5
45~49	8.2	10.5	7.9	6.5	5.3	4.5	3.6	4.4	3.4	3.1	3.2	3.5	2.6
50~54	15.9	18.0	13.1	11.0	9.4	7.8	6.5	7.3	7.4	7.6	6.9	6.8	6.5
55~59	23.2	26.5	20.8	18.0	15.7	13.1	13.0	12.3	12.7	13.2	12.5	13.9	14.2
60~64	37.6	43.3	36.7	28.3	24.0	20.9	20.4	21.8	21.4	22.3	22.7	23.9	22.2
65~69	47.1	60.6	49.8	45.4	37.5	32.9	31.9	31.9	32.5	31.9	33.4	33.0	36.0
70~74	52.1	76.9	70.0	57.5	54.0	47.5	47.9	48.2	45.8	47.2	44.2	47.2	44.8
75~79	56.9	78.5	80.3	74.8	71.6	59.6	63.7	65.1	62.4	63.5	64.9	65.9	59.4
80~	37.7	56.3	69.4	60.5	61.1	62.4	69.7	75.5	76.2	72.1	80.4	76.7	80.0

注： 1), 2) 254ページ同番号の注を参照されたい。

年齢・年次別死亡率 (人口10万対) (つづき)
from malignant neoplasms by sex, age and site : Japan—con.

男 (6-4) 32膵の悪性新生物
Male Malignant neoplasm of pancreas

年 齢 Age	1950 昭和25年	1955 30年	1960 35年	1965 40年	1970 45年	1975 50年	1980 *55年	1981 56年	1982 57年	1983 58年	1984 59年	1985 60年	1986 61年
総 数 Total	0.8	1.4	2.5	3.6	5.1	5.8	7.8	8.3	8.7	8.9	9.2	10.1	10.6
0~4歳 Years	—	0.0	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—
5~9	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—
10~14	0.0	—	—	—	0.1	0.0	—	—	—	—	—	—	—
15~19	—	—	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	0.0
20~24	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	—
25~29	—	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1
30~34	0.3	0.3	0.3	0.6	0.6	0.4	0.4	0.6	0.6	0.4	0.7	0.4	0.4
35~39	0.6	0.6	0.9	0.9	1.4	1.1	1.4	1.0	1.4	1.1	1.2	0.9	1.1
40~44	1.4	1.5	1.9	1.9	2.4	2.2	3.1	2.6	2.3	2.5	2.2	2.8	3.2
45~49	1.7	2.3	4.4	4.5	4.2	5.2	6.1	5.6	5.0	4.9	5.1	6.3	5.7
50~54	2.7	5.0	6.6	9.1	10.1	9.7	10.9	12.2	9.8	11.2	10.5	11.5	10.0
55~59	4.7	7.0	11.1	13.4	18.2	17.0	19.1	18.8	19.4	19.8	18.6	20.8	20.2
60~64	6.2	9.3	13.9	20.6	25.7	26.6	32.3	28.9	32.5	31.6	32.3	32.1	32.3
65~69	4.0	11.8	20.4	25.5	36.9	38.8	45.2	49.8	48.8	50.5	48.2	51.4	52.8
70~74	3.7	9.9	17.3	30.2	42.6	47.6	57.6	63.3	64.8	69.2	68.1	70.1	71.9
75~79	1.5	5.6	19.6	28.5	35.2	52.0	71.2	76.2	82.8	80.2	81.2	91.0	93.3
80~	2.4	2.3	8.9	20.3	32.0	38.9	64.1	67.8	78.9	71.8	83.9	92.8	103.4

女 (8-4) 32膵の悪性新生物
Female Malignant neoplasm of pancreas

年 齢 Age	1950 昭和25年	1955 30年	1960 35年	1965 40年	1970 45年	1975 50年	1980 *55年	1981 56年	1982 57年	1983 58年	1984 59年	1985 60年	1986 61年
総 数 Total	0.5	1.1	1.7	2.6	3.5	4.4	5.7	5.9	6.2	6.7	6.7	7.3	8.0
0~4歳 Years	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—
5~9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	—
10~14	0.0	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—
15~19	—	—	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	—	0.0
20~24	0.1	—	0.0	0.0	0.1	0.1	—	0.1	—	—	0.1	0.1	0.1
25~29	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2
30~34	0.2	0.2	0.4	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	0.3	0.3	0.1
35~39	0.3	0.7	0.4	0.5	0.8	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6
40~44	0.6	1.5	1.3	1.7	1.5	1.4	1.3	1.6	1.3	1.5	1.4	1.6	1.4
45~49	1.0	1.8	2.6	3.0	2.9	3.5	3.0	2.9	2.8	3.1	2.7	3.0	2.7
50~54	1.1	2.6	5.0	5.3	5.9	6.6	5.9	5.8	5.5	6.2	5.4	5.0	4.7
55~59	3.0	5.0	7.4	10.3	9.4	10.0	9.3	10.0	10.7	10.6	8.9	9.4	9.6
60~64	3.3	5.4	8.2	14.0	15.6	15.5	17.7	16.1	17.0	16.8	16.0	17.2	17.4
65~69	2.4	8.1	12.7	17.2	21.2	23.2	26.7	25.5	26.6	26.8	28.0	26.1	26.4
70~74	1.6	5.8	11.6	15.9	27.2	31.0	40.3	38.1	38.8	37.8	38.7	43.6	43.4
75~79	1.4	5.1	9.5	18.5	26.9	36.6	42.1	45.9	50.0	51.6	52.8	55.6	57.7
80~	1.2	2.9	5.4	9.5	15.1	24.6	39.6	44.2	46.1	55.9	55.3	60.6	76.0

表 5.25 悪性新生物の主要部位¹⁾別にみた性・

Table 5.25 Trends of death rates (per 100,000 population)

男 (6-5) 33気管, 気管支及び肺の悪性新生物
Male Malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung

年 齢 Age	1950 昭和25年	1955 30年	1960 35年	1965 40年	1970 45年	1975 50年	1980 *55年	1981 56年	1982 57年	1983 58年	1984 59年	1985 60年	1986 61年
総 数 Total	1.9	4.3	7.9	11.2	14.9	19.6	27.0	28.9	30.2	31.9	33.8	35.3	36.1
0~4歳 Years	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	0.0
5~9	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	0.0
10~14	0.1	0.1	—	0.1	—	—	0.0	—	0.0	0.0	—	—	—
15~19	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1
20~24	0.1	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2
25~29	0.2	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3
30~34	0.1	0.5	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9	1.1	1.3	1.1	1.2	0.9	1.1
35~39	0.4	0.8	1.1	1.8	1.6	1.9	2.5	2.2	2.1	2.4	2.7	2.9	2.8
40~44	0.9	2.0	2.7	3.6	4.6	4.9	5.0	5.2	4.9	4.2	5.3	6.1	5.7
45~49	2.1	4.9	7.7	8.5	8.5	11.4	11.2	11.5	11.3	11.1	10.7	11.1	11.2
50~54	4.9	10.1	15.8	18.7	20.2	20.8	26.4	25.6	25.8	26.7	27.3	25.2	24.3
55~59	7.7	15.5	30.5	32.0	40.9	43.9	48.8	49.1	51.4	54.4	53.8	53.6	54.5
60~64	13.7	29.5	46.5	66.3	72.1	79.7	96.0	95.1	95.2	97.3	102.2	98.8	97.3
65~69	21.9	43.2	71.4	93.1	125.9	139.4	157.2	170.2	174.4	172.5	180.9	179.1	176.6
70~74	20.4	51.5	86.9	118.5	156.5	210.5	252.7	267.9	269.7	272.1	275.7	284.5	280.7
75~79	21.3	36.3	81.8	126.1	158.0	238.3	329.1	346.4	355.2	371.8	386.9	403.1	384.4
80~	7.2	24.3	55.9	87.0	112.0	173.4	298.3	322.7	342.7	377.9	395.5	422.3	436.9

女 (8-5) 33気管, 気管支及び肺の悪性新生物
Female Malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung

年 齢 Age	1950 昭和25年	1955 30年	1960 35年	1965 40年	1970 45年	1975 50年	1980 *55年	1981 56年	1982 57年	1983 58年	1984 59年	1985 60年	1986 61年
総 数 Total	0.8	1.8	3.2	4.6	5.7	7.2	9.9	10.3	11.1	11.6	12.3	12.7	13.1
0~4歳 Years	—	0.0	0.0	—	—	0.0	0.0	0.0	—	—	—	0.0	0.0
5~9	—	0.1	0.0	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—
10~14	0.1	0.0	0.0	—	0.0	—	—	0.0	—	—	—	—	—
15~19	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	—	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
20~24	0.0	0.1	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3
25~29	0.1	0.2	0.1	0.3	0.2	0.3	0.3	0.5	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3
30~34	0.2	0.6	0.8	0.9	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	1.1	0.4	0.7
35~39	0.4	1.1	1.3	1.8	1.2	1.7	1.7	1.9	1.8	1.9	1.5	1.8	2.1
40~44	0.8	1.9	1.8	2.7	2.9	2.4	2.9	3.8	3.6	3.4	3.3	3.3	3.5
45~49	1.1	3.0	4.9	3.9	5.2	5.4	5.1	4.9	5.4	5.4	6.0	5.3	5.4
50~54	2.7	4.4	6.4	9.3	8.0	9.4	9.6	8.6	9.2	9.3	10.2	9.4	9.9
55~59	3.6	6.6	10.5	14.1	14.2	15.9	15.9	15.9	15.9	14.7	16.5	16.4	15.7
60~64	4.1	9.4	16.7	20.7	24.7	23.3	27.4	26.7	27.1	27.0	26.3	28.0	25.2
65~69	5.0	13.2	22.1	27.8	32.4	35.8	42.1	43.5	42.9	43.9	45.0	43.6	44.8
70~74	5.9	14.1	23.3	35.9	41.1	51.1	63.7	62.4	70.8	68.6	67.1	66.1	69.4
75~79	4.5	9.4	25.4	41.8	46.1	58.5	84.4	84.5	88.1	93.8	95.7	96.8	95.0
80~	2.8	5.9	18.6	26.7	40.1	53.8	82.6	91.7	96.3	103.6	112.2	116.7	115.9

注: 1) 254ページの注を参照されたい。

年齢・年次別死亡率 (人口10万対) (つづき)

from malignant neoplasms by sex, age and site: Japan—con.

男 (6-6) 36白血 病
Male Leukaemia

年 齢 Age	1950 昭和25年	1955 30年	1960 35年	1965 40年	1970 45年	1975 50年	1980 *55年	1981 56年	1982 57年	1983 58年	1984 59年	1985 60年	1986 61年
総 数 Total	1.8	2.8	3.2	3.7	4.0	4.2	4.6	4.7	4.8	4.8	5.0	5.1	5.2
0~4歳 Years	2.4	4.1	4.5	4.4	4.6	3.9	2.8	2.7	2.3	2.0	1.9	1.3	1.7
5~9	1.5	2.8	2.9	3.7	3.5	3.5	3.3	3.1	2.6	2.7	2.3	2.6	2.5
10~14	1.5	2.3	2.8	3.0	2.3	2.3	2.6	2.7	1.9	2.1	2.1	2.2	2.2
15~19	1.7	2.5	2.8	3.3	3.2	2.8	2.5	2.5	2.5	2.5	2.0	2.7	1.8
20~24	1.2	2.1	2.4	2.7	2.4	2.6	2.0	1.9	2.3	1.9	2.0	2.2	1.7
25~29	1.3	2.3	2.2	2.6	2.7	2.4	2.8	2.0	2.0	2.8	2.0	2.1	2.3
30~34	1.7	2.2	2.4	2.4	2.9	3.4	2.4	3.0	2.4	3.1	2.7	2.8	2.3
35~39	1.7	2.6	2.5	3.2	3.4	3.5	3.5	3.1	3.3	3.2	3.1	3.4	3.2
40~44	1.9	3.4	3.5	3.0	3.9	4.0	4.0	4.2	3.8	3.3	4.1	3.8	3.8
45~49	2.1	3.0	3.7	4.6	5.1	4.9	4.9	5.2	4.8	4.0	4.8	4.8	4.3
50~54	2.3	2.8	4.0	4.9	5.1	5.6	5.7	5.5	6.6	6.1	7.7	5.8	6.8
55~59	1.9	3.3	5.4	5.2	6.2	6.4	7.1	7.1	7.8	7.3	8.2	7.5	8.9
60~64	2.5	3.2	4.6	7.1	7.5	8.5	8.4	9.4	11.1	10.1	10.5	10.2	12.1
65~69	2.0	3.0	5.0	7.0	9.0	10.2	12.5	13.3	15.5	14.7	14.4	14.6	16.9
70~74	0.7	2.9	5.6	5.2	9.7	11.7	16.8	16.1	17.7	17.5	20.4	20.4	20.6
75~79	1.9	1.8	3.2	5.1	8.0	13.1	19.6	22.2	23.4	22.2	22.5	25.8	23.0
80~	0.8	0.6	3.5	2.3	3.9	9.3	20.1	21.0	19.1	23.2	22.8	25.1	26.6

女 (8-6) 36白血 病
Female Leukaemia

年 齢 Age	1950 昭和25年	1955 30年	1960 35年	1965 40年	1970 45年	1975 50年	1980 *55年	1981 56年	1982 57年	1983 58年	1984 59年	1985 60年	1986 61年
総 数 Total	1.2	1.8	2.4	2.8	3.0	3.3	3.3	3.3	3.5	3.5	3.7	3.6	3.7
0~4歳 Years	2.0	2.7	3.7	3.5	3.6	3.1	2.0	1.7	1.5	1.8	1.5	1.4	1.5
5~9	1.0	1.8	2.2	2.7	2.8	2.7	2.3	2.1	2.1	1.6	1.8	1.7	1.5
10~14	1.1	1.8	2.1	2.4	2.3	1.9	1.9	1.7	1.8	1.4	1.8	1.6	1.7
15~19	1.0	1.4	2.0	2.6	2.3	2.2	2.2	1.5	1.8	1.8	1.9	1.7	1.4
20~24	1.0	1.4	2.1	1.8	2.0	2.0	1.7	2.1	1.5	1.4	1.8	1.3	1.3
25~29	1.1	1.9	1.7	2.0	1.8	2.1	1.5	1.6	1.7	1.7	1.2	1.5	1.6
30~34	0.7	1.2	2.6	2.1	1.6	2.5	2.2	2.2	2.4	2.1	2.4	1.9	1.7
35~39	1.3	1.7	2.4	2.8	2.7	2.4	2.5	2.6	2.3	2.5	2.3	2.3	2.0
40~44	1.0	2.3	2.6	2.9	3.0	3.1	3.4	2.8	2.8	2.6	2.9	3.0	2.8
45~49	1.5	2.2	3.3	3.3	4.2	3.5	3.3	3.5	3.1	3.9	3.6	3.6	4.3
50~54	1.6	1.9	2.3	3.7	2.9	4.1	4.5	4.1	3.8	4.5	4.5	4.7	4.1
55~59	1.2	2.3	2.9	4.1	5.6	5.6	4.3	4.9	5.6	5.5	6.0	5.4	4.7
60~64	1.4	1.9	2.9	4.6	5.1	5.4	6.0	6.4	5.9	6.6	5.6	6.4	6.6
65~69	1.1	1.7	3.3	3.8	5.2	6.8	7.2	7.6	7.6	8.9	9.1	7.6	8.6
70~74	0.8	1.3	1.8	3.3	5.5	6.4	8.4	8.5	10.7	9.1	11.6	9.9	11.7
75~79	—	0.4	2.2	3.1	2.6	8.6	9.4	11.0	13.5	10.8	13.0	12.9	13.0
80~	—	—	0.7	0.8	2.3	4.3	7.8	8.6	10.3	10.9	13.1	12.3	15.0

表 5.25 悪性新生物の主要部位¹⁾別にみた性・
Table 5.25 Trends of death rates (per 100,000 population)女 (8-7) 34乳房の悪性新生物
Female Malignant neoplasm of breast

年 齢 Age	1950 昭和25年	1955 30年	1960 35年	1965 40年	1970 45年	1975 50年	1980 *55年	1981 56年	1982 57年	1983 58年	1984 59年	1985 60年	1986 61年
総 数 Total	3.3	3.5	3.5	3.9	4.8	5.8	7.0	7.3	7.2	7.3	7.9	8.0	8.3
0~4歳 Years	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5~9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10~14	—	0.0	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—
15~19	—	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	—
20~24	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2
25~29	0.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	1.0	1.0	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8
30~34	1.8	1.8	1.6	1.7	2.0	2.3	2.5	2.8	2.7	2.9	2.8	3.0	2.8
35~39	3.6	4.3	4.1	4.0	4.2	4.6	5.5	5.0	5.2	5.3	5.4	5.5	5.7
40~44	7.0	6.4	6.4	6.8	7.3	8.6	8.6	8.4	8.5	8.7	9.3	9.5	10.1
45~49	9.0	8.7	9.5	9.4	10.7	12.3	13.3	13.4	11.8	12.8	13.8	13.1	14.6
50~54	10.9	10.1	9.6	12.6	13.1	17.1	17.2	18.4	16.7	16.4	18.5	18.0	18.2
55~59	13.6	11.6	11.5	12.6	14.3	16.4	19.9	20.5	20.5	18.7	21.9	20.7	20.3
60~64	15.2	13.6	10.3	11.9	14.0	15.8	17.2	21.1	19.4	19.9	19.3	19.9	21.2
65~69	15.0	14.7	11.9	12.9	12.6	14.6	18.2	17.3	18.5	17.4	18.0	19.1	18.5
70~74	14.8	16.9	15.6	12.6	15.2	14.8	18.0	17.6	17.5	16.0	18.2	19.7	17.7
75~79	17.0	18.4	17.8	12.7	14.2	15.4	18.2	17.4	16.4	17.8	18.6	18.0	19.3
80~	15.4	19.5	23.6	18.2	25.5	20.3	21.2	21.2	21.4	23.1	22.0	21.9	22.1

注: 1) 254ページの注を参照されたい。

表 5.26 悪性新生物の主要部位別にみた性・
Table 5.26 Trends of age-adjusted death rates (per 100,000 population)総 数
Total

国際基本分類番号 ICD-9 International detailed list code	死 因 Causes of death	1935 昭和10年	1940 15年	1947 22年	1950 25年	1955 30年	1960 35年	1965 40年	1970 45年	1972 47年
140-208	悪 性 新 生 物	72.3	70.3	68.4	76.1	81.4	87.3	87.6	86.1	85.9
140-149	口 唇、口 腔 及 び 咽 頭	1.1	1.1	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8
150-159	消 化 器 及 び 腹 膜	51.0	50.1	47.9	53.5	57.6	60.3	59.2	50.1	49.2
150	食 道	3.9	3.6	3.1	3.2	3.1	3.2	3.2	3.3	3.2
151	胃	34.6	33.7	32.9	36.9	38.9	39.4	37.6	34.3	33.0
152,153	十 二 指 腸、小 腸 及 び 結 腸	—	—	1.6	1.9	1.8	2.1	2.4	2.8	3.1
153	結 腸	—	—	—	1.7	1.7	1.9	2.3	2.7	2.9
154	直 腸、直 腸 S 状 結 腸 移 行 部 及 び 肛 門	2.2	2.3	2.4	2.7	2.7	2.7	3.1	3.3	3.3
155,199.IC	肝 臓	7.9	8.1	6.8	7.3	8.9	8.1	6.9	6.7	6.5
156	胆 嚢 及 び 肝 外 胆 管	—	—	—	—	—	1.1	1.6	2.2	2.4
157	膵 臓	0.3	0.3	0.3	0.6	1.2	1.8	2.5	3.1	3.3
160-165	呼 吸 器 及 び 胸 腔 内 臓 器	2.0	2.1	1.9	3.2	4.4	6.4	7.9	9.3	9.8
161	喉 嚨	—	—	0.7	0.9	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6
162	気 管、気 管 支 及 び 肺	—	—	1.0	1.3	2.8	4.8	6.3	7.3	8.1
170	骨 及 び 関 節 軟 骨	—	—	0.3	0.5	0.8	1.0	0.9	0.7	0.6
172,173	皮 膚	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4
188,189	泌 尿 器	—	—	0.7	0.9	1.1	1.5	1.6	1.7	1.8
188	膀 胱	—	—	0.5	—	—	1.0	1.0	1.1	1.1
189,0,189.1	腎 臓	—	—	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6
200-208	リンパ組織及び造血組織	—	—	—	—	2.4	3.6	4.4	5.1	5.8
204-208	白 血 病	1.4	1.3	1.1	1.5	2.3	2.9	3.2	3.4	3.4

注: 1) 訂正死亡率の基準人口は昭和10年の性別人口である。
2) 表5.24の注1)を参照されたい。
*55年は、「国勢調査確定数」により再計算したものである。(以下同様)年齢・年次別死亡率 (人口10万対) (つづき)
from malignant neoplasms by sex, age and site : Japan-con.女 (8-8) 35子宮の悪性新生物
Female Malignant neoplasm of uterus

年 齢 Age	1950 昭和25年	1955 30年	1960 35年	1965 40年	1970 45年	1975 50年	1980 *55年	1981 56年	1982 57年	1983 58年	1984 59年	1985 60年	1986 61年
総 数 Total	19.7	16.0	14.9	13.4	12.2	10.7	9.2	9.0	8.6	8.5	8.2	8.0	7.7
0~4歳 Years	0.0	0.0	0.0	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—
5~9	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10~14	—	0.1	—	0.1	—	—	—	0.0	—	—	—	0.0	0.0
15~19	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20~24	0.8	0.5	0.8	0.6	0.2	0.3	0.2	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2
25~29	3.0	2.3	2.3	1.7	1.2	0.5	0.6	0.6	0.4	0.2	0.3	0.5	0.4
30~34	8.8	5.1	4.5	3.8	2.6	1.7	1.1	1.1	1.4	1.2	1.0	1.3	1.2
35~39	23.5	12.4	9.9	7.3	5.6	2.9	2.2	2.8	1.8	1.9	2.0	1.9	2.1
40~44	43.8	27.0	19.0	13.7	12.0	7.1	4.7	4.2	4.1	3.3	3.5	3.9	3.6
45~49	62.7	43.7	34.5	23.5	19.6	14.8	9.5	8.8	7.4	7.5	6.8	7.1	6.3
50~54	76.8	58.8	46.9	36.5	26.7	22.1	14.9	15.2	14.3	13.9	11.6	10.9	9.5
55~59	80.3	65.6	55.7	46.6	37.1	28.7	21.0	19.8	18.5	18.4	17.0	14.2	15.8
60~64	84.1	70.2	64.7	57.0	49.6	36.9	27.8	24.2	23.0	20.9	19.9	20.6	17.6
65~69	85.5	71.9	68.0	63.3	53.1	47.5	35.7	31.8	30.0	29.3	27.5	26.8	23.5
70~74	72.2	79.9	71.9	65.5	61.6	57.0	43.8	41.9	38.6	39.5	35.9	32.7	30.8
75~79	53.6	65.8	71.6	70.2	61.5	59.5	54.2	50.9	51.1	46.3	47.3	42.2	41.4
80~	44.2	47.2	49.4	57.0	55.4	55.1	60.7	63.3	58.8	56.9	55.5	54.7	49.7

年次別訂正死亡率¹⁾ (人口10万対)
from malignant neoplasms by sex and site : Japan総 数
Total

1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	国際基本分類番号 ICD-9 International detailed list code
48年	49年	50年	51年	52年	53年	54年	*55年	56年	57年	58年	59年	60年	61年	
84.8	84.1	82.6	82.8	82.5	82.3	82.8	82.7	82.3	81.1	81.2	81.2	80.7	79.3	140-208
0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	140-149
48.7	48.0	46.2	45.9	45.3	44.4	50.6	50.2	49.7	48.8	48.7	48.5	48.1	47.3	150-159
3.2	3.1	2.9	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.7	2.7	2.7	2.6	2.6	2.6	150
32.1	31.0	29.5	28.7	27.7	26.5	26.1	25.1	24.2	22.8	22.3	21.7	20.5	19.5	151
3.3	3.4	3.4	3.6	3.7	3.9	3.9	4.1	4.3	4.4	4.5	4.7	4.8	4.9	152,153
3.1	3.2	3.3	3.5	3.5	3.8	3.7	3.9	4.1	4.2	4.3	4.5	4.6	4.7	153
3.5	3.6	3.4	3.4	3.4	3.4	3.5	3.4	3.5	3.3	3.4	3.4	3.3	3.3	154
6.5	6.3	6.4	6.7	6.8	7.2	7.4	7.5	7.7	8.0	8.3	8.5	8.9	8.9	155,199.IC
2.5	2.5	2.6	2.8	2.9	3.0	3.0	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.7	156
3.3	3.4	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	4.0	4.0	4.1	4.2	4.1	4.4	4.4	157
9.8	10.0	10.2	10.5	10.8	11.1	11.2	11.5	11.7	11.9	12.1	12.4	12.5	12.3	160-165
0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	161
8.1	8.3	8.6	9.0	9.4	9.7	10.1	10.4	10.7	10.9	11.2	11.5	11.5	11.5	162
0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	170
0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	172,173
1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.9	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	188,189
1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	188
0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	189,0,189.1
5.7	5.7	5.9	6.0	6.1	5.9	5.9	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	5.9	6.0	200-208
3.4	3.4	3.4	3.5	3.5	3.3	3.3	3.3	3.3	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	204-208