

表5.25 悪性新生物の主要部位¹⁾別にみた性・
Table 5.25 Trends of death rates (per 100,000 population)

女(8-7) 34乳房の悪性新生物
Female Malignant neoplasm of breast

年齢 Age	1950 昭和25年	1955 30年	1960 35年	1965 40年	1970 45年	1975 50年	1980 *55年	1981 56年	1982 57年	1983 58年	1984 59年	1985 60年	1986 61年
総数 Total	3.3	3.5	3.5	3.9	4.8	5.8	7.0	7.3	7.2	7.3	7.9	8.0	8.3
0~4歳 Years	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5~9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10~14	—	0.0	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—
15~19	—	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	0.0	0.0	—	—	—
20~24	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2
25~29	0.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	1.0	1.0	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8
30~34	1.8	1.8	1.6	1.7	2.0	2.3	2.5	2.8	2.7	2.9	2.8	3.0	2.8
35~39	3.6	4.3	4.1	4.0	4.2	4.6	5.5	5.0	5.2	5.3	5.4	5.5	5.7
40~44	7.0	6.4	6.4	6.8	7.3	8.6	8.4	8.5	8.7	9.3	9.5	10.1	—
45~49	9.0	8.7	9.5	9.4	10.7	12.3	13.3	13.4	11.8	12.8	13.8	13.1	14.6
50~54	10.9	10.1	9.6	12.6	13.1	17.1	17.2	18.4	16.7	16.4	18.5	18.0	18.2
55~59	13.6	11.6	11.5	12.6	14.3	16.4	19.9	20.5	20.5	21.9	20.7	20.7	20.3
60~64	15.2	13.6	10.3	11.9	14.0	15.8	17.2	21.1	19.4	19.9	19.3	19.9	21.2
65~69	15.0	14.7	11.9	12.9	12.6	14.6	18.2	17.3	18.5	17.4	18.0	19.1	18.5
70~74	14.8	16.9	15.6	12.6	15.2	14.8	18.0	17.6	17.5	16.0	18.2	19.7	17.7
75~79	17.0	18.4	17.8	12.7	14.2	15.4	18.2	17.4	16.4	17.8	18.6	18.0	19.3
80~	15.4	19.5	23.6	18.2	25.5	20.3	21.2	21.2	21.4	23.1	22.0	21.9	22.1

注：1) 254ページの注を参照されたい。

表5.26 悪性新生物の主要部位別にみた性・
Table 5.26 Trends of age-adjusted death rates (per 100,000 population)

総数
Total

国際基本分類番号 ICD-9 International detailed list code	死因 Causes of death	1935 昭和10年	1940	1947	1950	1955	1960	1965	1970	1972
		昭和10年	15年	22年	25年	30年	35年	40年	45年	47年
140-208	悪性新生物	72.3	70.3	68.4	76.1	81.4	87.3	87.6	86.1	85.9
140-149	口唇、口腔及び咽頭 消化器及び腹膜	1.1	1.1	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8
150-159	食道	51.0	50.1	47.9	53.5	57.6	60.3	59.2	50.1	49.2
151	胃	3.9	3.6	3.1	3.2	3.1	3.2	3.2	3.3	3.2
152, 153	十二指腸、小腸及び結腸 結腸	34.6	33.7	32.9	36.9	38.9	39.4	37.6	34.3	33.0
153	直腸	—	—	1.6	1.9	1.8	2.1	2.4	2.8	3.1
154	盲腸、直腸S状結腸移行部及び肛門	2.2	2.3	2.4	2.7	2.7	2.7	3.1	3.3	3.3
155, 199, IC	肝胆囊及び肝外胆管	7.9	8.1	8.8	7.3	8.9	8.1	6.9	6.7	6.5
156	胆嚢	0.3	0.3	0.3	0.6	1.2	1.8	2.5	3.1	3.3
157	肺	0.3	0.3	0.3	0.6	1.2	1.8	2.5	3.1	3.3
160-165	呼吸器及び胸腔内臓器	2.0	2.1	1.9	3.2	4.4	6.4	7.9	9.3	9.8
161	喉頭	—	—	0.7	0.9	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6
162	気管、支氣管	—	—	1.0	1.3	2.8	4.8	6.3	7.3	8.1
170	骨及び関節軟骨	—	—	0.3	0.5	0.8	1.0	0.9	0.7	0.6
172, 173	皮膚	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4
188, 189	泌尿器	—	—	0.7	0.9	1.1	1.5	1.6	1.7	1.8
188	膀胱	—	—	0.5	—	—	1.0	1.1	1.1	1.1
189, 0, 189, 1	腎	—	—	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6
200-208	リンパ組織及び造血組織病	—	—	2.4	3.6	4.4	5.1	5.5	5.8	—
204-208	白血病	1.4	1.3	1.1	1.5	2.3	2.9	3.2	3.4	3.4

注：1) 訂正死亡率の基準人口は昭和10年の性別人口である。

2) 表5.24の注1)を参照されたい。

*55年は、「国勢調査確定数」により再計算したものである。(以下同様)

年齢・年次別死亡率(人口10万対)(つづき)
from malignant neoplasms by sex, age and site : Japan—con.

女(8-8) 35子宮の悪性新生物
Female Malignant neoplasm of uterus

年齢 Age	1950 昭和25年	1955 30年	1960 35年	1965 40年	1970 45年	1975 50年	1980 *55年	1981 56年	1982 57年	1983 58年	1984 59年	1985 60年	1986 61年
総数 Total	19.7	16.0	14.9	13.4	12.2	10.7	9.2	9.0	8.6	8.5	8.2	8.0	7.7
0~4歳 Years	0.0	0.0	0.0	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—
5~9	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10~14	—	0.1	—	0.1	—	—	—	0.0	—	—	0.0	0.0	0.0
15~19	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20~24	0.8	0.5	0.8	0.6	0.2	0.3	0.2	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2
25~29	3.0	2.3	2.3	1.7	1.2	0.5	0.6	0.6	0.4	0.2	0.3	0.5	0.4
30~34	8.8	5.1	4.5	3.8	2.6	1.7	1.1	1.1	1.4	1.2	1.0	1.3	1.2
35~39	23.5	12.4	9.9	7.3	5.6	2.9	2.2	2.8	1.8	1.9	2.0	1.9	2.1
40~44	43.8	27.0	19.0	13.7	12.0	7.1	4.7	4.2	4.1	3.3	3.5	3.	

死 亡

Deaths

表 5.26 悪性新生物の主要部位別にみた性・
Table 5.26 Trends of age-adjusted death rates (per 100,000 population)

男
Male

国際基本分類番号 ICD-9 International detailed list code	死 因 Causes of death	昭和10年									
		1935 15年	1940 22年	1947 25年	1950 30年	1955 40年	1960 45年	1965 47年	1970	1972	
140-208	悪 性 新 生 物	72.9	72.3	68.1	77.4	86.1	94.4	96.5	96.6	97.0	
140-149	口唇、口腔及び咽頭	1.5	1.5	1.2	1.0	0.9	0.9	0.8	1.1	1.1	
150-159	消化器及び腹膜道	61.6	61.4	57.5	64.2	68.8	72.0	70.8	60.1	59.2	
150	食 胃	5.7	5.3	4.4	4.6	4.3	4.5	4.5	5.1	4.9	
151	胃	42.3	41.9	40.2	45.0	47.6	48.3	46.3	42.0	40.5	
152, 153	十二指腸、小腸及び結腸	1.5	1.7	1.6	1.9	2.3	2.7	3.0	
153	結	1.5	1.5	1.7	2.1	2.5	2.8	
154	直腸、直腸S状結腸移行部及び肛門	2.3	2.4	2.5	2.8	2.8	2.7	3.2	3.6	3.6	
155, 199.1C	肝	9.1	9.5	7.8	8.5	10.2	9.6	8.2	8.6	8.4	
156	胆 囊 及 び 肝 外 胆 管	0.3	0.3	0.3	0.8	1.3	2.2	2.9	3.7	3.9	
157	肺	0.3	0.3	0.3	0.8	1.3	2.2	2.9	3.7	3.9	
160-165	呼吸器及び胸腔内臓器	2.8	2.9	2.6	4.4	6.1	8.8	10.8	13.1	14.0	
161	喉 頸	0.9	1.4	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	
162	気 管、氣管支及び肺	1.3	1.9	3.9	6.6	8.6	10.5	11.6	
170	骨 及 び 関 節 軟	0.3	0.5	1.0	1.1	1.1	0.9	0.7	
172, 173	皮膚	0.6	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
185-187	男 性 生 殖 器	0.4	0.5	0.9	1.2	1.4	1.5	1.6	
185	前 立 腺	1.1	1.1	0.1	0.2	0.5	0.8	1.0	1.1	1.2	
188, 189	泌 尿	0.8	1.0	1.4	1.8	2.0	2.1	2.3	
188	膀胱	0.6	1.2	1.3	1.4	1.5	
189.0, 189.1	腎	0.2	0.2	0.3	0.5	0.6	0.7	0.8	
200-208	リンパ組織及び造血組織	2.9	4.4	5.2	6.0	6.4	6.8		
204-208	白 血 痘	1.7	1.6	1.3	1.7	2.8	3.3	3.7	3.8	3.8	

女
Female

国際基本分類番号 ICD-9 International detailed list code	死 因 Causes of death	昭和10年									
		1935 15年	1940 22年	1947 25年	1950 30年	1955 40年	1960 45年	1965 47年	1970	1972	
140-208	悪 性 新 生 物	71.7	68.4	68.4	74.6	76.0	79.3	78.0	75.3	74.8	
140-149	口唇、口腔及び咽頭	0.8	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
150-159	消化器及び腹膜道	40.2	38.9	38.3	42.6	46.1	48.0	47.2	40.1	39.5	
150	食 胃	2.1	1.7	1.8	1.9	1.8	1.8	1.7	1.6	1.5	
151	胃	26.8	25.7	25.5	28.6	29.9	30.1	28.5	26.7	25.5	
152, 153	十二指腸、小腸及び結腸	1.6	2.2	2.0	2.3	2.6	3.0	3.2	
153	腸	2.0	1.9	2.1	2.5	2.8	3.0	
154	直腸、直腸S状結腸移行部及び肛門	2.0	2.1	2.3	2.5	2.6	2.8	2.9	3.0	3.1	
155, 199.1C	肝	6.7	6.7	5.7	6.1	7.7	6.6	5.7	5.0	4.8	
156	胆 囊 及 び 肝 外 胆 管	0.2	0.2	0.3	0.5	1.0	1.5	1.7	2.5	2.8	
157	肺	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	
160-165	呼吸器及び胸腔内臓器	1.2	1.2	1.2	2.1	2.7	4.0	4.9	5.4	5.6	
161	喉 頸	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	
162	気 管、氣管支及び肺	0.6	0.8	1.7	2.8	3.8	4.2	4.5	
170	骨 及 び 関 節 軟	0.3	0.4	0.7	0.8	0.7	0.6	0.5	
172, 173	皮膚	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	
174	乳 房	2.4	2.5	3.0	3.3	3.2	3.1	3.2	3.6	3.7	
179-182	子 宮	21.6	19.7	19.4	19.6	15.2	13.1	11.0	9.1	8.4	
183.0	卵巣	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	1.8	
188, 189	泌 尿	0.7	0.7	0.9	1.2	1.2	1.3	1.3	
188	膀胱	0.4	...	0.8	0.7	0.7	0.8	0.8	
189.0, 189.1	腎	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	
200-208	リンパ組織及び造血組織	1.9	2.8	3.6	4.2	4.5	4.8		
204-208	白 血 痘	1.1	1.1	0.9	1.2	1.8	2.5	2.8	2.9	3.1	

注： 1) 260ページの注を参照されたい。

年次別訂正死亡率¹⁾（人口10万対）(つづき)
from malignant neoplasms by sex and site : Japan—con.

男
Male

1973 48年	1974 49年	1975 50年	1976 51年	1977 52年	1978 53年	1979 54年	1980 *55年	1981 56年	1982 57年	1983 58年	1984 59年	1985 60年	1986 61年	国際基本分類番号 ICD-9 International detailed list code
96.0	96.0	94.4	95.4	95.5	95.3	97.0	97.2	97.5	96.6	97.4	97.7	97.6	96.6	140-208
1.0	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.4	1.3	1.4	1.3	1.4	1.4	1.4	1.5	140-149
58.3	57.9	55.7	55.5	54.6	53.6	62.6	62.2	61.2	61.					