

〔主な死因〕悪性新生物

表 5.24 悪性新生物の主要部位

総 数	死 因	昭和25年	30 年	35 年	40 年	45 年	50 年
基本分類番号							
140 - 208	総 数	64 428	77 721	93 773	106 536	119 977	136 383
140 - 149	口 唇、口 腔 及 び 咽 頭 の 悪 性 新 生 物	699	650	761	894	1 112	1 448
150 - 159	消 化 器 及 び 腹 膜 の 悪 性 新 生 物	45 284	55 310	65 398	73 031	71 175	78 263
150	食 道 の 悪 性 新 生 物	2 763	2 973	3 467	3 958	4 823	4 997
151	胃 の 悪 性 新 生 物	31 211	37 306	42 750	46 385	48 823	49 857
152, 153	十 二 指 腸、小 腸 及 び 結 腸 の 悪 性 新 生 物	1 642	1 767	2 273	3 033	4 034	5 828
153	結 腸 の 悪 性 新 生 物	1 457	1 628	2 039	2 804	3 818	5 573
154	直 腸、直 腸 S 状 結 腸 移 行 部 及 び 肛 門 の 悪 性 新 生 物	2 271	2 611	2 998	3 796	4 717	5 904
155, 199, 1C	肝 の 悪 性 新 生 物	6 179	8 577	8 818	8 505	9 516	10 588
156	胆 嚢 及 び 肝 外 胆 管 の 悪 性 新 生 物	526	1 102	1 144	2 041	3 104	4 484
157	膵 の 悪 性 新 生 物	526	1 102	1 975	3 066	4 399	5 635
160 - 165	呼 吸 器 及 び 胸 腔 内 臓 器 の 悪 性 新 生 物	2 740	4 236	6 953	9 737	13 209	17 383
161	喉 頭 の 悪 性 新 生 物	800	717	738	792	943	862
162	気 管、気 管 支 及 び 肺 の 悪 性 新 生 物	1 119	2 711	5 171	7 725	10 489	14 759
170	骨 及 び 関 節 軟 骨 の 悪 性 新 生 物	412	811	1 014	1 044	902	704
172, 173	皮 膚 の 悪 性 新 生 物	517	563	610	626	707	704
174, 175	乳 房 の 悪 性 新 生 物	1 448	1 589	1 703	1 995	2 509	3 289
179 - 182	子 宮 の 悪 性 新 生 物	8 356	7 289	7 068	6 689	6 373	6 075
183, 0	卵 巣 の 悪 性 新 生 物	346	473	647	840	1 129	1 516
185 - 187	男 性 生 殖 器 の 悪 性 新 生 物	221	451	663	908	1 153	1 554
185	前 立 腺 の 悪 性 新 生 物	83	273	480	683	883	1 267
188, 189	泌 尿 器 の 悪 性 新 生 物	719	1 099	1 602	1 913	2 362	2 901
188	膀 胱 の 悪 性 新 生 物	---	---	1 108	1 291	1 570	1 830
189, 0, 189, 1	腎 の 悪 性 新 生 物	205	262	452	552	684	940
200 - 208	リンパ組織及び造血組織の悪性新生物	2 007	3 196	4 156	5 215	6 286	7 957
204 - 208	白 血 病	1 226	2 038	2 628	3 159	3 559	4 164

注：1) 基本分類は第9回分類による。第8回との比較については、昭和54年人口動態統計上巻巻末の「第9回と第8回との比較」の項の表4を参照されたい。

表 5.25 悪性新生物の主要部位

総 数	死 因	昭和25年	30 年	35 年	40 年	45 年	50 年
基本分類番号							
140 - 208	総 数	77.4	87.1	100.4	108.4	116.3	122.6
140 - 149	口 唇、口 腔 及 び 咽 頭 の 悪 性 新 生 物	0.8	0.7	0.8	0.9	1.1	1.3
150 - 159	消 化 器 及 び 腹 膜 の 悪 性 新 生 物	54.4	62.0	70.0	74.3	69.0	70.3
150	食 道 の 悪 性 新 生 物	3.3	3.3	3.7	4.0	4.7	4.5
151	胃 の 悪 性 新 生 物	37.5	41.8	45.8	47.2	47.3	44.8
152, 153	十 二 指 腸、小 腸 及 び 結 腸 の 悪 性 新 生 物	2.0	2.0	2.4	3.1	3.9	5.2
153	結 腸 の 悪 性 新 生 物	1.8	1.8	2.2	2.9	3.7	5.0
154	直 腸、直 腸 S 状 結 腸 移 行 部 及 び 肛 門 の 悪 性 新 生 物	2.7	2.9	3.2	3.9	4.6	5.3
155, 199, 1C	肝 の 悪 性 新 生 物	7.4	9.6	9.4	8.7	9.2	9.5
156	胆 嚢 及 び 肝 外 胆 管 の 悪 性 新 生 物	0.6	1.2	1.2	2.1	3.0	4.0
157	膵 の 悪 性 新 生 物	0.6	1.2	2.1	3.1	4.3	5.1
160 - 165	呼 吸 器 及 び 胸 腔 内 臓 器 の 悪 性 新 生 物	3.3	4.7	7.4	9.9	12.8	15.6
161	喉 頭 の 悪 性 新 生 物	1.0	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8
162	気 管、気 管 支 及 び 肺 の 悪 性 新 生 物	1.3	3.0	5.5	7.9	10.2	13.3
170	骨 及 び 関 節 軟 骨 の 悪 性 新 生 物	0.5	0.9	1.1	1.1	0.9	0.6
172, 173	皮 膚 の 悪 性 新 生 物	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6
174, 175	乳 房 の 悪 性 新 生 物	1.7	1.8	1.8	2.0	2.4	3.0
179 - 182	子 宮 の 悪 性 新 生 物	...	...	...	...	...	...
183, 0	卵 巣 の 悪 性 新 生 物	...	...	...	...	...	...
185 - 187	男 性 生 殖 器 の 悪 性 新 生 物	...	...	...	...	...	...
185	前 立 腺 の 悪 性 新 生 物	...	...	...	...	...	...
188, 189	泌 尿 器 の 悪 性 新 生 物	0.9	1.2	1.7	1.9	2.3	2.6
188	膀 胱 の 悪 性 新 生 物	---	---	1.2	1.3	1.5	1.6
189, 0, 189, 1	腎 の 悪 性 新 生 物	0.2	0.3	0.5	0.6	0.7	0.8
200 - 208	リンパ組織及び造血組織の悪性新生物	2.4	3.6	4.4	5.3	6.1	7.2
204 - 208	白 血 病	1.5	2.3	2.8	3.2	3.5	3.7

注：1) 表 5.24 の注 1) を参照されたい。

*55年は、「国勢調査確定数」により再計算したものである。(以下同様)

別にみた性・年次別死亡数

昭和51年	52年	53年	54年	55年	56年	57年	58年	59年	基本分類番号
140 893	145 772	150 336	156 661	161 764	166 399	170 130	176 206	182 280	140 — 208
1 478	1 485	1 551	1 806	1 825	1 848	1 876	1 992	2 048	140 — 149
80 112	82 070	83 236	98 090	100 507	102 886	104 541	108 046	111 296	150 — 159
5 090	5 241	5 325	5 479	5 733	5 638	5 854	5 996	5 958	150
50 092	50 132	49 564	50 620	50 443	50 134	49 013	49 366	49 785	151
6 391	6 758	7 411	7 683	8 262	8 980	9 582	10 129	10 932	152, 153
6 115	6 460	7 116	7 325	7 932	8 630	9 223	9 746	10 546	153
6 018	6 273	6 402	6 908	6 917	7 279	7 284	7 618	7 820	154
11 492	11 999	13 051	13 886	14 510	15 425	16 557	17 646	18 607	155, 199, 1C
4 907	5 354	5 611	5 993	6 599	7 056	7 518	8 168	8 802	156
5 929	6 345	6 807	7 210	7 835	8 252	8 776	9 261	9 485	157
18 461	19 843	21 234	22 100	23 464	24 876	26 322	27 741	29 444	160 — 165
897	869	873	859	866	849	842	807	872	161
15 869	17 235	18 530	19 923	21 294	22 799	24 216	25 651	27 356	162
679	684	670	572	509	505	458	482	433	170
744	785	748	619	619	641	621	591	646	172, 173
3 369	3 609	3 788	3 922	4 185	4 408	4 342	4 452	4 863	174, 175
5 879	5 694	5 710	5 644	5 465	5 354	5 179	5 133	4 975	179 — 182
1 730	1 788	1 963	2 070	2 098	2 305	2 349	2 434	2 561	183, 0
1 568	1 733	1 778	1 927	2 011	2 117	2 311	2 443	2 561	185 — 187
1 296	1 448	1 499	1 666	1 736	1 866	2 053	2 168	2 315	185
3 079	3 171	3 454	3 597	3 941	3 962	4 226	4 435	4 569	188, 189
1 966	2 013	2 078	2 191	2 361	2 347	2 421	2 496	2 441	188
950	983	1 155	1 226	1 366	1 392	1 570	1 681	1 841	189, 0, 189, 1
8 247	8 618	8 714	9 119	9 459	9 825	10 142	10 505	10 981	200 — 208
4 302	4 411	4 354	4 544	4 567	4 691	4 863	4 893	5 212	204 — 208

別にみた性・年次別死亡率(人口10万対)

総 数									
昭和51年	52 年	53 年	54 年	* 55 年	56 年	57 年	58 年	59 年	基本分類番号
125.3	128.4	131.3	135.7	139.1	142.0	144.2	148.3	152.5	140 - 208
1.3	1.3	1.4	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	140 - 149
71.3	72.3	72.7	85.0	86.4	87.8	88.6	91.0	93.1	150 - 159
4.5	4.6	4.7	4.7	4.9	4.8	5.0	5.0	5.0	150
44.6	44.2	43.3	43.8	43.4	42.8	41.5	41.6	41.7	151
5.7	6.0	6.5	6.7	7.1	7.7	8.1	8.5	9.1	152, 153
5.4	5.7	6.2	6.3	6.8	7.4	7.8	8.2	8.8	153
5.4	5.5	5.6	6.0	5.9	6.2	6.2	6.4	6.5	154
10.2	10.6	11.4	12.0	12.5	13.2	14.0	14.9	15.6	155, 199, 1C
4.4	4.7	4.9	5.2	5.7	6.0	6.4	6.9	7.4	156
5.3	5.6	5.9	6.2	6.7	7.0	7.4	7.8	7.9	157
16.4	17.5	18.5	19.1	20.2	21.2	22.3	23.4	24.6	160 - 165
0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	161
14.1	15.2	16.2	17.3	18.3	19.5	20.5	21.6	22.9	162
0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	170
0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	172, 173
3.0	3.2	3.3	3.4	3.6	3.8	3.7	3.7	4.1	174, 175
.	.	.	.	.	.	.	.	.	179 - 182
.	.	.	.	.	.	.	.	.	183.0
.	.	.	.	.	.	.	.	.	185 - 187
.	.	.	.	.	.	.	.	.	185
2.7	2.8	3.0	3.1	3.4	3.4	3.6	3.7	3.8	188, 189
1.7	1.8	1.8	1.9	2.0	2.0	2.1	2.1	2.0	188
0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.2	1.3	1.4	1.5	189.0, 189.1
7.3	7.6	7.6	7.9	8.1	8.4	8.6	8.8	9.2	200 - 208
3.8	3.9	3.8	3.9	3.9	4.0	4.1	4.1	4.4	204 - 208

表 5.24 悪性新生物の主要部位

男

基本分類番号	死 因	昭和25年	30 年	35 年	40 年	45 年	50 年
140-208	総 数	32 670	41 223	50 898	58 899	67 074	76 922
140-149	口 唇、口 腔 及 び 咽 頭 の 悪 性 新 生 物	432	414	484	561	738	943
150-159	消 化 器 及 び 腹 膜 の 悪 性 新 生 物	27 132	33 069	39 166	43 753	42 383	46 267
150	食 道 の 悪 性 新 生 物	1 961	2 102	2 472	2 870	3 673	3 862
151	胃 の 悪 性 新 生 物	19 023	22 899	26 283	28 636	29 653	30 403
152, 153	十 二 指 腸、小 腸 及 び 結 腸 の 悪 性 新 生 物	694	795	1 026	1 389	1 891	2 794
153	結 腸 の 悪 性 新 生 物	620	723	910	1 272	1 766	2 662
154	直 腸、直 腸 S 状 結 腸 移 行 部 及 び 肛 門 の 悪 性 新 生 物	1 199	1 356	1 480	1 993	2 555	3 148
155, 199, 1C	肝 の 悪 性 新 生 物	3 601	4 877	5 204	5 006	5 908	6 795
156	胆 嚢 及 び 肝 外 胆 管 の 悪 性 新 生 物			556	991	1 340	1 905
157	脾 の 悪 性 新 生 物	328	625	1 150	1 748	2 549	3 155
160-165	呼 吸 器 及 び 胸 腔 内 臓 器 の 悪 性 新 生 物	1 874	2 920	4 814	6 723	9 341	12 509
161	喉 頭 の 悪 性 新 生 物	575	536	557	624	773	738
162	気 管、気 管 支 及 び 肺 の 悪 性 新 生 物	789	1 893	3 638	5 404	7 502	10 711
170	骨 及 び 関 節 軟 骨 の 悪 性 新 生 物	226	470	586	610	537	424
172, 173	皮 膚 の 悪 性 新 生 物	292	300	300	325	381	371
174, 175	乳 房 の 悪 性 新 生 物	29	17	20	29	23	27
179-182	子 宮 の 悪 性 新 生 物						
183, 0	卵 巢 の 悪 性 新 生 物						
185-187	男 性 生 殖 器 の 悪 性 新 生 物	221	451	663	908	1 153	1 554
185	前 立 腺 の 悪 性 新 生 物	83	273	480	683	883	1 267
188, 189	泌 尿 器 の 悪 性 新 生 物	425	678	967	1 215	1 526	1 863
188	膀 胱 の 悪 性 新 生 物	---	---	673	837	1 030	1 174
189, 0, 189, 1	腎 の 悪 性 新 生 物	114	150	277	342	436	618
200-208	リンパ組織及び造血組織の悪性新生物	1 192	1 939	2 440	3 054	3 678	4 625
204-208	白 血 病	718	1 214	1 473	1 765	2 005	2 321

注：1) 基本分類は第9回分類による。第8回との比較については、昭和54年人口動態統計上巻巻末の「第9回と第8回との比較」の項の表4を参照されたい。

表 5.25 悪性新生物の主要部位

男

基本分類番号	死 因	昭和25年	30 年	35 年	40 年	45 年	50 年
140-208	総 数	80.1	94.0	111.0	122.1	132.6	140.6
140-149	口 唇、口 腔 及 び 咽 頭 の 悪 性 新 生 物	1.1	0.9	1.1	1.2	1.5	1.7
150-159	消 化 器 及 び 腹 膜 の 悪 性 新 生 物	66.5	75.4	85.4	90.7	83.8	84.5
150	食 道 の 悪 性 新 生 物	4.8	4.8	5.4	5.9	7.3	7.1
151	胃 の 悪 性 新 生 物	46.6	52.2	57.3	59.4	58.6	55.6
152, 153	十 二 指 腸、小 腸 及 び 結 腸 の 悪 性 新 生 物	1.7	1.8	2.2	2.9	3.7	5.1
153	結 腸 の 悪 性 新 生 物	1.5	1.6	2.0	2.6	3.5	4.9
154	直 腸、直 腸 S 状 結 腸 移 行 部 及 び 肛 門 の 悪 性 新 生 物	2.9	3.1	3.2	4.1	5.0	5.8
155, 199, 1C	肝 の 悪 性 新 生 物	8.8	11.1	11.3	10.4	11.7	12.4
156	胆 嚢 及 び 肝 外 胆 管 の 悪 性 新 生 物			1.2	2.1	2.6	3.5
157	脾 の 悪 性 新 生 物	0.8	1.4	2.5	3.6	5.0	5.8
160-165	呼 吸 器 及 び 胸 腔 内 臓 器 の 悪 性 新 生 物	4.6	6.7	10.5	13.9	18.5	22.9
161	喉 頭 の 悪 性 新 生 物	1.4	1.2	1.2	1.3	1.5	1.3
162	気 管、気 管 支 及 び 肺 の 悪 性 新 生 物	1.9	4.3	7.9	11.2	14.8	19.6
170	骨 及 び 関 節 軟 骨 の 悪 性 新 生 物	0.6	1.1	1.3	1.3	1.1	0.8
172, 173	皮 膚 の 悪 性 新 生 物	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7
174, 175	乳 房 の 悪 性 新 生 物	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
179-182	子 宮 の 悪 性 新 生 物						
183, 0	卵 巢 の 悪 性 新 生 物						
185-187	男 性 生 殖 器 の 悪 性 新 生 物	0.5	1.0	1.4	1.9	2.3	2.8
185	前 立 腺 の 悪 性 新 生 物	0.2	0.6	1.0	1.4	1.7	2.3
188, 189	泌 尿 器 の 悪 性 新 生 物	1.0	1.5	2.1	2.5	3.0	3.4
188	膀 胱 の 悪 性 新 生 物	---	---	1.5	1.7	2.0	2.1
189, 0, 189, 1	腎 の 悪 性 新 生 物	0.3	0.3	0.6	0.7	0.9	1.1
200-208	リンパ組織及び造血組織の悪性新生物	2.9	4.4	5.3	6.3	7.3	8.5
204-208	白 血 病	1.8	2.8	3.2	3.7	4.0	4.2

注：1) 表 5.24 の注 1) を参照されたい。

*55年は、「国勢調査確定数」により再計算したものである。(以下同様)

別にみた性・年次別死亡数(つづき)

男

昭和51年	52 年	53 年	54 年	55 年	56 年	57 年	58 年	59 年	基本分類番号
79 995	83 088	85 630	90 136	93 501	96 524	99 114	103 330	107 175	140-208
1 012	1 007	1 052	1 218	1 233	1 320	1 283	1 408	1 450	140-149
47 503	48 405	48 960	58 944	60 697	62 226	63 361	65 750	67 818	150-159
3 924	4 057	4 130	4 347	4 490	4 454	4 646	4 776	4 791	150
30 537	30 326	30 136	30 777	30 845	30 876	30 036	30 591	30 876	151
3 059	3 253	3 515	3 767	4 032	4 358	4 705	4 989	5 415	152, 153
2 901	3 105	3 353	3 553	3 842	4 168	4 494	4 763	5 196	153
3 324	3 493	3 504	3 838	3 933	4 123	4 131	4 299	4 477	154
7 520	7 937	8 743	9 487	10 038	10 656	11 692	12 604	13 342	155, 199, 1C
2 101	2 267	2 350	2 488	2 791	2 961	3 148	3 405	3 634	156
3 430	3 688	3 894	4 147	4 483	4 764	5 033	5 229	5 389	157
13 199	14 333	15 270	16 166	16 993	18 158	19 086	20 175	21 454	160-165
751	742	766	748	736	729	736	716	785	161
11 440	12 542	13 417	14 600	15 438	16 638	17 555	18 644	19 877	162
398	404	370	334	288	291	275	279	248	170
425	409	395	333	327	348	343	324	357	172, 173
22	39	33	44	44	44	31	35	38	174, 175
									179-182
									183, 0
1 568	1 733	1 778	1 927	2 011	2 117	2 311	2 443	2 561	185-187
1 296	1 448	1 499	1 666	1 736	1 866	2 053	2 168	2 315	185
2 038	2 149	2 319	2 424	2 659	2 673	2 885	2 957	3 103	188, 189
1 304	1 373	1 440	1 515	1 606	1 615	1 671	1 670	1 669	188
643	674	754	812	944	932	1 079	1 151	1 275	189, 0, 189, 1
4 854	5 118	5 158	5 299	5 563	5 714	5 885	6 112	6 280	200-208
2 458	2 527	2 505	2 568	2 624	2 713	2 789	2 783	2 943	204-208

別にみた性・年次別死亡率(人口10万対)(つづき)

男

昭和51年	52 年	53 年	54 年	*55年	56 年	57 年	58 年	59 年	基本分類番号
144.6	148.7	151.9	158.6	163.5	167.4	170.7	176.8	182.3	140-208
1.8	1.8	1.9	2.1	2.2	2.3	2.2	2.4	2.5	140-149
85.8	86.7	86.9	103.7	106.1	107.9	109.0	112.5	115.4	150-159
7.1	7.3	7.3	7.6	7.8	7.7	8.0	8.2	8.1	150
55.2	54.3	53.5	54.1	53.9	53.6	51.7	52.4	52.5	151
5.5	5.8	6.2	6.6	7.0	7.6	8.1	8.5	9.2	152, 153
5.2	5.6	5.9	6.3	6.7	7.2	7.7	8.2	8.8	153
6.0	6.3	6.2	6.8	6.9	7.2	7.1	7.4	7.6	154
13.6	14.2	15.5	16.7	17.5	18.5	20.1	21.6	22.7	155, 199, 1C
3.8	4.1	4.2	4.4	4.9	5.1	5.4	5.8	6.2	156
6.2	6.6	6.9	7.3	7.8	8.3	8.7	8.9	9.2	157
23.9	25.7	27.1	28.4	29.7	31.5	32.9	34.5	36.5	160-165
1.4	1.3	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	161
20.7	22.5	23.8	25.7	27.0	28.9	30.2	31.9	33.8	162
0.7	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	170
0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	172, 173
0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	174, 175
									179-182
									183, 0
2.8	3.1	3.2	3.4	3.5	3.7	4.0	4.2	4.4	185-187
2.3	2.6	2.7	2.9	3.0	3.2	3.5	3.7	3.9	185
3.7	3.8	4.1	4.3	4.6	4.6	5.0	5.1	5.3	188, 189
2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.8	2.9	2.9	2.8	188
1.2	1.2	1.3	1.4	1.7	1.6	1.9	2.0	2.2	189, 0, 189, 1
8.8	9.2	9.2	9.3	9.7	9.9	10.1	10.5	10.7	200-208
4.4	4.5	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.8	5.0	204-208

表 5.24 悪性新生物の主要部位

基本分類番号	死 因	昭和25年	30年	35年	40年	45年	50年
140-208	総 数	31 758	36 498	42 875	47 637	52 903	59 461
140-149	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	267	236	277	333	374	505
150-159	消化器及び腹膜の悪性新生物	18 152	22 241	26 232	29 278	28 792	31 996
150	食道の悪性新生物	802	871	995	1 088	1 150	1 135
151	胃の悪性新生物	12 188	14 407	16 467	17 749	19 170	19 454
152, 153	十二指腸、小腸及び結腸の悪性新生物	948	972	1 247	1 644	2 143	3 034
153	結腸の悪性新生物	837	905	1 129	1 532	2 052	2 911
154	直腸、直腸S状結腸移行部及び肛門の悪性新生物	1 072	1 255	1 518	1 803	2 162	2 756
155, 199. 1C	肝臓の悪性新生物	2 578	3 700	3 614	3 499	3 608	3 793
156	胆嚢及び肝外胆管の悪性新生物	198	477	588	1 050	1 764	2 579
157	膵臓の悪性新生物	198	477	825	1 318	1 850	2 480
160-165	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	866	1 316	2 139	3 014	3 868	4 874
161	喉頭の悪性新生物	225	181	181	168	170	124
162	気管、気管支及び肺の悪性新生物	330	818	1 533	2 321	2 987	4 048
170	骨及び関節軟骨の悪性新生物	186	341	428	434	365	280
172, 173	皮膚の悪性新生物	225	263	310	301	326	333
174, 175	乳房の悪性新生物	1 419	1 572	1 683	1 966	2 486	3 262
179-182	子宮の悪性新生物	8 356	7 289	7 068	6 689	6 373	6 075
183. 0	卵巣の悪性新生物	346	473	647	840	1 129	1 516
185-187	男性生殖器官の悪性新生物	.	.	.	.	.	.
185	前立腺の悪性新生物	.	.	.	.	.	.
188, 189	泌尿器の悪性新生物	294	421	635	698	836	1 038
188	膀胱の悪性新生物	...	...	435	454	540	656
189. 0, 189. 1	腎臓の悪性新生物	91	112	175	210	248	322
200-208	リンパ組織及び造血組織の悪性新生物	815	1 257	1 716	2 161	2 608	3 332
204-208	白血病	508	824	1 155	1 394	1 554	1 843

注：1) 基本分類は第9回分類による。第8回との比較については、昭和54年人口動態統計上巻巻末の「第9回と第8回との比較」の項の表4を参照されたい。

表 5.25 悪性新生物の主要部位

基本分類番号	死 因	昭和25年	30年	35年	40年	45年	50年
140-208	総 数	74.9	80.4	90.2	95.2	100.7	105.2
140-149	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	0.6	0.5	0.6	0.7	0.7	0.9
150-159	消化器及び腹膜の悪性新生物	42.8	49.0	55.2	58.5	54.8	56.6
150	食道の悪性新生物	1.9	1.9	2.1	2.2	2.2	2.0
151	胃の悪性新生物	28.8	31.7	34.6	35.5	36.5	34.4
152, 153	十二指腸、小腸及び結腸の悪性新生物	2.2	2.1	2.6	3.3	4.1	5.4
153	結腸の悪性新生物	2.0	2.0	2.4	3.1	3.9	5.1
154	直腸、直腸S状結腸移行部及び肛門の悪性新生物	2.5	2.8	3.2	3.6	4.1	4.9
155, 199. 1C	肝臓の悪性新生物	6.1	8.1	7.6	7.0	6.9	6.7
156	胆嚢及び肝外胆管の悪性新生物	0.5	1.1	1.2	2.1	3.4	4.6
157	膵臓の悪性新生物	0.5	1.1	1.7	2.6	3.5	4.4
160-165	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	2.0	2.9	4.5	6.0	7.4	8.6
161	喉頭の悪性新生物	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2
162	気管、気管支及び肺の悪性新生物	0.8	1.8	3.2	4.6	5.7	7.2
170	骨及び関節軟骨の悪性新生物	0.4	0.8	0.9	0.9	0.7	0.5
172, 173	皮膚の悪性新生物	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6
174, 175	乳房の悪性新生物	3.3	3.5	3.5	3.9	4.7	5.8
179-182	子宮の悪性新生物	19.7	16.0	14.9	13.4	12.1	10.7
183. 0	卵巣の悪性新生物	0.8	1.0	1.4	1.7	2.1	2.7
185-187	男性生殖器官の悪性新生物	.	.	.	.	.	.
185	前立腺の悪性新生物	.	.	.	.	.	.
188, 189	泌尿器の悪性新生物	0.7	0.9	1.3	1.4	1.6	1.8
188	膀胱の悪性新生物	...	...	0.9	0.9	1.0	1.2
189. 0, 189. 1	腎臓の悪性新生物	0.2	0.2	0.4	0.4	0.5	0.6
200-208	リンパ組織及び造血組織の悪性新生物	1.9	2.8	3.6	4.3	5.0	5.9
204-208	白血病	1.2	1.8	2.4	2.8	3.0	3.3

注：1) 表5.24の注1)を参照されたい。

*55年は、「国勢調査確定数」により再計算したものである。(以下同様)

別にみた性・年次別死亡数(つづき)

昭和51年	52年	53年	54年	55年	56年	57年	58年	59年	基本分類番号
60 898	62 684	64 706	66 525	68 263	69 875	71 016	72 876	75 105	140-208
466	478	499	588	592	528	593	584	598	140-149
32 609	33 665	34 276	39 146	39 810	40 660	41 240	42 296	43 478	150-159
1 166	1 184	1 195	1 132	1 243	1 184	1 208	1 220	1 167	150
19 555	19 806	19 428	19 843	19 598	19 258	18 977	18 775	18 909	151
3 332	3 505	3 896	3 916	4 230	4 622	4 877	5 140	5 517	152, 153
3 214	3 355	3 763	3 772	4 090	4 462	4 729	4 983	5 350	153
2 694	2 780	2 898	3 070	2 984	3 156	3 153	3 319	3 343	154
3 972	4 062	4 308	4 399	4 472	4 769	4 865	5 042	5 265	155, 199. 1C
2 806	3 087	3 261	3 505	3 808	4 095	4 370	4 763	5 168	156
2 499	2 657	2 913	3 063	3 352	3 488	3 743	4 032	4 096	157
5 262	5 510	5 964	5 934	6 471	6 718	7 236	7 566	7 990	160-165
146	127	107	111	130	120	106	91	87	161
4 429	4 693	5 113	5 323	5 856	6 161	6 661	7 007	7 479	162
281	280	300	238	221	214	183	203	185	170
319	376	353	286	292	293	278	267	289	172, 173
3 347	3 570	3 755	3 878	4 141	4 364	4 311	4 417	4 825	174, 175
5 879	5 694	5 710	5 644	5 465	5 354	5 179	5 133	4 975	179-182
1 730	1 788	1 963	2 070	2 098	2 305	2 349	2 434	2 561	183. 0
.	.	.	.	.	.	.	.	.	185-187
.	.	.	.	.	.	.	.	.	185
1 041	1 022	1 135	1 173	1 282	1 289	1 341	1 478	1 466	188, 189
662	640	638	676	755	732	750	826	772	188
307	309	401	414	422	460	491	530	566	189. 0, 189. 1
3 393	3 500	3 556	3 820	3 896	4 111	4 257	4 393	4 701	200-208
1 844	1 884	1 849	1 976	1 943	1 978	2 074	2 110	2 269	204-208

別にみた性・年次別死亡率(人口10万対)(つづき)

昭和51年	52年	53年	54年	*55年	56年	57年	58年	59年	基本分類番号
106.7	108.8	111.3	113.5	115.5	117.3	118.4	120.8	123.7	140-208
0.8	0.8	0.9	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	140-149
57.1	58.4	58.9	66.8	67.3	68.3	68.8	70.1	71.6	150-159
2.0	2.1	2.1	1.9	2.1	2.0	2.0	2.0	1.9	150
34.3	34.4	33.4	33.8	33.2	32.3	31.7	31.1	31.1	151
5.8	6.1	6.7	6.7	7.2	7.8	8.1	8.5	9.1	152, 153
5.6	5.8	6.5	6.4	6.9	7.5	7.9	8.3	8.8	153
4.7	4.8	5.0	5.2	5.0	5.3	5.3	5.5	5.5	154
7.0	7.0	7.4	7.5	7.6	8.0	8.1	8.4	8.7	155, 199. 1C
4.9	5.4	5.6	6.0	6.4	6.9	7.3	7.9	8.5	156
4.4	4.6	5.0	5.2	5.7	5.9	6.2	6.7	6.7	157
9.2	9.6	10.3	10.1	10.9	11.3	12.1	12.5	13.2	160-165
0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	161
7.8	8.1	8.8	9.1	9.9	10.3	11.1	11.6	12.3	162
0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	170
0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	172, 173
5.9	6.2	6.5	6.6	7.0	7.3	7.2	7.3	7.9	174, 175
10.3	9.9	9.8	9.6	9.2	9.0	8.6	8.5	8.2	179-182
3.0	3.1	3.4	3.5	3.5	3.9	3.9	4.0	4.2	183. 0
.	.	.	.	.	.	.	.	.	185-187
.	.	.	.	.	.	.	.	.	185
1.8	1.8	2.0	2.0	2.2	2.2	2.2	2.4	2.4	188, 189
1.2	1.1	1.1	1.2	1.3	1.2	1.3	1.4	1.3	188
0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9	189. 0, 189. 1
5.9	6.1	6.1	6.5	6.6	6.9	7.1	7.3	7.7	200-208
3.2	3.3	3.2	3.4	3.3	3.3	3.5	3.5	3.7	204-208