

〔地域別にみた周産期死亡〕

表 8.4 都道府県別にみた妊娠満28週以後の死産—早期新生児死亡別周産期死亡数・率
(出生千対)及び周産期死亡中妊娠満28週以後の死産の占める割合

都道府県	周産期死亡数			周産期死亡率(出生千対)			周産期死亡中 妊娠満28週以後の死産の占める割合(%)
	総数	妊娠満28週以後の死産	早期新生児死亡	総数	妊娠満28週以後の死産比	早期新生児死亡率	
全 国	18 385	12 231	6 154	11.7	7.8	3.9	66.5
北海道	900	558	342	11.9	7.4	4.5	62.0
青森	261	165	96	12.0	7.6	4.4	63.2
岩手	239	139	100	12.2	7.1	5.1	58.2
宮城	386	229	157	12.4	7.4	5.0	59.3
秋田	161	97	64	9.9	5.9	3.9	60.2
山形	173	109	64	10.3	6.5	3.8	63.0
福島	427	288	139	14.5	9.8	4.7	67.4
茨城	522	328	194	14.4	9.0	5.3	62.8
栃木	341	229	112	13.2	8.8	4.3	67.2
群馬	321	208	113	12.8	8.3	4.5	64.8
埼玉県	899	603	296	12.0	8.0	3.9	67.1
千葉県	774	544	230	11.8	8.3	3.5	70.3
東京都	1 493	1 024	469	10.7	7.3	3.4	68.6
神奈川県	1 026	668	358	10.9	7.1	3.8	65.1
新潟	377	242	135	11.5	7.4	4.1	64.2
富山	140	88	52	10.3	6.5	3.8	62.9
石川	179	112	67	11.8	7.4	4.4	62.6
福井	101	72	29	9.4	6.7	2.7	71.3
山梨	147	113	34	14.7	11.3	3.4	76.9
長野	371	254	117	13.6	9.3	4.3	68.5
岐阜	307	205	102	11.9	7.9	3.9	66.8
静岡県	488	346	142	10.3	7.3	3.0	70.9
愛知県	949	640	309	10.8	7.3	3.5	67.4
三重	239	156	83	11.1	7.3	3.9	65.3
滋賀	200	137	63	12.5	8.6	4.0	68.5
京都府	353	239	114	11.0	7.4	3.5	67.7
大阪府	1 268	879	389	11.3	7.9	3.5	69.3
兵庫県	766	525	241	11.2	7.6	3.5	68.5
奈良	224	154	70	14.0	9.7	4.4	68.8
和歌山	168	94	74	12.5	7.0	5.5	56.0
鳥取	76	49	27	9.3	6.0	3.3	64.5
島根	141	78	63	14.2	7.8	6.3	55.3
岡山	186	134	52	7.6	5.5	2.1	72.0
広島	407	269	138	10.9	7.2	3.7	66.1
山口	252	158	94	12.7	8.0	4.7	62.7
徳島	145	109	36	13.8	10.3	3.4	75.2
香川	121	74	47	9.3	5.7	3.6	61.2
愛媛	240	162	78	12.2	8.2	4.0	67.5
高知	124	80	44	13.2	8.5	4.7	64.5
福岡	687	474	213	10.7	7.4	3.3	69.0
佐賀	110	76	34	8.8	6.1	2.7	69.1
長崎	282	209	73	12.7	9.4	3.3	74.1
熊本	313	191	122	12.8	7.8	5.0	61.0
大分	225	136	89	13.8	8.3	5.5	60.4
宮崎	247	164	83	14.5	9.7	4.9	66.4
鹿児島	349	239	110	14.2	9.7	4.5	68.5
沖縄	241	162	79	11.9	8.0	3.9	67.2
不詳	39	22	17	...	...	...	...

昭和55年

〔母の年齢別にみた周産期死亡〕

表 8.5 母の年齢別にみた性・妊娠満28週以後の死産—早期新生児死亡別周産期死亡数及び率(母の年齢・性別出生千対)

母の年齢	総 数			妊娠満28週以後の死産			早期新生児死亡		
	総数 ¹⁾	男	女	総数 ¹⁾	男	女	総数	男	女
総数 ¹⁾	18 385	10 097	8 123	12 231	6 488	5 578	6 154	3 609	2 545
～19歳	321	174	145	219	115	102	102	59	43
20～24	3 422	1 903	1 482	2 262	1 237	988	1 160	666	494
25～29	8 283	4 557	3 657	5 457	2 893	2 495	2 826	1 664	1 162
30～34	4 703	2 588	2 075	3 167	1 645	1 482	1 536	943	593
35～39	1 263	678	573	880	477	391	383	201	182
40～44	290	148	141	206	105	100	84	43	41
45～	27	14	13	20	9	11	7	5	2
総数	11.7	12.4	10.6	7.8	8.0	7.3	3.9	4.4	3.3
～19歳	22.0	23.4	20.2	15.0	15.5	14.2	7.0	7.9	6.0
20～24	11.5	12.5	10.3	7.6	8.1	6.9	3.9	4.4	3.4
25～29	10.2	10.9	9.3	6.7	6.9	6.3	3.5	4.0	3.0
30～34	12.1	12.9	11.0	8.1	8.2	7.9	3.9	4.7	3.1
35～39	21.4	22.3	19.9	14.9	15.7	13.6	6.5	6.6	6.3
40～44	42.0	42.4	41.2	29.8	30.1	29.2	12.2	12.3	12.0
45～	104.7	97.2	114.0	77.5	62.5	96.5	27.1	34.7	17.5

注: 1) 性・年齢ともに不詳を含む。

〔単産—複産・出産順位別にみた周産期死亡〕

表 8.6 単産—複産・出産順位¹⁾別にみた妊娠満28週以後の死産—早期新生児死亡別周産期死亡数及び率(単産—複産・出産順位別出生千対)

出産順位	総 数			妊娠満28週以後の死産			早期新生児死亡		
	総数	単産	複産	総数	単産	複産	総数	単産	複産
総数 ²⁾	18 385	17 177	1 208	12 231	11 483	748	6 154	5 694	460
第1児	7 845	7 656	189	5 334	5 226	108	2 511	2 430	81
2	6 183	5 670	513	3 911	3 591	320	2 272	2 079	193
3	2 975	2 652	323	1 996	1 800	196	979	852	127
4	865	738	127	614	527	87	251	211	40
5～	517	461	56	376	339	37	141	122	19
総数	11.7	11.0	62.9	7.8	7.4	39.0	3.9	3.7	24.0
第1児	11.9	11.7	50.7	8.1	8.0	28.9	3.8	3.7	21.7
2	9.7	9.0	65.6	6.1	5.7	40.9	3.6	3.3	24.7
3	12.8	11.7	59.5	8.6	7.9	36.1	4.2	3.7	23.4
4	25.8	23.2	71.6	18.3	16.6	49.1	7.5	6.6	22.6
5～	49.3	45.9	129.6	35.9	33.7	85.6	13.5	12.1	44.0

注: 1) 出産順位の総数は、同じ母の出産した児の数であって妊娠満20週以後の死産胎を含む。

2) 総数には出産順位不詳を含む。