

【全入院患者部門サーベイランスの概要と目的】

本サーベイランスの目的は、全入院患者を対象として主要な薬剤耐性菌による感染症患者の発生率に関するデータを継続的に収集・解析し、医療機関における薬剤耐性菌感染症の発生状況を明らかにすることである。

我が国において主要な薬剤耐性菌であるメチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）、バンコマイシン耐性腸球菌（VRE）、ペニシリン耐性肺炎球菌（PRSP）、多剤耐性緑膿菌（MDRP）、バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌（VRSA）、多剤耐性アシネトバクター属（MDRA）、カルバペネム耐性腸内細菌科細菌（CRE）の 7 種の薬剤耐性菌による新規感染症発症患者数および罹患率を算出する。

薬剤耐性菌は、巻末資料の判定基準に準じて各医療機関が判定しており、感染症の判定は原則以下の 1. または 2. に該当した場合とする。

1. 主治医（担当医）以外のサーベイランス担当医、感染症専門医（あるいは感染制御チーム等）が「感染症」と診断した場合。
2. MRSA が分離された患者の場合は、感染部位の炎症所見あるいは全身性の炎症マーカーが陽性で、抗 MRSA 薬が投与されている場合。

また、性別、年齢別、検体別、感染症名別、診療科別の集計も行い、医療機関の薬剤耐性菌による感染症発症状況のベンチマークとなる情報を提供する。

【図表】

1. データ提出医療機関*数
2. 新規感染症患者数と罹患率
3. 耐性菌新規感染症患者の性別内訳
4. 耐性菌新規感染症患者の年齢別内訳
5. 耐性菌新規感染症患者の検体内訳
6. 耐性菌新規感染症患者の感染症名別内訳
7. 耐性菌新規感染症患者の診療科別内訳

*ここではデータ提出医療機関は集計対象医療機関を表す

公開情報 2020 年 1 月～12 月 年報（全集計対象医療機関）

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門



【解説】

1. データ提出医療機関数

2020 年年報（2020 年 1 月～12 月）の集計対象医療機関数は 923 医療機関であり、前年より 9 医療機関増加した。これは国内 8,300 医療機関の 11.1%を占めていた。

2. 新規感染症患者数と罹患率

対象とする薬剤耐性菌による新規感染症発症患者数の合計は 16,600 人であった。このうち MRSA は 15,716 人 (94.67%) を占め、次いで CRE 528 人 (3.18%)、PRSP 239 人 (1.44%)、MDRP 91 人 (0.55%)、VRE 24 人 (0.14%)、MDRA 2 人 (0.01%) であった。新規感染症発症患者数が前年に比べて 30 人以上変化したのは MRSA と PRSP であり、MRSA では 1,0418 人の減少 (8%減)、PRSP では 320 人の減少 (57%減) であった。

各薬剤耐性菌の新規感染症患者数を分子、(総入院患者数-継続感染症患者数) を分母とした罹患率は、MRSA では 2.90%、CRE 0.10%、PRSP 0.04%、MDRP 0.02%であった。なお、VRSA による感染症の報告はなかった。

前年に比べ、MRSA では新規感染症発症患者数が減少したにも関わらず、罹患率は 0.03%の増加となった。これは、総入院患者数が前年より 553,711 人減少し、罹患率の分母の減少率 (9%減) の方が、分子である新規感染症発症患者数の減少率より大きいためであり、罹患率を解釈する上で注意が必要である。なお、総入院患者数が減少したのは、新型コロナウイルス感染拡大の影響のためと考えられる。

3. 耐性菌新規感染症患者の性別内訳

新規感染症患者の合計は男性が多く、薬剤耐性菌別の男女比は、MRSA では 1.8 : 1、PRSP 1.8 : 1、MDRP 2 : 1、CRE 1.7 : 1 であった。

4. 耐性菌新規感染症患者の年齢別内訳

新規感染症患者の年齢分布は、70 歳以上が全体の 72.7%を占めていた。薬剤耐性菌別では、MRSA、PRSP、MDRP、CRE はいずれも 70 歳代以上が多かったものの、PRSP では 13.4%が 10 歳未満であった。

5. 耐性菌新規感染症患者の検体内訳

新規感染症患者において該当する薬剤耐性菌が分離された検体は、呼吸器系検体が 39.6%と最も多くを占め、中でも PRSP は 77.0%が呼吸器系検体であった。同様に MRSA、MDRP でも呼吸器系検体が 39.9%、37.4%と最も多かったが、CRE では血液検体が 27.3%と最も多くを占めていた。

6. 耐性菌新規感染症患者の感染症名別内訳

新規感染症患者の感染症名は、肺炎が最も多く 35.7%を占めた。中でも PRSP では肺炎が 67.8%、肺炎以外の呼吸器感染症が 10.5%であった。MRSA では肺炎が 35.9%と最も多く、次いで菌血症 21.5%、皮膚・軟部組織感染 17.3%、手術創感染 7.7%の順で報告された。MDRP では肺炎と尿路感染症がともに 33.0%と同率で、CRE では菌血症が 25.4%と最も多く、次いで尿路感染症が 23.7%で報告された。

7. 耐性菌新規感染症患者の診療科別内訳

新規感染症患者の診療科別割合は、内科系 46.5%、外科系 41.6%、小児科系 2.4%であった。耐性菌別では、MRSA は内科系 46.4%、外科系 41.9%、MDRP は内科系 54.9%、外科系 36.3%、CRE は内科系 45.3%、外科系 43.9%であった。PRSP は内科系 54.8%、次いで小児科系 18.8%、外科系は 15.5%であり、いずれも内科系が多かった。

2020 年 1 月～12 月のうち、ひと月でもデータが未提出の 25 医療機関は集計対象外とした。


下記の基準に該当する医療機関に問い合わせを行った結果、提出されたデータに疑義が生じた 3 医療機関と 19 床以下の 1 医療機関についても集計から除外した。このため、年報の結果は月報や四半期報の結果とは異なる場合がある。

疑義データ および 集計対象外医療機関の条件

- 19 床以下の有床診療所の報告。
- 年間を通じて MRSA 感染症患者の報告がない。
- VRSA、VRE、MDRA 感染症の報告が年間 1 件以上ある。
- MRSA、MDRP、PRSP、CRE 感染症の罹患率が高く逸脱している（極値）。

公開情報 2020年1月～12月 年報(全集計対象医療機関)
院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門

1. データ提出医療機関*数(923医療機関)



*ここではデータ提出医療機関は集計対象医療機関を表す

† JANIS参加 = 2020年1月～12月 集計対象医療機関数

‡ JANIS非参加 = (2019年 全国医療機関数¶) - (2020年1月～12月 集計対象医療機関数)

病床数	2019年 全国医療機関数¶	2020年1月～12月 集計対象医療機関数 (全国医療機関数に占める割合)
900床以上	52	15 (28.8%)
500～899床	349	134 (38.4%)
200～499床	2,130	481 (22.6%)
200床未満	5,769	293 (5.1%)
病床数不明	-	0 (-)
合計	8,300	923 (11.1%)

¶2019年医療施設（動態）調査を参照した。


公開情報 2020年1月～12月 年報(全集計対象医療機関)
院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門

2. 新規感染症患者数と罹患率

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(%)の分布
MRSA	5,427,970	281	15,716	2.90%	0.00 2.53 72.24 中


集計対象医療機関の罹患率(N=923)



バンコマイシン耐性腸球菌(VRE)感染症

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(%)の分布
VRE	5,427,970	0	24	0.00%	0.00 0.00 1.58

集計対象医療機関の罹患率(N=923)




公開情報 2020年1月～12月 年報(全集計対象医療機関)
院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門

2. 新規感染症患者数と罹患率

ペニシリン耐性肺炎球菌(PRSP)感染症

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(%)の分布
PRSP	5,427,970	1	239	0.04%	0.00 0.00 59.70


集計対象医療機関の罹患率(N=923)



多剤耐性緑膿菌(MDRP)感染症

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(%)の分布
MDRP	5,427,970	0	91	0.02%	0.00 0.00 4.49

集計対象医療機関の罹患率(N=923)




公開情報 2020年1月～12月 年報(全集計対象医療機関)
院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門

2. 新規感染症患者数と罹患率

多剤耐性アシネトバクター属(MDRA)感染症

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(%)の分布
MDRA	5,427,970	0	2	0.00%	0.00 0.00 0.11


集計対象医療機関の罹患率(N=923)



カルバペネム耐性腸内細菌科細菌(CRE)感染症

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(%)の分布
CRE	5,427,970	5	528	0.10%	0.00 0.00 5.62

集計対象医療機関の罹患率(N=923)



2. 新規感染症患者数と罹患率

バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌(VRSA)感染症の報告はありませんでした

総入院患者数、新規感染症患者数、罹患率の説明

総入院患者数 = (対象期間の各月の新規入院患者数の合計) + (対象期間の一番初めの月の継続入院患者数)

感染症患者数 = (新規感染症患者数) + (対象期間の一番初めの月の継続感染症患者数)


新規感染症患者数 = 対象期間の各月の新規感染症患者数の合計

継続感染症患者数 = 対象期間の一番初めの月より前に新規感染症患者とされ、対象期間の一番初めの月に改めて検査した際にも、継続的に同じ耐性菌に感染していた患者の数

罹患率 = (新規感染症患者数) ÷ ((総入院患者数) - (対象期間の一番初めの月の継続感染症患者数)) × 1000


全体の罹患率 = (集計対象医療機関の新規感染症患者数合計) ÷ ((集計対象医療機関の総入院患者数合計) - (集計対象医療機関の対象期間の一番初めの月の継続感染症患者数合計)) × 1000

3. 耐性菌新規感染症患者の性別内訳




分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
男	10,656 (64.2%)	10,095 (64.2%)	0 (-)	11 (45.8%)	154 (64.4%)	62 (68.1%)	2 (100.0%)	332 (62.9%)
女	5,944 (35.8%)	5,621 (35.8%)	0 (-)	13 (54.2%)	85 (35.6%)	29 (31.9%)	0 (-)	196 (37.1%)
合計	16,600	15,716	0	24	239	91	2	528

4. 耐性菌新規感染症患者の年齢別内訳



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
1歳未満	236(1.4%)	224(1.4%)	0(-)	0(-)	4(1.7%)	0(-)	0(-)	8(1.5%)
1歳以上5歳未満	153(0.9%)	122(0.8%)	0(-)	0(-)	26(10.9%)	0(-)	0(-)	5(0.9%)
5歳以上10歳未満	56(0.3%)	54(0.3%)	0(-)	0(-)	2(0.8%)	0(-)	0(-)	0(-)
10歳代	119(0.7%)	111(0.7%)	0(-)	0(-)	6(2.5%)	0(-)	0(-)	2(0.4%)
20歳代	156(0.9%)	143(0.9%)	0(-)	0(-)	6(2.5%)	2(2.2%)	0(-)	5(0.9%)
30歳代	249(1.5%)	234(1.5%)	0(-)	0(-)	9(3.8%)	1(1.1%)	1(50.0%)	4(0.8%)
40歳代	565(3.4%)	536(3.4%)	0(-)	0(-)	7(2.9%)	7(7.7%)	0(-)	15(2.8%)
50歳代	1,000(6.0%)	942(6.0%)	0(-)	3(12.5%)	6(2.5%)	9(9.9%)	0(-)	40(7.6%)
60歳代	2,005(12.1%)	1,879(12.0%)	0(-)	3(12.5%)	34(14.2%)	10(11.0%)	0(-)	79(15.0%)
70歳代	4,337(26.1%)	4,093(26.0%)	0(-)	5(20.8%)	41(17.2%)	31(34.1%)	1(50.0%)	166(31.4%)
80歳代	5,474(33.0%)	5,208(33.1%)	0(-)	10(41.7%)	72(30.1%)	19(20.9%)	0(-)	165(31.3%)
90歳以上	2,250(13.6%)	2,170(13.8%)	0(-)	3(12.5%)	26(10.9%)	12(13.2%)	0(-)	39(7.4%)
合計	16,600	15,716	0	24	239	91	2	528

5. 耐性菌新規感染症患者の検体*内訳




分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
呼吸器系	6,574(39.6%)	6,266(39.9%)	0(-)	1(4.2%)	184(77.0%)	34(37.4%)	1(50.0%)	88(16.7%)
尿検体	1,018(6.1%)	851(5.4%)	0(-)	8(33.3%)	1(0.4%)	33(36.3%)	0(-)	125(23.7%)
便検体	282(1.7%)	272(1.7%)	0(-)	1(4.2%)	0(-)	2(2.2%)	0(-)	7(1.3%)
血液検体	3,701(22.3%)	3,508(22.3%)	0(-)	7(29.2%)	35(14.6%)	7(7.7%)	0(-)	144(27.3%)
髄液検体	45(0.3%)	32(0.2%)	0(-)	0(-)	11(4.6%)	0(-)	0(-)	2(0.4%)
その他	4,980(30.0%)	4,787(30.5%)	0(-)	7(29.2%)	8(3.3%)	15(16.5%)	1(50.0%)	162(30.7%)
合計	16,600	15,716	0	24	239	91	2	528

*検体区分については巻末の資料 1 を参照


公開情報 2020年1月～12月 年報(全集計対象医療機関)
院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門

6. 耐性菌新規感染症患者の感染症名別内訳



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
尿路	1,081(6.5%)	917(5.8%)	0(-)	8(33.3%)	1(0.4%)	30(33.0%)	0(-)	125(23.7%)
肺炎	5,918(35.7%)	5,638(35.9%)	0(-)	2(8.3%)	162(67.8%)	30(33.0%)	1(50.0%)	85(16.1%)
肺炎以外	453(2.7%)	422(2.7%)	0(-)	0(-)	25(10.5%)	2(2.2%)	0(-)	4(0.8%)
消化器系	527(3.2%)	432(2.7%)	0(-)	4(16.7%)	2(0.8%)	4(4.4%)	0(-)	85(16.1%)
中枢神経系	53(0.3%)	41(0.3%)	0(-)	0(-)	9(3.8%)	0(-)	0(-)	3(0.6%)
皮膚・軟部	2,762(16.6%)	2,718(17.3%)	0(-)	0(-)	5(2.1%)	7(7.7%)	0(-)	32(6.1%)
手術創	1,241(7.5%)	1,203(7.7%)	0(-)	3(12.5%)	1(0.4%)	4(4.4%)	0(-)	30(5.7%)
菌血症	3,563(21.5%)	3,386(21.5%)	0(-)	7(29.2%)	26(10.9%)	9(9.9%)	1(50.0%)	134(25.4%)
その他	1,002(6.0%)	959(6.1%)	0(-)	0(-)	8(3.3%)	5(5.5%)	0(-)	30(5.7%)
合計	16,600	15,716	0	24	239	91	2	528

7. 耐性菌新規感染症患者の診療科*別内訳



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
内科系	7,721(46.5%)	7,289(46.4%)	0(-)	12(50.0%)	131(54.8%)	50(54.9%)	0(-)	239(45.3%)
外科系	6,903(41.6%)	6,587(41.9%)	0(-)	12(50.0%)	37(15.5%)	33(36.3%)	2(100.0%)	232(43.9%)
小児科系	404(2.4%)	347(2.2%)	0(-)	0(-)	45(18.8%)	0(-)	0(-)	12(2.3%)
その他	1,572(9.5%)	1,493(9.5%)	0(-)	0(-)	26(10.9%)	8(8.8%)	0(-)	45(8.5%)
合計	16,600	15,716	0	24	239	91	2	528

*診療科の内訳については巻末の資料2を参照

・ 資料 1

呼吸器系検体	喀出痰
	気管内採痰
	気管支洗浄液
	咽頭粘液
	鼻腔内
	口腔内
	生検材料(肺)
	胸水
	その他(呼吸器)
尿検体	自然排尿
	採尿カテーテル
	留置カテーテル
	カテーテル尿
便検体	糞便
血液検体	静脈血
	動脈血
髄液検体	髄液
その他	尿道分泌液
	膣分泌液
	胃・十二指腸液
	胆汁
	生検材料(消化管)
	腹水
	関節液
	その他

・ 資料 2

内科系	内科
	循環器内科
	神経内科
	呼吸器内科
	消化器内科
	胃腸科
	内分泌・代謝内科
	腎臓内科
	糖尿病内科
	アレルギー・膠原病内科
	膠原病内科
	アレルギー内科
	リウマチ内科
	血液内科
	感染症内科
	老人内科
	心療内科
その他	性病科
	神経科
	精神科
	放射線科
	総合診療部
	救急部
	救急・集中治療部
	集中治療部(ICU)
	冠動脈疾患集中治療部(CCU)
	内視鏡科
	透析科
	理学療法・リハビリテーション科
	理学療法科
	リハビリテーション科
	麻酔科
	その他
外科系	外科
	消化器外科
	肛門科
	肝胆脾外科
	心血管外科
	内分泌外科
	呼吸器外科
	小児外科
	小児循環器外科
	小児消化器外科
	産婦人科
	産科
	婦人科
	整形外科
	美容外科
	眼科
	耳鼻咽喉科
	気管食道科
	泌尿器科
	皮膚・泌尿器科
	皮膚科
	脳神経外科
	形成外科
	歯科口腔外科
	歯科
	小児歯科
	矯正歯科
	口腔外科
	手術部
	移植・人工臓器科
小児科系	小児科
	新生児科
	新生児集中治療部(NICU)
	周産期センター

厚生労働省 院内感染対策サーベイランス 薬剤耐性菌 判定基準 (Ver.3.2)

菌名	概要	菌名コード	微量液体希釈法の基準	ディスク拡散法の基準
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌 (MRSA)	MPIPC または CFX が “R” の <i>Staphylococcus aureus</i> または選択培地で MRSA と確認された菌	1301、1303	MPIPC $\geq$ 4 μ g/mL* または CFX $\geq$ 8 μ g/mL*	MPIPC $\leq$ 10mm† CFX $\leq$ 21mm*
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌 (VRSA)	VCM が微量液体希釈法で “R” の <i>Staphylococcus aureus</i>	1301、1303-1306	VCM $\geq$ 16 μ g/mL*	
バンコマイシン耐性腸球菌 (VRE)	下記のいずれかの条件を満たす <i>Enterococcus</i> spp. ・ VCM が微量液体希釈法で耐性† ・ VCM がディスク拡散法で “R” ・ 選択培地で VRE と確認された菌 注) 種の同定が行われていない <i>Enterococcus</i> sp.は除く	1201、1202、1205、1206、1209、1210、1213-1217	VCM $\geq$ 16 μ g/mL†	VCM $\leq$ 14mm*
ペニシリン耐性肺炎球菌 (PRSP)	PCG が微量液体希釈法で耐性†、または MPIPC がディスク拡散法で “S 以外” の <i>Streptococcus pneumoniae</i>	1131	PCG $\geq$ 0.125 μ g/mL†	MPIPC $\leq$ 19mm†
多剤耐性緑膿菌 (MDRP)	下記のすべての条件を満たす <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ・ カルバペネム系 (IPM、MEPM のいずれか) が微量液体希釈法で耐性†、またはディスク拡散法で “R” ・ アミノグリコシド系は AMK が微量液体希釈法で耐性†、またはディスク拡散法で “R” ・ フルオロキノロン系が “R” (NFLX、OFLX、LVFX、LFLX、CPFX のいずれか)	4001	IPM・MEPM $\geq$ 16 μ g/mL† AMK $\geq$ 32 μ g/mL† NFLX $\geq$ 16 μ g/mL* OFLX・LVFX・LFLX $\geq$ 8mL* CPFX $\geq$ 4 μ g/mL*†	IPM・MEPM $\leq$ 13mm† AMK $\leq$ 14mm* NFLX・OFLX $\leq$ 12mm* LVFX $\leq$ 13mm* LFLX $\leq$ 18mm* CPFX $\leq$ 15mm*†
多剤耐性アシネトバクター属 (MDRA)	下記のすべての条件を満たす <i>Acinetobacter</i> spp. ・ カルバペネム系が “R” (IPM、MEPM のいずれか) ・ アミノグリコシド系は AMK が微量液体希釈法で耐性† またはディスク拡散法で “R” ・ フルオロキノロン系が “R” (LVFX、CPFX のいずれか)	4400-4403	IPM・MEPM $\geq$ 16 μ g/mL† AMK $\geq$ 32 μ g/mL† LVFX $\geq$ 8 μ g/mL* CPFX $\geq$ 4 μ g/mL*†	IPM・MEPM $\leq$ 13mm† AMK $\leq$ 14mm† LVFX $\leq$ 13mm* CPFX $\leq$ 15mm*†
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌 (CRE)	下記のいずれかの条件を満たす腸内細菌科細菌 ・ MEPM が耐性† ・ IPM が耐性†、かつ CMZ が “R”	2000-2691、3150-3151	MEPM $\geq$ 2 μ g/mL† IPM $\geq$ 2 μ g/mL† かつ CMZ $\geq$ 64 μ g/mL*†	MEPM $\leq$ 22mm† IPM $\leq$ 22mm† かつ CMZ $\leq$ 12mm*†

* S,I,R の判定は CLSI2012(M100-S22)に準拠

† 感染症発生动向調査の基準に準拠

公開情報 2020 年 1 月～12 月 年報(集計対象医療機関・200 床以上)
院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門



【全入院患者部門サーベイランスの概要と目的】

本サーベイランスの目的は、全入院患者を対象として主要な薬剤耐性菌による感染症患者の発生率に関するデータを継続的に収集・解析し、医療機関における薬剤耐性菌感染症の発生状況を明らかにすることである。

我が国において主要な薬剤耐性菌であるメチシリン耐性黄色ブドウ球菌 (MRSA)、バンコマイシン耐性腸球菌 (VRE)、ペニシリン耐性肺炎球菌 (PRSP)、多剤耐性緑膿菌 (MDRP)、バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌 (VRSA)、多剤耐性アシネトバクター属 (MDRA)、カルバペネム耐性腸内細菌科細菌 (CRE) の 7 種の薬剤耐性菌による新規感染症発症患者数および罹患率を算出する。

薬剤耐性菌は、巻末資料の判定基準に準じて各医療機関が判定しており、感染症の判定は原則以下の 1. または 2. に該当した場合とする。

1. 主治医 (担当医) 以外のサーベイランス担当医、感染症専門医 (あるいは感染制御チーム等) が「感染症」と診断した場合。
2. MRSA が分離された患者の場合は、感染部位の炎症所見あるいは全身性の炎症マーカーが陽性で、抗 MRSA 薬が投与されている場合。

また、性別、年齢別、検体別、感染症名別、診療科別の集計も行い、医療機関の薬剤耐性菌による感染症発症状況のベンチマークとなる情報を提供する。

【図表】

1. データ提出医療機関*数
2. 新規感染症患者数と罹患率
3. 耐性菌新規感染症患者の性別内訳
4. 耐性菌新規感染症患者の年齢別内訳
5. 耐性菌新規感染症患者の検体内訳
6. 耐性菌新規感染症患者の感染症名別内訳
7. 耐性菌新規感染症患者の診療科別内訳

*ここではデータ提出医療機関は集計対象医療機関を表す

【解説】

1. データ提出医療機関数

病床規模が 200 床以上の 2020 年年報 (2020 年 1 月～12 月) 集計対象医療機関数は 630 医療機関であった。これは国内 2,531 医療機関の 24.9%を占めていた。

2. 新規感染症患者数と罹患率

対象とする薬剤耐性菌による新規感染症発症患者数の合計は 14,377 人であった。このうち MRSA は 13,561 人 (94.32%) を占め、次いで CRE 490 人 (3.41%)、PRSP 220 人 (1.53%)、MDRP 81 人 (0.56%)、VRE 23 人 (0.16%)、MDRA 2 人 (0.01%) であった。

新規感染症発症患者数が前年に比べて 30 人以上変化したのは MRSA と PRSP であり、MRSA では 1,571 人の減少 (10%減)、PRSP では 304 人の減少 (58%減) であった。

各薬剤耐性菌の新規感染症患者数を分子、(総入院患者数-継続感染症患者数) を分母とした罹患率は、MRSA では 2.79%、CRE 0.10%、PRSP 0.05%、MDRP 0.02%であった。なお、VISA による感染症の報告はなかった。

3. 耐性菌新規感染症患者の性別内訳

新規感染症患者の合計は男性が多く、薬剤耐性菌別の男女比は、MRSA は 1.8 : 1、PRSP は 2 : 1、MDRP は 2.5 : 1、CRE は 1.7 : 1 であった。VRE は 1 : 1.3 と女性が多かった。

4. 耐性菌新規感染症患者の年齢別内訳

新規感染症患者の年齢分布は、70 歳代以上が全体の 70.8%を占めていた。薬剤耐性菌別では、MRSA、VRE、PRSP、MDRP、CRE はいずれも 70 歳代以上が多かったものの、PRSP では 14.1% が 10 歳未満であった。

5. 耐性菌新規感染症患者の検体内訳

新規感染症患者において該当する薬剤耐性菌が分離された検体は、呼吸器系検体が 37.2%と最も多くを占め、中でも PRSP は 75.5%が呼吸器系検体であった。MRSA、MDRP でも同様に呼吸器系検体が 37.3%、39.5%と最も多かったが、CRE では血液検体が 28.4%と最も多くを占めていた。

6. 耐性菌新規感染症患者の感染症名別内訳

新規感染症患者の感染症名は、肺炎が最も多く 33.6%を占めた。中でも PRSP では肺炎が 68.2%、肺炎以外の呼吸器感染症が 1.2%であった。MRSA では肺炎が 33.7%と最も多く、次いで菌血症 23.0%、皮膚・軟部組織感染 18.1%、手術創感染 8.2%の順で報告された。MDRP でも肺炎が 35.8%と最も多く、次いで尿路感染症が 32.1%であった。CRE では菌血症が 26.5%と最も多く、尿路感染症 21.8%、肺炎 16.1%の順で報告された。

7. 耐性菌新規感染症患者の診療科別内訳

新規感染症患者の診療科別割合は、内科系 44.2%、外科系 43.1%、小児科系 2.7%であった。耐性菌別では、MRSA は内科系 43.9%、外科系 43.6%、MDRP は内科系 55.6%、外科系 34.6%、CRE は内科系 45.1%、外科系 44.7%と内科系が多かった。PRSP は内科系 56.8%、次いで小児科系 16.8%であり、外科系は 15.9%であった。

2020 年 1 月～12 月のうち、ひと月でもデータが未提出の 14 医療機関は集計対象外とした。


下記の基準に該当する医療機関に問い合わせを行った結果、提出されたデータに疑義が生じた 1 医療機関についても集計から除外した。このため、年報の結果は月報や四半期報の結果とは異なる場合がある。

疑義データ および 集計対象外医療機関の条件

- 19 床以下の有床診療所の報告。
- 年間を通じて MRSA 感染症患者の報告がない。
- VRSA、VRE、MDRA 感染症の報告が年間 1 件以上ある。
- MRSA、MDRP、PRSP、CRE 感染症の罹患率が高く逸脱している（極値）。

公開情報 2020年1月～12月 年報(集計対象医療機関・200床以上)
院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門

1. データ提出医療機関*数(630医療機関)



*ここではデータ提出医療機関は集計対象医療機関を表す

† JANIS参加 = 2020年1月～12月 集計対象医療機関数

‡ JANIS非参加 = (2019年 全国医療機関数¶) - (2020年1月～12月 集計対象医療機関数)

病床数	2019年 全国医療機関数¶	2020年1月～12月 集計対象医療機関数 (全国医療機関数に占める割合)
900床以上	52	15 (28.8%)
500～899床	349	134 (38.4%)
200～499床	2,130	481 (22.6%)
200床未満	5,769	0 (0%)
病床数不明	-	0 (-)
合計	8,300	630 (7.6%)

¶2019年医療施設（動態）調査を参照した。


公開情報 2020年1月～12月 年報(集計対象医療機関・200床以上)
院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門

2. 新規感染症患者数と罹患率

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(%)の分布
MRSA	4,861,673	257	13,561	2.79%	0.00 2.49 39.22 中


集計対象医療機関の罹患率(N=630)



バンコマイシン耐性腸球菌(VRE)感染症

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(%)の分布
VRE	4,861,673	0	23	0.00%	0.00 0.00 1.58

集計対象医療機関の罹患率(N=630)




公開情報 2020年1月～12月 年報(集計対象医療機関・200床以上)
院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門

2. 新規感染症患者数と罹患率

ペニシリン耐性肺炎球菌(PRSP)感染症

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(%)の分布
PRSP	4,861,673	1	220	0.05%	0.00 0.00 1.17


集計対象医療機関の罹患率(N=630)



多剤耐性緑膿菌(MDRP)感染症

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(%)の分布
MDRP	4,861,673	0	81	0.02%	0.00 0.00 4.49

集計対象医療機関の罹患率(N=630)




公開情報 2020年1月～12月 年報(集計対象医療機関・200床以上)
院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門

2. 新規感染症患者数と罹患率

多剤耐性アシネトバクター属(MDRA)感染症

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(%)の分布
MDRA	4,861,673	0	2	0.00%	0.00 0.00 0.11


集計対象医療機関の罹患率(N=630)



カルバペネム耐性腸内細菌科細菌(CRE)感染症

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(%)の分布
CRE	4,861,673	5	490	0.10%	0.00 0.00 3.07

集計対象医療機関の罹患率(N=630)



2. 新規感染症患者数と罹患率

バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌(VRSA)感染症の報告はありませんでした

総入院患者数、新規感染症患者数、罹患率の説明

総入院患者数 = (対象期間の各月の新規入院患者数の合計) + (対象期間の一番初めの月の継続入院患者数)

感染症患者数 = (新規感染症患者数) + (対象期間の一番初めの月の継続感染症患者数)


新規感染症患者数 = 対象期間の各月の新規感染症患者数の合計

継続感染症患者数 = 対象期間の一番初めの月より前に新規感染症患者とされ、対象期間の一番初めの月に改めて検査した際にも、継続的に同じ耐性菌に感染していた患者の数

罹患率 = (新規感染症患者数) ÷ ((総入院患者数) - (対象期間の一番初めの月の継続感染症患者数)) × 1000

全体の罹患率 = (集計対象医療機関の新規感染症患者数合計) ÷ ((集計対象医療機関の総入院患者数合計) - (集計対象医療機関の対象期間の一番初めの月の継続感染症患者数合計)) × 1000

3. 耐性菌新規感染症患者の性別内訳




分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
男	9,323 (64.8%)	8,795 (64.9%)	0 (-)	10 (43.5%)	147 (66.8%)	58 (71.6%)	2 (100.0%)	311 (63.5%)
女	5,054 (35.2%)	4,766 (35.1%)	0 (-)	13 (56.5%)	73 (33.2%)	23 (28.4%)	0 (-)	179 (36.5%)
合計	14,377	13,561	0	23	220	81	2	490

公開情報 2020年1月～12月 年報(集計対象医療機関・200床以上)
院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門




4. 耐性菌新規感染症患者の年齢別内訳



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
1歳未満	215(1.5%)	208(1.5%)	0(-)	0(-)	4(1.8%)	0(-)	0(-)	3(0.6%)
1歳以上5歳未満	147(1.0%)	116(0.9%)	0(-)	0(-)	26(11.8%)	0(-)	0(-)	5(1.0%)
5歳以上10歳未満	54(0.4%)	53(0.4%)	0(-)	0(-)	1(0.5%)	0(-)	0(-)	0(-)
10歳代	106(0.7%)	101(0.7%)	0(-)	0(-)	3(1.4%)	0(-)	0(-)	2(0.4%)
20歳代	148(1.0%)	137(1.0%)	0(-)	0(-)	5(2.3%)	1(1.2%)	0(-)	5(1.0%)
30歳代	229(1.6%)	218(1.6%)	0(-)	0(-)	5(2.3%)	1(1.2%)	1(50.0%)	4(0.8%)
40歳代	531(3.7%)	505(3.7%)	0(-)	0(-)	5(2.3%)	6(7.4%)	0(-)	15(3.1%)
50歳代	929(6.5%)	873(6.4%)	0(-)	3(13.0%)	6(2.7%)	9(11.1%)	0(-)	38(7.8%)
60歳代	1,849(12.9%)	1,726(12.7%)	0(-)	3(13.0%)	32(14.5%)	10(12.3%)	0(-)	78(15.9%)
70歳代	3,834(26.7%)	3,604(26.6%)	0(-)	5(21.7%)	40(18.2%)	26(32.1%)	1(50.0%)	158(32.2%)
80歳代	4,595(32.0%)	4,351(32.1%)	0(-)	9(39.1%)	69(31.4%)	17(21.0%)	0(-)	149(30.4%)
90歳以上	1,740(12.1%)	1,669(12.3%)	0(-)	3(13.0%)	24(10.9%)	11(13.6%)	0(-)	33(6.7%)
合計	14,377	13,561	0	23	220	81	2	490

5. 耐性菌新規感染症患者の検体*内訳




分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
呼吸器系	5,346(37.2%)	5,065(37.3%)	0(-)	1(4.3%)	166(75.5%)	32(39.5%)	1(50.0%)	81(16.5%)
尿検体	853(5.9%)	710(5.2%)	0(-)	8(34.8%)	1(0.5%)	29(35.8%)	0(-)	105(21.4%)
便検体	204(1.4%)	195(1.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	2(2.5%)	0(-)	7(1.4%)
血液検体	3,410(23.7%)	3,222(23.8%)	0(-)	7(30.4%)	35(15.9%)	7(8.6%)	0(-)	139(28.4%)
髄液検体	43(0.3%)	30(0.2%)	0(-)	0(-)	11(5.0%)	0(-)	0(-)	2(0.4%)
その他	4,521(31.4%)	4,339(32.0%)	0(-)	7(30.4%)	7(3.2%)	11(13.6%)	1(50.0%)	156(31.8%)
合計	14,377	13,561	0	23	220	81	2	490

*検体区分については巻末の資料 1 を参照


公開情報 2020年1月～12月 年報(集計対象医療機関・200床以上)
院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門

6. 耐性菌新規感染症患者の感染症名別内訳



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
尿路	913(6.4%)	771(5.7%)	0(-)	8(34.8%)	1(0.5%)	26(32.1%)	0(-)	107(21.8%)
肺炎	4,824(33.6%)	4,564(33.7%)	0(-)	1(4.3%)	150(68.2%)	29(35.8%)	1(50.0%)	79(16.1%)
肺炎以外	346(2.4%)	323(2.4%)	0(-)	0(-)	19(8.6%)	1(1.2%)	0(-)	3(0.6%)
消化器系	448(3.1%)	358(2.6%)	0(-)	4(17.4%)	2(0.9%)	4(4.9%)	0(-)	80(16.3%)
中枢神経系	50(0.3%)	38(0.3%)	0(-)	0(-)	9(4.1%)	0(-)	0(-)	3(0.6%)
皮膚・軟部	2,497(17.4%)	2,456(18.1%)	0(-)	0(-)	4(1.8%)	6(7.4%)	0(-)	31(6.3%)
手術創	1,146(8.0%)	1,113(8.2%)	0(-)	3(13.0%)	1(0.5%)	1(1.2%)	0(-)	28(5.7%)
菌血症	3,293(22.9%)	3,120(23.0%)	0(-)	7(30.4%)	26(11.8%)	9(11.1%)	1(50.0%)	130(26.5%)
その他	860(6.0%)	818(6.0%)	0(-)	0(-)	8(3.6%)	5(6.2%)	0(-)	29(5.9%)
合計	14,377	13,561	0	23	220	81	2	490

7. 耐性菌新規感染症患者の診療科*別内訳



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
内科系	6,351(44.2%)	5,948(43.9%)	0(-)	12(52.2%)	125(56.8%)	45(55.6%)	0(-)	221(45.1%)
外科系	6,201(43.1%)	5,906(43.6%)	0(-)	11(47.8%)	35(15.9%)	28(34.6%)	2(100.0%)	219(44.7%)
小児科系	384(2.7%)	337(2.5%)	0(-)	0(-)	37(16.8%)	0(-)	0(-)	10(2.0%)
その他	1,441(10.0%)	1,370(10.1%)	0(-)	0(-)	23(10.5%)	8(9.9%)	0(-)	40(8.2%)
合計	14,377	13,561	0	23	220	81	2	490

*診療科の内訳については巻末の資料2を参照

・ 資料 1

呼吸器系検体	喀出痰
	気管内採痰
	気管支洗浄液
	咽頭粘液
	鼻腔内
	口腔内
	生検材料(肺)
	胸水
	その他(呼吸器)
尿検体	自然排尿
	採尿カテーテル
	留置カテーテル
	カテーテル尿
便検体	糞便
血液検体	静脈血
	動脈血
髄液検体	髄液
その他	尿道分泌液
	膣分泌液
	胃・十二指腸液
	胆汁
	生検材料(消化管)
	腹水
	関節液
	その他

・ 資料 2

内科系	内科
	循環器内科
	神経内科
	呼吸器内科
	消化器内科
	胃腸科
	内分泌・代謝内科
	腎臓内科
	糖尿病内科
	アレルギー・膠原病内科
	膠原病内科
	アレルギー内科
	リウマチ内科
	血液内科
	感染症内科
	老人内科
	心療内科
その他	性病科
	神経科
	精神科
	放射線科
	総合診療部
	救急部
	救急・集中治療部
	集中治療部(ICU)
	冠動脈疾患集中治療部(CCU)
	内視鏡科
	透析科
	理学療法・リハビリテーション科
	理学療法科
	リハビリテーション科
	麻酔科
	その他

外科系	外科
	消化器外科
	肛門科
	肝胆脾外科
	心血管外科
	内分泌外科
	呼吸器外科
	小児外科
	小児循環器外科
	小児消化器外科
	産婦人科
	産科
	婦人科
	整形外科
	美容外科
	眼科
	耳鼻咽喉科
	気管食道科
	泌尿器科
	皮膚・泌尿器科
	皮膚科
	脳神経外科
	形成外科
	歯科口腔外科
	歯科
	小児歯科
	矯正歯科
	口腔外科
	手術部
	移植・人工臓器科
小児科系	小児科
	新生児科
	新生児集中治療部(NICU)
	周産期センター

厚生労働省 院内感染対策サーベイランス 薬剤耐性菌 判定基準 (Ver.3.2)

菌名	概要	菌名コード	微量液体希釈法の基準	ディスク拡散法の基準
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌 (MRSA)	MPIPC または CFX が “R” の <i>Staphylococcus aureus</i> または選択培地で MRSA と確認された菌	1301、1303	MPIPC $\geq$ 4 μ g/mL* または CFX $\geq$ 8 μ g/mL*	MPIPC $\leq$ 10mm† CFX $\leq$ 21mm*
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌 (VRSA)	VCM が微量液体希釈法で “R” の <i>Staphylococcus aureus</i>	1301、1303-1306	VCM $\geq$ 16 μ g/mL*	
バンコマイシン耐性腸球菌 (VRE)	下記のいずれかの条件を満たす <i>Enterococcus</i> spp. ・ VCM が微量液体希釈法で耐性† ・ VCM がディスク拡散法で “R” ・ 選択培地で VRE と確認された菌 注) 種の同定が行われていない <i>Enterococcus</i> sp.は除く	1201、1202、1205、1206、1209、1210、1213-1217	VCM $\geq$ 16 μ g/mL†	VCM $\leq$ 14mm*
ペニシリン耐性肺炎球菌 (PRSP)	PCG が微量液体希釈法で耐性†、または MPIPC がディスク拡散法で “S 以外” の <i>Streptococcus pneumoniae</i>	1131	PCG $\geq$ 0.125 μ g/mL†	MPIPC $\leq$ 19mm†
多剤耐性緑膿菌 (MDRP)	下記のすべての条件を満たす <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ・ カルバペネム系 (IPM、MEPM のいずれか) が微量液体希釈法で耐性†、またはディスク拡散法で “R” ・ アミノグリコシド系は AMK が微量液体希釈法で耐性†、またはディスク拡散法で “R” ・ フルオロキノロン系が “R” (NFLX、OFLX、LVFX、LFLX、CPFX のいずれか)	4001	IPM・MEPM $\geq$ 16 μ g/mL† AMK $\geq$ 32 μ g/mL† NFLX $\geq$ 16 μ g/mL* OFLX・LVFX・LFLX $\geq$ 8mL* CPFX $\geq$ 4 μ g/mL*†	IPM・MEPM $\leq$ 13mm† AMK $\leq$ 14mm* NFLX・OFLX $\leq$ 12mm* LVFX $\leq$ 13mm* LFLX $\leq$ 18mm* CPFX $\leq$ 15mm*†
多剤耐性アシネトバクター属 (MDRA)	下記のすべての条件を満たす <i>Acinetobacter</i> spp. ・ カルバペネム系が “R” (IPM、MEPM のいずれか) ・ アミノグリコシド系は AMK が微量液体希釈法で耐性† またはディスク拡散法で “R” ・ フルオロキノロン系が “R” (LVFX、CPFX のいずれか)	4400-4403	IPM・MEPM $\geq$ 16 μ g/mL† AMK $\geq$ 32 μ g/mL† LVFX $\geq$ 8 μ g/mL* CPFX $\geq$ 4 μ g/mL*†	IPM・MEPM $\leq$ 13mm† AMK $\leq$ 14mm† LVFX $\leq$ 13mm* CPFX $\leq$ 15mm*†
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌 (CRE)	下記のいずれかの条件を満たす腸内細菌科細菌 ・ MEPM が耐性† ・ IPM が耐性†、かつ CMZ が “R”	2000-2691、3150-3151	MEPM $\geq$ 2 μ g/mL† IPM $\geq$ 2 μ g/mL† かつ CMZ $\geq$ 64 μ g/mL*†	MEPM $\leq$ 22mm† IPM $\leq$ 22mm† かつ CMZ $\leq$ 12mm*†

* S,I,R の判定は CLSI2012(M100-S22)に準拠

† 感染症発生动向調査の基準に準拠



【全入院患者部門サーベイランスの概要と目的】

本サーベイランスの目的は、全入院患者を対象として主要な薬剤耐性菌による感染症患者の発生率に関するデータを継続的に収集・解析し、医療機関における薬剤耐性菌感染症の発生状況を明らかにすることである。

我が国において主要な薬剤耐性菌であるメチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）、バンコマイシン耐性腸球菌（VRE）、ペニシリン耐性肺炎球菌（PRSP）、多剤耐性緑膿菌（MDRP）、バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌（VRSA）、多剤耐性アシネトバクター属（MDRA）、カルバペネム耐性腸内細菌科細菌（CRE）の 7 種の薬剤耐性菌による新規感染症発症患者数および罹患率を算出する。

薬剤耐性菌は、巻末資料の判定基準に準じて各医療機関が判定しており、感染症の判定は原則以下の 1. または 2. に該当した場合とする。

1. 主治医（担当医）以外のサーベイランス担当医、感染症専門医（あるいは感染制御チーム等）が「感染症」と診断した場合。
2. MRSA が分離された患者の場合は、感染部位の炎症所見あるいは全身性の炎症マーカーが陽性で、抗 MRSA 薬が投与されている場合。

また、性別、年齢別、検体別、感染症名別、診療科別の集計も行い、医療機関の薬剤耐性菌による感染症発症状況のベンチマークとなる情報を提供する。

【図表】

1. データ提出医療機関*数
2. 新規感染症患者数と罹患率
3. 耐性菌新規感染症患者の性別内訳
4. 耐性菌新規感染症患者の年齢別内訳
5. 耐性菌新規感染症患者の検体内訳
6. 耐性菌新規感染症患者の感染症名別内訳
7. 耐性菌新規感染症患者の診療科別内訳

*ここではデータ提出医療機関は集計対象医療機関を表す

【解説】

1. データ提出医療機関数

病床規模が 200 床未満の 2020 年年報 (2020 年 1 月～12 月) 集計対象医療機関数は 293 医療機関であり、前年より 17 施設増加した。これは国内 5,769 医療機関の 5.1%を占めていた。

2. 新規感染症患者数と罹患率

対象とする薬剤耐性菌による新規感染症発症患者数の合計は 2,223 人であった。

このうち MRSA は 2,155 人 (96.94%) を占め、次いで CRE 38 人 (1.71%)、PRSP 19 人 (0.85%)、MDRP 10 人 (0.45%)、VRE 1 人 (0.04%) であった。新規感染症発症患者数が前年に比べて 30 人以上変化したのは MRSA のみであり、153 人の増加 (8%増) であった。

各薬剤耐性菌の新規感染症患者数を分子、(総入院患者数-継続感染症患者数) を分母とした罹患率は、MRSA では 3.81‰、CRE 0.07‰、PRSP 0.03‰、MDRP 0.02‰であった。

なお、MDRA、VRSA による感染症の報告はなかった。

3. 耐性菌新規感染症患者の性別内訳

新規感染症患者の合計は男性が多く、薬剤耐性菌別の男女比は、MRSA では 1.5 : 1、CRE 1.2 : 1 であった。MDRP と PRSP は 1 : 1.5、1 : 1.7 と女性が多かった。

4. 耐性菌新規感染症患者の年齢別内訳

新規感染症患者の年齢分布は、70 歳代以上が全体の 85.0%を占めていた。

5. 耐性菌新規感染症患者の検体内訳

新規感染症患者において該当する薬剤耐性菌が分離された検体は、呼吸器系検体が 55.2%と最も多くを占め、中でも PRSP は 97.4%が呼吸器系検体であった。MRSA でも同様に呼吸器系検体が 55.7%と最も多かったが、MDRP と CRE では尿検体が 40.0%、52.6%と最も多くを占めていた。



6. 耐性菌新規感染症患者の感染症名別内訳

新規感染症患者の感染症名は、肺炎が最も多く 49.5%を占めていた。中でも PRSP では肺炎が 63.2%、肺炎以外の呼吸器感染症が 31.6%であった。MRSA では肺炎が 49.8%と最も多く、次いで菌血症 12.3%、皮膚・軟部組織感染 12.2%の順で報告された。

CRE は尿路感染症が 47.4%と最も多く、次いで肺炎 15.8%、消化器系 13.2%の順で報告された。MDRP でも尿路感染症が 40.0%と最も多く、次いで手術創感染 30.0%であった。

7. 耐性菌新規感染症患者の診療科別内訳

新規感染症患者の診療科別割合は、内科系 61.6%、外科系 31.6%、小児科系 0.9%であった。耐性菌別では、MRSA は内科系 62.2%、外科系 31.6%、CRE は内科系 47.4%、外科系 34.2%といずれも内科系が多かった。MDRP は内科系、外科系とも 50.0%と同率であった。

PRSP は内科系 31.6%、外科系 10.5%、小児科系 42.1%と小児科系が最も多かった。

2020 年 1 月～12 月のうち、ひと月でもデータが未提出の 11 医療機関は集計対象外とした。


下記の基準に該当する医療機関に問い合わせを行った結果、提出されたデータに疑義が生じた 2 医療機関と 19 床以下の 1 医療機関についても集計から除外した。このため、年報の結果は月報や四半期報の結果とは異なる場合がある。

疑義データ および 集計対象外医療機関の条件

- 19 床以下の有床診療所の報告。
- 年間を通じて MRSA 感染症患者の報告がない。
- VRSA、VRE、MDRA 感染症の報告が年間 1 件以上ある。
- MRSA、MDRP、PRSP、CRE 感染症の罹患率が高く逸脱している（極値）。

公開情報 2020年1月～12月 年報(集計対象医療機関・200床未満)
院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門

1. データ提出医療機関*数(293医療機関)



*ここではデータ提出医療機関は集計対象医療機関を表す

† JANIS参加 = 2020年1月～12月 集計対象医療機関数

‡ JANIS非参加 = (2019年 全国医療機関数¶) - (2020年1月～12月 集計対象医療機関数)

病床数	2019年 全国医療機関数¶	2020年1月～12月 集計対象医療機関数 (全国医療機関数に占める割合)
900床以上	52	0 (0%)
500～899床	349	0 (0%)
200～499床	2,130	0 (0%)
200床未満	5,769	293 (5.1%)
病床数不明	-	0 (-)
合計	8,300	293 (3.5%)

¶2019年医療施設（動態）調査を参照した。


公開情報 2020年1月～12月 年報(集計対象医療機関・200床未満)
院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門

2. 新規感染症患者数と罹患率

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(%)の分布
MRSA	566,297	24	2,155	3.81%	0.00 2.60 72.24 100


集計対象医療機関の罹患率(N=293)



バンコマイシン耐性腸球菌(VRE)感染症

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(%)の分布
VRE	566,297	0	1	0.00%	0.00 0.00 0.28

集計対象医療機関の罹患率(N=293)




公開情報 2020年1月～12月 年報(集計対象医療機関・200床未満)
院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門

2. 新規感染症患者数と罹患率

ペニシリン耐性肺炎球菌(PRSP)感染症

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(%)の分布
PRSP	566,297	0	19	0.03%	0.00 0.00 59.70


集計対象医療機関の罹患率(N=293)



多剤耐性緑膿菌(MDRP)感染症

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(%)の分布
MDRP	566,297	0	10	0.02%	0.00 0.00 3.91

集計対象医療機関の罹患率(N=293)




公開情報 2020年1月～12月 年報(集計対象医療機関・200床未満)
院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門

2. 新規感染症患者数と罹患率

カルバペネム耐性腸内細菌科細菌(CRE)感染症

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(%)の分布
CRE	566,297	0	38	0.07‰	0.00 0.00 5.62

集計対象医療機関の罹患率(N=293)



2. 新規感染症患者数と罹患率

バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌(VRSA)感染症の報告はありませんでした

多剤耐性アシネトバクター属(MDRA)感染症の報告はありませんでした

総入院患者数、新規感染症患者数、罹患率の説明

総入院患者数 = (対象期間の各月の新規入院患者数の合計) + (対象期間の一番初めの月の継続入院患者数)

感染症患者数 = (新規感染症患者数) + (対象期間の一番初めの月の継続感染症患者数)


新規感染症患者数 = 対象期間の各月の新規感染症患者数の合計

継続感染症患者数 = 対象期間の一番初めの月より前に新規感染症患者とされ、対象期間の一番初めの月に改めて検査した際にも、継続的に同じ耐性菌に感染していた患者の数

罹患率 = (新規感染症患者数) ÷ ((総入院患者数) - (対象期間の一番初めの月の継続感染症患者数)) × 1000


全体の罹患率 = (集計対象医療機関の新規感染症患者数合計) ÷ ((集計対象医療機関の総入院患者数合計) - (集計対象医療機関の対象期間の一番初めの月の継続感染症患者数合計)) × 1000

3. 耐性菌新規感染症患者の性別内訳




分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
男	1,333 (60.0%)	1,300 (60.3%)	0 (-)	1 (100.0%)	7 (36.8%)	4 (40.0%)	0 (-)	21 (55.3%)
女	890 (40.0%)	855 (39.7%)	0 (-)	0 (-)	12 (63.2%)	6 (60.0%)	0 (-)	17 (44.7%)
合計	2,223	2,155	0	1	19	10	0	38

4. 耐性菌新規感染症患者の年齢別内訳



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
1歳未満	21(0.9%)	16(0.7%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	5(13.2%)
1歳以上5歳未満	6(0.3%)	6(0.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
5歳以上10歳未満	2(0.1%)	1(0.0%)	0(-)	0(-)	1(5.3%)	0(-)	0(-)	0(-)
10歳代	13(0.6%)	10(0.5%)	0(-)	0(-)	3(15.8%)	0(-)	0(-)	0(-)
20歳代	8(0.4%)	6(0.3%)	0(-)	0(-)	1(5.3%)	1(10.0%)	0(-)	0(-)
30歳代	20(0.9%)	16(0.7%)	0(-)	0(-)	4(21.1%)	0(-)	0(-)	0(-)
40歳代	34(1.5%)	31(1.4%)	0(-)	0(-)	2(10.5%)	1(10.0%)	0(-)	0(-)
50歳代	71(3.2%)	69(3.2%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	2(5.3%)
60歳代	156(7.0%)	153(7.1%)	0(-)	0(-)	2(10.5%)	0(-)	0(-)	1(2.6%)
70歳代	503(22.6%)	489(22.7%)	0(-)	0(-)	1(5.3%)	5(50.0%)	0(-)	8(21.1%)
80歳代	879(39.5%)	857(39.8%)	0(-)	1(100.0%)	3(15.8%)	2(20.0%)	0(-)	16(42.1%)
90歳以上	510(22.9%)	501(23.2%)	0(-)	0(-)	2(10.5%)	1(10.0%)	0(-)	6(15.8%)
合計	2,223	2,155	0	1	19	10	0	38


5. 耐性菌新規感染症患者の検体*内訳



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
呼吸器系	1,228(55.2%)	1,201(55.7%)	0(-)	0(-)	18(94.7%)	2(20.0%)	0(-)	7(18.4%)
尿検体	165(7.4%)	141(6.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	4(40.0%)	0(-)	20(52.6%)
便検体	78(3.5%)	77(3.6%)	0(-)	1(100.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
血液検体	291(13.1%)	286(13.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	5(13.2%)
髄液検体	2(0.1%)	2(0.1%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	459(20.6%)	448(20.8%)	0(-)	0(-)	1(5.3%)	4(40.0%)	0(-)	6(15.8%)
合計	2,223	2,155	0	1	19	10	0	38


*検体区分については巻末の資料1を参照

6. 耐性菌新規感染症患者の感染症名別内訳



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
尿路	168(7.6%)	146(6.8%)	0(-)	0(-)	0(-)	4(40.0%)	0(-)	18(47.4%)
肺炎	1,094(49.2%)	1,074(49.8%)	0(-)	1(100.0%)	12(63.2%)	1(10.0%)	0(-)	6(15.8%)
肺炎以外	107(4.8%)	99(4.6%)	0(-)	0(-)	6(31.6%)	1(10.0%)	0(-)	1(2.6%)
消化器系	79(3.6%)	74(3.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	5(13.2%)
中枢神経系	3(0.1%)	3(0.1%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
皮膚・軟部	265(11.9%)	262(12.2%)	0(-)	0(-)	1(5.3%)	1(10.0%)	0(-)	1(2.6%)
手術創	95(4.3%)	90(4.2%)	0(-)	0(-)	0(-)	3(30.0%)	0(-)	2(5.3%)
菌血症	270(12.1%)	266(12.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	4(10.5%)
その他	142(6.4%)	141(6.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(2.6%)
合計	2,223	2,155	0	1	19	10	0	38

7. 耐性菌新規感染症患者の診療科*別内訳



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
内科系	1,370(61.6%)	1,341(62.2%)	0(-)	0(-)	6(31.6%)	5(50.0%)	0(-)	18(47.4%)
外科系	702(31.6%)	681(31.6%)	0(-)	1(100.0%)	2(10.5%)	5(50.0%)	0(-)	13(34.2%)
小児科系	20(0.9%)	10(0.5%)	0(-)	0(-)	8(42.1%)	0(-)	0(-)	2(5.3%)
その他	131(5.9%)	123(5.7%)	0(-)	0(-)	3(15.8%)	0(-)	0(-)	5(13.2%)
合計	2,223	2,155	0	1	19	10	0	38

*診療科の内訳については巻末の資料2を参照

・ 資料 1

呼吸器系検体	喀出痰
	気管内採痰
	気管支洗浄液
	咽頭粘液
	鼻腔内
	口腔内
	生検材料(肺)
	胸水
	その他(呼吸器)
尿検体	自然排尿
	採尿カテーテル
	留置カテーテル
	カテーテル尿
便検体	糞便
血液検体	静脈血
	動脈血
髄液検体	髄液
その他	尿道分泌液
	膣分泌液
	胃・十二指腸液
	胆汁
	生検材料(消化管)
	腹水
	関節液
	その他

・ 資料 2

内科系	内科	外科系	外科
	循環器内科		消化器外科
	神経内科		肛門科
	呼吸器内科		肝胆脾外科
	消化器内科		心臓血管外科
	胃腸科		内分泌外科
	内分泌・代謝内科		呼吸器外科
	腎臓内科		小児外科
	糖尿病内科		小児循環器外科
	アレルギー・膠原病内科		小児消化器外科
	膠原病内科		産婦人科
	アレルギー内科		産科
	リウマチ内科		婦人科
	血液内科		整形外科
	感染症内科		美容外科
	老人内科		眼科
	心療内科		耳鼻咽喉科
その他	性病科		気管食道科
	神経科		泌尿器科
	精神科		皮膚・泌尿器科
	放射線科		皮膚科
	総合診療部		脳神経外科
	救急部		形成外科
	救急・集中治療部		歯科口腔外科
	集中治療部(ICU)		歯科
	冠動脈疾患集中治療部(CCU)		小児歯科
	内視鏡科		矯正歯科
	透析科		口腔外科
	理学療法・リハビリテーション科		手術部
	理学療法科		移植・人工臓器科
	リハビリテーション科	小児科系	小児科
	麻酔科		新生児科
	その他		新生児集中治療部(NICU)
			周産期センター

厚生労働省 院内感染対策サーベイランス 薬剤耐性菌 判定基準 (Ver.3.2)

菌名	概要	菌名コード	微量液体希釈法の基準	ディスク拡散法の基準
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌 (MRSA)	MPIPC または CFX が “R” の <i>Staphylococcus aureus</i> または選択培地で MRSA と確認された菌	1301、1303	MPIPC $\geq$ 4 μ g/mL* または CFX $\geq$ 8 μ g/mL*	MPIPC $\leq$ 10mm† CFX $\leq$ 21mm*
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌 (VRSA)	VCM が微量液体希釈法で “R” の <i>Staphylococcus aureus</i>	1301、1303-1306	VCM $\geq$ 16 μ g/mL*	
バンコマイシン耐性腸球菌 (VRE)	下記のいずれかの条件を満たす <i>Enterococcus</i> spp. ・ VCM が微量液体希釈法で耐性† ・ VCM がディスク拡散法で “R” ・ 選択培地で VRE と確認された菌 注) 種の同定が行われていない <i>Enterococcus</i> sp. は除く	1201、1202、1205、1206、1209、1210、1213-1217	VCM $\geq$ 16 μ g/mL†	VCM $\leq$ 14mm*
ペニシリン耐性肺炎球菌 (PRSP)	PCG が微量液体希釈法で耐性†、または MPIPC がディスク拡散法で “S 以外” の <i>Streptococcus pneumoniae</i>	1131	PCG $\geq$ 0.125 μ g/mL†	MPIPC $\leq$ 19mm†
多剤耐性緑膿菌 (MDRP)	下記のすべての条件を満たす <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ・ カルバペネム系 (IPM、MEPM のいずれか) が微量液体希釈法で耐性†、またはディスク拡散法で “R” ・ アミノグリコシド系は AMK が微量液体希釈法で耐性†、またはディスク拡散法で “R” ・ フルオロキノロン系が “R” (NFLX、OFLX、LVFX、LFLX、CPFX のいずれか)	4001	IPM・MEPM $\geq$ 16 μ g/mL† AMK $\geq$ 32 μ g/mL† NFLX $\geq$ 16 μ g/mL* OFLX・LVFX・LFLX $\geq$ 8mL* CPFX $\geq$ 4 μ g/mL*†	IPM・MEPM $\leq$ 13mm† AMK $\leq$ 14mm* NFLX・OFLX $\leq$ 12mm* LVFX $\leq$ 13mm* LFLX $\leq$ 18mm* CPFX $\leq$ 15mm*†
多剤耐性アシネトバクター属 (MDRA)	下記のすべての条件を満たす <i>Acinetobacter</i> spp. ・ カルバペネム系が “R” (IPM、MEPM のいずれか) ・ アミノグリコシド系は AMK が微量液体希釈法で耐性† またはディスク拡散法で “R” ・ フルオロキノロン系が “R” (LVFX、CPFX のいずれか)	4400-4403	IPM・MEPM $\geq$ 16 μ g/mL† AMK $\geq$ 32 μ g/mL† LVFX $\geq$ 8 μ g/mL* CPFX $\geq$ 4 μ g/mL*†	IPM・MEPM $\leq$ 13mm† AMK $\leq$ 14mm† LVFX $\leq$ 13mm* CPFX $\leq$ 15mm*†
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌 (CRE)	下記のいずれかの条件を満たす腸内細菌科細菌 ・ MEPM が耐性† ・ IPM が耐性†、かつ CMZ が “R”	2000-2691、3150-3151	MEPM $\geq$ 2 μ g/mL† IPM $\geq$ 2 μ g/mL† かつ CMZ $\geq$ 64 μ g/mL*†	MEPM $\leq$ 22mm† IPM $\leq$ 22mm† かつ CMZ $\leq$ 12mm*†

* S,I,R の判定は CLSI2012(M100-S22)に準拠

† 感染症発生动向調査の基準に準拠