


1. データ提出医療機関*数(7医療機関)



*ここではデータ提出医療機関は集計対象医療機関を表す

† JANIS参加 = 2020年10月～12月 集計対象医療機関数

‡ JANIS非参加 = (2019年 都道府県別医療機関数¶) - (2020年10月～12月 集計対象医療機関数)

病床数	2019年 都道府県別医療機関数¶	2020年10月～12月 集計対象医療機関数 (都道府県別医療機関数に占める割合)
900床以上	0	0 (-)
500～899床	3	2 (66.7%)
200～499床	11	2 (18.2%)
200床未満	53	3 (5.7%)
病床数不明	-	0 (-)
合計	67	7 (10.4%)

¶2019年医療施設（動態）調査を参照した。

(福井県)

公開情報 2020年10月～12月 四半期報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門




2. 新規感染症患者数と罹患率

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症

罹患率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(%)の分布
MRSA	10,700	4	24	2.24%	0.00 2.37 15.31


集計対象医療機関の罹患率 (N=7)



感染率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	感染症患者数	全体の感染率	集計対象医療機関の感染率(%)の分布
MRSA	10,700	28	2.62%	0.00 2.60 20.30

集計対象医療機関の感染率 (N=7)



(福井県)

公開情報 2020年10月～12月 四半期報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門




2. 新規感染症患者数と罹患率

ペニシリン耐性肺炎球菌(PRSP)感染症

罹患率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(%)の分布
PRSP	10,700	0	2	0.19%	0.00 0.29


集計対象医療機関の罹患率 (N=7)



感染率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	感染症患者数	全体の感染率	集計対象医療機関の感染率(%)の分布
PRSP	10,700	2	0.19%	0.00 0.29

集計対象医療機関の感染率 (N=7)



(福井県)

公開情報 2020年10月～12月 四半期報(全集計対象医療機関)
院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門



2. 新規感染症患者数と罹患率

バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌(VRSA)感染症の報告はありませんでした

バンコマイシン耐性腸球菌(VRE)感染症の報告はありませんでした

多剤耐性緑膿菌(MDRP)感染症の報告はありませんでした

多剤耐性アシネトバクター属(MDRA)感染症の報告はありませんでした

カルバペネム耐性腸内細菌科細菌(CRE)感染症の報告はありませんでした

総入院患者数、感染症患者数、罹患率、感染率の説明

総入院患者数 = (対象期間の各月の新規入院患者数の合計) + (対象期間の一番初めの月の継続入院患者数)

感染症患者数 = (新規感染症患者数) + (対象期間の一番初めの月の継続感染症患者数)

新規感染症患者数 = 対象期間の各月の新規感染症患者数の合計

継続感染症患者数 = 対象期間の一番初めの月より前に新規感染症患者とされ、対象期間の一番初めの月に改めて検査した際にも、継続的に同じ耐性菌に感染していた患者の数

罹患率 = (新規感染症患者数) ÷ ((総入院患者数) - (対象期間の一番初めの月の継続感染症患者数)) × 1000

感染率 = (感染症患者数) ÷ (総入院患者数) × 1000

全体の罹患率 = (集計対象医療機関の新規感染症患者数合計) ÷ ((集計対象医療機関の総入院患者数合計) - (集計対象医療機関の対象期間の一番初めの月の継続感染症患者数合計)) × 1000

全体の感染率 = (集計対象医療機関の感染症患者数合計) ÷ (集計対象医療機関の総入院患者数合計) × 1000

(福井県)


公開情報 2020年10月～12月 四半期報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門



3. 耐性菌新規感染症・感染症患者の性別内訳

新規感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
男	17 (65.4%)	15 (62.5%)	0 (-)	0 (-)	2 (100.0%)	0 (-)	0 (-)	0 (-)
女	9 (34.6%)	9 (37.5%)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)
合計	26	24	0	0	2	0	0	0

(福井県)


公開情報 2020年10月～12月 四半期報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門



3. 耐性菌新規感染症・感染症患者の性別内訳

感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
男	20 (66.7%)	18 (64.3%)	0 (-)	0 (-)	2 (100.0%)	0 (-)	0 (-)	0 (-)
女	10 (33.3%)	10 (35.7%)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)
合計	30	28	0	0	2	0	0	0

(福井県)


公開情報 2020年10月～12月 四半期報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門



4. 耐性菌新規感染症・感染症患者の年齢別内訳

新規感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
1歳未満	1(3.8%)	1(4.2%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
1歳以上5歳未満	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
5歳以上10歳未満	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
10歳代	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
20歳代	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
30歳代	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
40歳代	2(7.7%)	2(8.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
50歳代	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
60歳代	2(7.7%)	1(4.2%)	0(-)	0(-)	1(50.0%)	0(-)	0(-)	0(-)
70歳代	11(42.3%)	11(45.8%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
80歳代	9(34.6%)	8(33.3%)	0(-)	0(-)	1(50.0%)	0(-)	0(-)	0(-)
90歳以上	1(3.8%)	1(4.2%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	26	24	0	0	2	0	0	0

(福井県)


公開情報 2020年10月～12月 四半期報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門



4. 耐性菌新規感染症・感染症患者の年齢別内訳


感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
1歳未満	1(3.3%)	1(3.6%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
1歳以上5歳未満	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
5歳以上10歳未満	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
10歳代	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
20歳代	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
30歳代	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
40歳代	2(6.7%)	2(7.1%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
50歳代	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
60歳代	2(6.7%)	1(3.6%)	0(-)	0(-)	1(50.0%)	0(-)	0(-)	0(-)
70歳代	14(46.7%)	14(50.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
80歳代	10(33.3%)	9(32.1%)	0(-)	0(-)	1(50.0%)	0(-)	0(-)	0(-)
90歳以上	1(3.3%)	1(3.6%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	30	28	0	0	2	0	0	0

5. 耐性菌新規感染症・感染症患者の検体*内訳

新規感染症患者




分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
呼吸器系	12(46.2%)	11(45.8%)	0(-)	0(-)	1(50.0%)	0(-)	0(-)	0(-)
尿検体	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
便検体	1(3.8%)	1(4.2%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
血液検体	6(23.1%)	5(20.8%)	0(-)	0(-)	1(50.0%)	0(-)	0(-)	0(-)
髄液検体	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	7(26.9%)	7(29.2%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	26	24	0	0	2	0	0	0

*検体区分については巻末の資料 1 を参照

5. 耐性菌新規感染症・感染症患者の検体*内訳

感染症患者




分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
呼吸器系	13(43.3%)	12(42.9%)	0(-)	0(-)	1(50.0%)	0(-)	0(-)	0(-)
尿検体	1(3.3%)	1(3.6%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
便検体	1(3.3%)	1(3.6%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
血液検体	8(26.7%)	7(25.0%)	0(-)	0(-)	1(50.0%)	0(-)	0(-)	0(-)
髄液検体	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	7(23.3%)	7(25.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	30	28	0	0	2	0	0	0

*検体区分については巻末の資料1を参照

6. 耐性菌新規感染症・感染症患者の感染症名別内訳


新規感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
尿路	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
肺炎	11(42.3%)	10(41.7%)	0(-)	0(-)	1(50.0%)	0(-)	0(-)	0(-)
肺炎以外	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
消化器系	2(7.7%)	2(8.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
中枢神経系	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
皮膚・軟部	2(7.7%)	2(8.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
手術創	2(7.7%)	2(8.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
菌血症	4(15.4%)	3(12.5%)	0(-)	0(-)	1(50.0%)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	5(19.2%)	5(20.8%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	26	24	0	0	2	0	0	0

6. 耐性菌新規感染症・感染症患者の感染症名別内訳


感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
尿路	1(3.3%)	1(3.6%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
肺炎	12(40.0%)	11(39.3%)	0(-)	0(-)	1(50.0%)	0(-)	0(-)	0(-)
肺炎以外	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
消化器系	2(6.7%)	2(7.1%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
中枢神経系	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
皮膚・軟部	2(6.7%)	2(7.1%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
手術創	2(6.7%)	2(7.1%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
菌血症	6(20.0%)	5(17.9%)	0(-)	0(-)	1(50.0%)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	5(16.7%)	5(17.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	30	28	0	0	2	0	0	0

7. 耐性菌新規感染症・感染症患者の診療科*別内訳

新規感染症患者




分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
内科系	15(57.7%)	13(54.2%)	0(-)	0(-)	2(100.0%)	0(-)	0(-)	0(-)
外科系	9(34.6%)	9(37.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
小児科系	1(3.8%)	1(4.2%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	1(3.8%)	1(4.2%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	26	24	0	0	2	0	0	0

*診療科の内訳については巻末の資料2を参照

7. 耐性菌新規感染症・感染症患者の診療科*別内訳

感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
内科系	19(63.3%)	17(60.7%)	0(-)	0(-)	2(100.0%)	0(-)	0(-)	0(-)
外科系	9(30.0%)	9(32.1%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
小児科系	1(3.3%)	1(3.6%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	1(3.3%)	1(3.6%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	30	28	0	0	2	0	0	0

*診療科の内訳については巻末の資料2を参照

・資料 1

呼吸器系検体	喀出痰
	気管内採痰
	気管支洗浄液
	咽頭粘液
	鼻腔内
	口腔内
	生検材料(肺)
	胸水
	その他(呼吸器)
尿検体	自然排尿
	採尿カテーテル
	留置カテーテル
	カテーテル尿
便検体	糞便
血液検体	静脈血
	動脈血
髄液検体	髄液
その他	尿道分泌液
	膣分泌液
	胃・十二指腸液
	胆汁
	生検材料(消化管)
	腹水
	関節液
	その他

・資料 2

内科系	内科	外科系	外科
	循環器内科		消化器外科
	神経内科		肛門科
	呼吸器内科		肝胆脾外科
	消化器内科		心臓血管外科
	胃腸科		内分泌外科
	内分泌・代謝内科		呼吸器外科
	腎臓内科		小児外科
	糖尿病内科		小児循環器外科
	アレルギー・膠原病内科		小児消化器外科
	膠原病内科		産婦人科
	アレルギー内科		産科
	リウマチ内科		婦人科
	血液内科		整形外科
	感染症内科		美容外科
	老人内科		眼科
	心療内科		耳鼻咽喉科
その他	性病科		気管食道科
	神経科		泌尿器科
	精神科		皮膚・泌尿器科
	放射線科		皮膚科
	総合診療部		脳神経外科
	救急部		形成外科
	救急・集中治療部		歯科口腔外科
	集中治療部(ICU)		歯科
	冠動脈疾患集中治療部(CCU)		小児歯科
	内視鏡科		矯正歯科
	透析科		口腔外科
	理学療法・リハビリテーション科		手術部
	理学療法科		移植・人工臓器科
	リハビリテーション科	小児科系	小児科
	麻酔科		新生児科
	その他		新生児集中治療部(NICU)
			周産期センター

精度管理について

四半期報ではVRSAに対してのみ、報告医療機関にその真偽を確認し誤報告を除外している。


厚生労働省 院内感染対策サーベイランス 薬剤耐性菌 判定基準 (Ver.3.2)

菌名	概要	菌名コード	微量液体希釈法の基準	ディスク拡散法の基準
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌 (MRSA)	MPIPC または CFX が “R” の <i>Staphylococcus aureus</i> または選択培地で MRSA と確認された菌	1301、1303	MPIPC $\geq$ 4 μ g/mL* または CFX $\geq$ 8 μ g/mL*	MPIPC $\leq$ 10mm† CFX $\leq$ 21mm*
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌 (VRSA)	VCM が微量液体希釈法で “R” の <i>Staphylococcus aureus</i>	1301、1303-1306	VCM $\geq$ 16 μ g/mL*	
バンコマイシン耐性腸球菌 (VRE)	下記のいずれかの条件を満たす <i>Enterococcus</i> spp. ・ VCM が微量液体希釈法で耐性† ・ VCM がディスク拡散法で “R” ・ 選択培地で VRE と確認された菌 注) 種の同定が行われていない <i>Enterococcus</i> sp.は除く	1201、1202、1205、1206、1209、1210、1213-1217	VCM $\geq$ 16 μ g/mL†	VCM $\leq$ 14mm*
ペニシリン耐性肺炎球菌 (PRSP)	PCG が微量液体希釈法で耐性†、または MPIPC がディスク拡散法で “S 以外” の <i>Streptococcus pneumoniae</i>	1131	PCG $\geq$ 0.125 μ g/mL†	MPIPC $\leq$ 19mm†
多剤耐性緑膿菌 (MDRP)	下記のすべての条件を満たす <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ・ カルバペネム系 (IPM、MEPM のいずれか) が微量液体希釈法で耐性†、またはディスク拡散法で “R” ・ アミノグリコシド系は AMK が微量液体希釈法で耐性†、またはディスク拡散法で “R” ・ フルオロキノロン系が “R” (NFLX、OFLX、LVFX、LFLX、CPFX のいずれか)	4001	IPM・MEPM $\geq$ 16 μ g/mL† AMK $\geq$ 32 μ g/mL† NFLX $\geq$ 16 μ g/mL* OFLX・LVFX・LFLX $\geq$ 8mL* CPFX $\geq$ 4 μ g/mL*†	IPM・MEPM $\leq$ 13mm† AMK $\leq$ 14mm* NFLX・OFLX $\leq$ 12mm* LVFX $\leq$ 13mm* LFLX $\leq$ 18mm* CPFX $\leq$ 15mm*†
多剤耐性アシネトバクター属 (MDRA)	下記のすべての条件を満たす <i>Acinetobacter</i> spp. ・ カルバペネム系が “R” (IPM、MEPM のいずれか) ・ アミノグリコシド系は AMK が微量液体希釈法で耐性† またはディスク拡散法で “R” ・ フルオロキノロン系が “R” (LVFX、CPFX のいずれか)	4400-4403	IPM・MEPM $\geq$ 16 μ g/mL† AMK $\geq$ 32 μ g/mL† LVFX $\geq$ 8 μ g/mL* CPFX $\geq$ 4 μ g/mL*†	IPM・MEPM $\leq$ 13mm† AMK $\leq$ 14mm† LVFX $\leq$ 13mm* CPFX $\leq$ 15mm*†
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌 (CRE)	下記のいずれかの条件を満たす腸内細菌科細菌 ・ MEPM が耐性† ・ IPM が耐性†、かつ CMZ が “R”	2000-2691、3150-3151	MEPM $\geq$ 2 μ g/mL† IPM $\geq$ 2 μ g/mL†かつ CMZ $\geq$ 64 μ g/mL*†	MEPM $\leq$ 22mm† IPM $\leq$ 22mm† かつ CMZ $\leq$ 12mm*†

* S,I,R の判定は CLSI2012(M100-S22)に準拠

† 感染症発生动向調査の基準に準拠

1. データ提出医療機関*数(9医療機関)



*ここではデータ提出医療機関は集計対象医療機関を表す

† JANIS参加 = 2020年10月～12月 集計対象医療機関数

‡ JANIS非参加 = (2019年 都道府県別医療機関数¶) - (2020年10月～12月 集計対象医療機関数)

病床数	2019年 都道府県別医療機関数¶	2020年10月～12月 集計対象医療機関数 (都道府県別医療機関数に占める割合)
900床以上	0	0 (-)
500～899床	6	3 (50%)
200～499床	17	5 (29.4%)
200床未満	34	1 (2.9%)
病床数不明	-	0 (-)
合計	57	9 (15.8%)

¶2019年医療施設（動態）調査を参照した。

(滋賀県)

公開情報 2020年10月～12月 四半期報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門




2. 新規感染症患者数と罹患率

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症

罹患率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(%)の分布
MRSA	19,864	0	35	1.76%	0.00 1.17 6.00 ----- -----


集計対象医療機関の罹患率 (N=9)



感染率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	感染症患者数	全体の感染率	集計対象医療機関の感染率(%)の分布
MRSA	19,864	35	1.76%	0.00 1.17 6.00 ----- -----

集計対象医療機関の感染率 (N=9)



(滋賀県)

公開情報 2020年10月～12月 四半期報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門




2. 新規感染症患者数と罹患率

カルバペネム耐性腸内細菌科細菌(CRE)感染症

罹患率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(%)の分布
CRE	19,864	0	1	0.05%	0.00 0.39 -----


集計対象医療機関の罹患率 (N=9)



感染率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	感染症患者数	全体の感染率	集計対象医療機関の感染率(%)の分布
CRE	19,864	1	0.05%	0.00 0.39 -----

集計対象医療機関の感染率 (N=9)



(滋賀県)

公開情報 2020年10月～12月 四半期報(全集計対象医療機関)
院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門



2. 新規感染症患者数と罹患率

バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌(VRSA)感染症の報告はありませんでした

バンコマイシン耐性腸球菌(VRE)感染症の報告はありませんでした

ペニシリン耐性肺炎球菌(PRSP)感染症の報告はありませんでした

多剤耐性緑膿菌(MDRP)感染症の報告はありませんでした

多剤耐性アシネトバクター属(MDRA)感染症の報告はありませんでした

総入院患者数、感染症患者数、罹患率、感染率の説明

総入院患者数 = (対象期間の各月の新規入院患者数の合計) + (対象期間の一番初めの月の継続入院患者数)

感染症患者数 = (新規感染症患者数) + (対象期間の一番初めの月の継続感染症患者数)

新規感染症患者数 = 対象期間の各月の新規感染症患者数の合計

継続感染症患者数 = 対象期間の一番初めの月より前に新規感染症患者とされ、対象期間の一番初めの月に改めて検査した際にも、継続的に同じ耐性菌に感染していた患者の数

罹患率 = (新規感染症患者数) ÷ ((総入院患者数) - (対象期間の一番初めの月の継続感染症患者数)) × 1000

感染率 = (感染症患者数) ÷ (総入院患者数) × 1000

全体の罹患率 = (集計対象医療機関の新規感染症患者数合計) ÷ ((集計対象医療機関の総入院患者数合計) - (集計対象医療機関の対象期間の一番初めの月の継続感染症患者数合計)) × 1000

全体の感染率 = (集計対象医療機関の感染症患者数合計) ÷ (集計対象医療機関の総入院患者数合計) × 1000

(滋賀県)


公開情報 2020年10月～12月 四半期報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門



3. 耐性菌新規感染症・感染症患者の性別内訳

新規感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
男	24 (66.7%)	24 (68.6%)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)
女	12 (33.3%)	11 (31.4%)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	1 (100.0%)
合計	36	35	0	0	0	0	0	1

(滋賀県)


公開情報 2020年10月～12月 四半期報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門



3. 耐性菌新規感染症・感染症患者の性別内訳


感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
男	24 (66.7%)	24 (68.6%)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)
女	12 (33.3%)	11 (31.4%)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	1 (100.0%)
合計	36	35	0	0	0	0	0	1

4. 耐性菌新規感染症・感染症患者の年齢別内訳


新規感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
1歳未満	1(2.8%)	1(2.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
1歳以上5歳未満	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
5歳以上10歳未満	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
10歳代	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
20歳代	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
30歳代	1(2.8%)	1(2.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
40歳代	3(8.3%)	3(8.6%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
50歳代	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
60歳代	1(2.8%)	1(2.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
70歳代	17(47.2%)	16(45.7%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(100.0%)
80歳代	8(22.2%)	8(22.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
90歳以上	5(13.9%)	5(14.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	36	35	0	0	0	0	0	1

4. 耐性菌新規感染症・感染症患者の年齢別内訳


感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
1歳未満	1(2.8%)	1(2.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
1歳以上5歳未満	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
5歳以上10歳未満	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
10歳代	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
20歳代	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
30歳代	1(2.8%)	1(2.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
40歳代	3(8.3%)	3(8.6%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
50歳代	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
60歳代	1(2.8%)	1(2.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
70歳代	17(47.2%)	16(45.7%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(100.0%)
80歳代	8(22.2%)	8(22.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
90歳以上	5(13.9%)	5(14.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	36	35	0	0	0	0	0	1

5. 耐性菌新規感染症・感染症患者の検体*内訳

新規感染症患者




分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
呼吸器系	12(33.3%)	12(34.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
尿検体	3(8.3%)	2(5.7%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(100.0%)
便検体	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
血液検体	11(30.6%)	11(31.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
髄液検体	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	10(27.8%)	10(28.6%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	36	35	0	0	0	0	0	1

*検体区分については巻末の資料 1 を参照

5. 耐性菌新規感染症・感染症患者の検体*内訳

感染症患者




分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
呼吸器系	12(33.3%)	12(34.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
尿検体	3(8.3%)	2(5.7%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(100.0%)
便検体	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
血液検体	11(30.6%)	11(31.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
髄液検体	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	10(27.8%)	10(28.6%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	36	35	0	0	0	0	0	1

*検体区分については巻末の資料 1 を参照

6. 耐性菌新規感染症・感染症患者の感染症名別内訳


新規感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
尿路	4(11.1%)	3(8.6%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(100.0%)
肺炎	10(27.8%)	10(28.6%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
肺炎以外	2(5.6%)	2(5.7%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
消化器系	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
中枢神経系	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
皮膚・軟部	4(11.1%)	4(11.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
手術創	2(5.6%)	2(5.7%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
菌血症	10(27.8%)	10(28.6%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	4(11.1%)	4(11.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	36	35	0	0	0	0	0	1

6. 耐性菌新規感染症・感染症患者の感染症名別内訳


感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
尿路	4(11.1%)	3(8.6%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(100.0%)
肺炎	10(27.8%)	10(28.6%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
肺炎以外	2(5.6%)	2(5.7%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
消化器系	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
中枢神経系	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
皮膚・軟部	4(11.1%)	4(11.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
手術創	2(5.6%)	2(5.7%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
菌血症	10(27.8%)	10(28.6%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	4(11.1%)	4(11.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	36	35	0	0	0	0	0	1

7. 耐性菌新規感染症・感染症患者の診療科*別内訳

新規感染症患者




分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
内科系	23(63.9%)	23(65.7%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
外科系	11(30.6%)	10(28.6%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(100.0%)
小児科系	1(2.8%)	1(2.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	1(2.8%)	1(2.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	36	35	0	0	0	0	0	1

*診療科の内訳については巻末の資料2を参照

7. 耐性菌新規感染症・感染症患者の診療科*別内訳

感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
内科系	23(63.9%)	23(65.7%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
外科系	11(30.6%)	10(28.6%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(100.0%)
小児科系	1(2.8%)	1(2.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	1(2.8%)	1(2.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	36	35	0	0	0	0	0	1

*診療科の内訳については巻末の資料2を参照

・資料 1

呼吸器系検体	喀出痰
	気管内採痰
	気管支洗浄液
	咽頭粘液
	鼻腔内
	口腔内
	生検材料(肺)
	胸水
	その他(呼吸器)
尿検体	自然排尿
	採尿カテーテル
	留置カテーテル
	カテーテル尿
便検体	糞便
血液検体	静脈血
	動脈血
髄液検体	髄液
その他	尿道分泌液
	膣分泌液
	胃・十二指腸液
	胆汁
	生検材料(消化管)
	腹水
	関節液
	その他

・資料 2

内科系	内科	外科系	外科
	循環器内科		消化器外科
	神経内科		肛門科
	呼吸器内科		肝胆脾外科
	消化器内科		心臓血管外科
	胃腸科		内分泌外科
	内分泌・代謝内科		呼吸器外科
	腎臓内科		小児外科
	糖尿病内科		小児循環器外科
	アレルギー・膠原病内科		小児消化器外科
	膠原病内科		産婦人科
	アレルギー内科		産科
	リウマチ内科		婦人科
	血液内科		整形外科
	感染症内科		美容外科
	老人内科		眼科
	心療内科		耳鼻咽喉科
その他	性病科		気管食道科
	神経科		泌尿器科
	精神科		皮膚・泌尿器科
	放射線科		皮膚科
	総合診療部		脳神経外科
	救急部		形成外科
	救急・集中治療部		歯科口腔外科
	集中治療部(ICU)		歯科
	冠動脈疾患集中治療部(CCU)		小児歯科
	内視鏡科		矯正歯科
	透析科		口腔外科
	理学療法・リハビリテーション科		手術部
	理学療法科		移植・人工臓器科
	リハビリテーション科	小児科系	小児科
	麻酔科		新生児科
	その他		新生児集中治療部(NICU)
			周産期センター

精度管理について

四半期報ではVRSAに対してのみ、報告医療機関にその真偽を確認し誤報告を除外している。


厚生労働省 院内感染対策サーベイランス 薬剤耐性菌 判定基準 (Ver.3.2)

菌名	概要	菌名コード	微量液体希釈法の基準	ディスク拡散法の基準
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌 (MRSA)	MPIPC または CFX が “R” の <i>Staphylococcus aureus</i> または選択培地で MRSA と確認された菌	1301、1303	MPIPC $\geq$ 4 μ g/mL* または CFX $\geq$ 8 μ g/mL*	MPIPC $\leq$ 10mm† CFX $\leq$ 21mm*
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌 (VRSA)	VCM が微量液体希釈法で “R” の <i>Staphylococcus aureus</i>	1301、1303-1306	VCM $\geq$ 16 μ g/mL*	
バンコマイシン耐性腸球菌 (VRE)	下記のいずれかの条件を満たす <i>Enterococcus</i> spp. ・ VCM が微量液体希釈法で耐性† ・ VCM がディスク拡散法で “R” ・ 選択培地で VRE と確認された菌 注) 種の同定が行われていない <i>Enterococcus</i> sp.は除く	1201、1202、1205、1206、1209、1210、1213-1217	VCM $\geq$ 16 μ g/mL†	VCM $\leq$ 14mm*
ペニシリン耐性肺炎球菌 (PRSP)	PCG が微量液体希釈法で耐性†、または MPIPC がディスク拡散法で “S 以外” の <i>Streptococcus pneumoniae</i>	1131	PCG $\geq$ 0.125 μ g/mL†	MPIPC $\leq$ 19mm†
多剤耐性緑膿菌 (MDRP)	下記のすべての条件を満たす <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ・ カルバペネム系 (IPM、MEPM のいずれか) が微量液体希釈法で耐性†、またはディスク拡散法で “R” ・ アミノグリコシド系は AMK が微量液体希釈法で耐性†、またはディスク拡散法で “R” ・ フルオロキノロン系が “R” (NFLX、OFLX、LVFX、LFLX、CPFX のいずれか)	4001	IPM・MEPM $\geq$ 16 μ g/mL† AMK $\geq$ 32 μ g/mL† NFLX $\geq$ 16 μ g/mL* OFLX・LVFX・LFLX $\geq$ 8mL* CPFX $\geq$ 4 μ g/mL*†	IPM・MEPM $\leq$ 13mm† AMK $\leq$ 14mm* NFLX・OFLX $\leq$ 12mm* LVFX $\leq$ 13mm* LFLX $\leq$ 18mm* CPFX $\leq$ 15mm*†
多剤耐性アシネトバクター属 (MDRA)	下記のすべての条件を満たす <i>Acinetobacter</i> spp. ・ カルバペネム系が “R” (IPM、MEPM のいずれか) ・ アミノグリコシド系は AMK が微量液体希釈法で耐性† またはディスク拡散法で “R” ・ フルオロキノロン系が “R” (LVFX、CPFX のいずれか)	4400-4403	IPM・MEPM $\geq$ 16 μ g/mL† AMK $\geq$ 32 μ g/mL† LVFX $\geq$ 8 μ g/mL* CPFX $\geq$ 4 μ g/mL*†	IPM・MEPM $\leq$ 13mm† AMK $\leq$ 14mm† LVFX $\leq$ 13mm* CPFX $\leq$ 15mm*†
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌 (CRE)	下記のいずれかの条件を満たす腸内細菌科細菌 ・ MEPM が耐性† ・ IPM が耐性†、かつ CMZ が “R”	2000-2691、3150-3151	MEPM $\geq$ 2 μ g/mL† IPM $\geq$ 2 μ g/mL†かつ CMZ $\geq$ 64 μ g/mL*†	MEPM $\leq$ 22mm† IPM $\leq$ 22mm† かつ CMZ $\leq$ 12mm*†

* S,I,R の判定は CLSI2012(M100-S22)に準拠

† 感染症発生动向調査の基準に準拠

1. データ提出医療機関*数(16医療機関)



*ここではデータ提出医療機関は集計対象医療機関を表す

† JANIS参加 = 2020年10月～12月 集計対象医療機関数

‡ JANIS非参加 = (2019年 都道府県別医療機関数¶) - (2020年10月～12月 集計対象医療機関数)

病床数	2019年 都道府県別医療機関数¶	2020年10月～12月 集計対象医療機関数 (都道府県別医療機関数に占める割合)
900床以上	3	0 (0%)
500～899床	10	3 (30%)
200～499床	39	10 (25.6%)
200床未満	113	3 (2.7%)
病床数不明	-	0 (-)
合計	165	16 (9.7%)

¶2019年医療施設（動態）調査を参照した。


2. 新規感染症患者数と罹患率

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症

罹患率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(%)の分布
MRSA	28,487	4	66	2.32%	0.00 2.25 10.14 ----- -----


集計対象医療機関の罹患率 (N=16)



感染率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	感染症患者数	全体の感染率	集計対象医療機関の感染率(%)の分布
MRSA	28,487	70	2.46%	0.00 2.37 10.14 ----- -----

集計対象医療機関の感染率 (N=16)



(京都府)

公開情報 2020年10月～12月 四半期報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門




2. 新規感染症患者数と罹患率

カルバペネム耐性腸内細菌科細菌(CRE)感染症

罹患率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(%)の分布
CRE	28,487	0	2	0.07%	0.00 0.60


集計対象医療機関の罹患率 (N=16)



感染率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	感染症患者数	全体の感染率	集計対象医療機関の感染率(%)の分布
CRE	28,487	2	0.07%	0.00 0.60

集計対象医療機関の感染率 (N=16)



(京都府)

公開情報 2020年10月～12月 四半期報(全集計対象医療機関)
院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門



2. 新規感染症患者数と罹患率

バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌(VRSA)感染症の報告はありませんでした

バンコマイシン耐性腸球菌(VRE)感染症の報告はありませんでした

ペニシリン耐性肺炎球菌(PRSP)感染症の報告はありませんでした

多剤耐性緑膿菌(MDRP)感染症の報告はありませんでした

多剤耐性アシネトバクター属(MDRA)感染症の報告はありませんでした

総入院患者数、感染症患者数、罹患率、感染率の説明

総入院患者数 = (対象期間の各月の新規入院患者数の合計) + (対象期間の一番初めの月の継続入院患者数)

感染症患者数 = (新規感染症患者数) + (対象期間の一番初めの月の継続感染症患者数)

新規感染症患者数 = 対象期間の各月の新規感染症患者数の合計

継続感染症患者数 = 対象期間の一番初めの月より前に新規感染症患者とされ、対象期間の一番初めの月に改めて検査した際にも、継続的に同じ耐性菌に感染していた患者の数

罹患率 = (新規感染症患者数) ÷ ((総入院患者数) - (対象期間の一番初めの月の継続感染症患者数)) × 1000


感染率 = (感染症患者数) ÷ (総入院患者数) × 1000

全体の罹患率 = (集計対象医療機関の新規感染症患者数合計) ÷ ((集計対象医療機関の総入院患者数合計) - (集計対象医療機関の対象期間の一番初めの月の継続感染症患者数合計)) × 1000

全体の感染率 = (集計対象医療機関の感染症患者数合計) ÷ (集計対象医療機関の総入院患者数合計) × 1000

3. 耐性菌新規感染症・感染症患者の性別内訳


新規感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
男	39 (57.4%)	38 (57.6%)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	1 (50.0%)
女	29 (42.6%)	28 (42.4%)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	1 (50.0%)
合計	68	66	0	0	0	0	0	2

3. 耐性菌新規感染症・感染症患者の性別内訳


感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
男	42 (58.3%)	41 (58.6%)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	1 (50.0%)
女	30 (41.7%)	29 (41.4%)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	1 (50.0%)
合計	72	70	0	0	0	0	0	2

4. 耐性菌新規感染症・感染症患者の年齢別内訳


新規感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
1歳未満	2(2.9%)	2(3.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
1歳以上5歳未満	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
5歳以上10歳未満	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
10歳代	1(1.5%)	1(1.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
20歳代	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
30歳代	1(1.5%)	1(1.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
40歳代	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
50歳代	4(5.9%)	4(6.1%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
60歳代	3(4.4%)	3(4.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
70歳代	16(23.5%)	16(24.2%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
80歳代	30(44.1%)	29(43.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(50.0%)
90歳以上	11(16.2%)	10(15.2%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(50.0%)
合計	68	66	0	0	0	0	0	2

4. 耐性菌新規感染症・感染症患者の年齢別内訳


感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
1歳未満	2(2.8%)	2(2.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
1歳以上5歳未満	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
5歳以上10歳未満	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
10歳代	1(1.4%)	1(1.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
20歳代	1(1.4%)	1(1.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
30歳代	1(1.4%)	1(1.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
40歳代	1(1.4%)	1(1.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
50歳代	4(5.6%)	4(5.7%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
60歳代	3(4.2%)	3(4.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
70歳代	17(23.6%)	17(24.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
80歳代	31(43.1%)	30(42.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(50.0%)
90歳以上	11(15.3%)	10(14.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(50.0%)
合計	72	70	0	0	0	0	0	2

5. 耐性菌新規感染症・感染症患者の検体*内訳

新規感染症患者




分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
呼吸器系	20(29.4%)	19(28.8%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(50.0%)
尿検体	3(4.4%)	2(3.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(50.0%)
便検体	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
血液検体	24(35.3%)	24(36.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
髄液検体	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	21(30.9%)	21(31.8%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	68	66	0	0	0	0	0	2

*検体区分については巻末の資料 1 を参照

5. 耐性菌新規感染症・感染症患者の検体*内訳

感染症患者




分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
呼吸器系	22(30.6%)	21(30.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(50.0%)
尿検体	3(4.2%)	2(2.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(50.0%)
便検体	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
血液検体	24(33.3%)	24(34.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
髄液検体	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	23(31.9%)	23(32.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	72	70	0	0	0	0	0	2

*検体区分については巻末の資料 1 を参照

6. 耐性菌新規感染症・感染症患者の感染症名別内訳


新規感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
尿路	4(5.9%)	3(4.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(50.0%)
肺炎	20(29.4%)	19(28.8%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(50.0%)
肺炎以外	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
消化器系	2(2.9%)	2(3.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
中枢神経系	1(1.5%)	1(1.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
皮膚・軟部	7(10.3%)	7(10.6%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
手術創	7(10.3%)	7(10.6%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
菌血症	24(35.3%)	24(36.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	3(4.4%)	3(4.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	68	66	0	0	0	0	0	2

6. 耐性菌新規感染症・感染症患者の感染症名別内訳


感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
尿路	4(5.6%)	3(4.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(50.0%)
肺炎	21(29.2%)	20(28.6%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(50.0%)
肺炎以外	1(1.4%)	1(1.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
消化器系	2(2.8%)	2(2.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
中枢神経系	1(1.4%)	1(1.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
皮膚・軟部	7(9.7%)	7(10.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
手術創	8(11.1%)	8(11.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
菌血症	24(33.3%)	24(34.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	4(5.6%)	4(5.7%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	72	70	0	0	0	0	0	2

7. 耐性菌新規感染症・感染症患者の診療科*別内訳

新規感染症患者




分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
内科系	44(64.7%)	44(66.7%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
外科系	21(30.9%)	20(30.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(50.0%)
小児科系	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	3(4.4%)	2(3.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(50.0%)
合計	68	66	0	0	0	0	0	2

*診療科の内訳については巻末の資料2を参照

7. 耐性菌新規感染症・感染症患者の診療科*別内訳

感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
内科系	47(65.3%)	47(67.1%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
外科系	22(30.6%)	21(30.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(50.0%)
小児科系	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	3(4.2%)	2(2.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(50.0%)
合計	72	70	0	0	0	0	0	2

*診療科の内訳については巻末の資料2を参照

・資料 1

呼吸器系検体	喀出痰
	気管内採痰
	気管支洗浄液
	咽頭粘液
	鼻腔内
	口腔内
	生検材料(肺)
	胸水
	その他(呼吸器)
尿検体	自然排尿
	採尿カテーテル
	留置カテーテル
	カテーテル尿
便検体	糞便
血液検体	静脈血
	動脈血
髄液検体	髄液
その他	尿道分泌液
	膣分泌液
	胃・十二指腸液
	胆汁
	生検材料(消化管)
	腹水
	関節液
	その他

・資料 2

内科系	内科
	循環器内科
	神経内科
	呼吸器内科
	消化器内科
	胃腸科
	内分泌・代謝内科
	腎臓内科
	糖尿病内科
	アレルギー・膠原病内科
	膠原病内科
	アレルギー内科
	リウマチ内科
	血液内科
	感染症内科
	老人内科
	心療内科
外科系	外科
	消化器外科
	肛門科
	肝胆脾外科
	心血管外科
	内分泌外科
	呼吸器外科
	小児外科
	小児循環器外科
	小児消化器外科
	産婦人科
	産科
	婦人科
	整形外科
	美容外科
	眼科
	耳鼻咽喉科
	気管食道科
	泌尿器科
	皮膚・泌尿器科
小児科系	皮膚科
	脳神経外科
	形成外科
	歯科口腔外科
	歯科
	小児歯科
	矯正歯科
	口腔外科
	手術部
	移植・人工臓器科
	小児科
	新生児科
	新生児集中治療部(NICU)
	周産期センター
その他	性病科
	神経科
	精神科
	放射線科
	総合診療部
	救急部
	救急・集中治療部
	集中治療部(ICU)
	冠動脈疾患集中治療部(CCU)
	内視鏡科
	透析科
	理学療法・リハビリテーション科
	理学療法科
	リハビリテーション科
	麻酔科
	その他

精度管理について

四半期報ではVRSAに対してのみ、報告医療機関にその真偽を確認し誤報告を除外している。


厚生労働省 院内感染対策サーベイランス 薬剤耐性菌 判定基準 (Ver.3.2)

菌名	概要	菌名コード	微量液体希釈法の基準	ディスク拡散法の基準
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌 (MRSA)	MPIPC または CFX が “R” の <i>Staphylococcus aureus</i> または選択培地で MRSA と確認された菌	1301、1303	MPIPC $\geq$ 4 μ g/mL* または CFX $\geq$ 8 μ g/mL*	MPIPC $\leq$ 10mm† CFX $\leq$ 21mm*
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌 (VRSA)	VCM が微量液体希釈法で “R” の <i>Staphylococcus aureus</i>	1301、1303-1306	VCM $\geq$ 16 μ g/mL*	
バンコマイシン耐性腸球菌 (VRE)	下記のいずれかの条件を満たす <i>Enterococcus</i> spp. ・ VCM が微量液体希釈法で耐性† ・ VCM がディスク拡散法で “R” ・ 選択培地で VRE と確認された菌 注) 種の同定が行われていない <i>Enterococcus</i> sp.は除く	1201、1202、1205、1206、1209、1210、1213-1217	VCM $\geq$ 16 μ g/mL†	VCM $\leq$ 14mm*
ペニシリン耐性肺炎球菌 (PRSP)	PCG が微量液体希釈法で耐性†、または MPIPC がディスク拡散法で “S 以外” の <i>Streptococcus pneumoniae</i>	1131	PCG $\geq$ 0.125 μ g/mL†	MPIPC $\leq$ 19mm†
多剤耐性緑膿菌 (MDRP)	下記のすべての条件を満たす <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ・ カルバペネム系 (IPM、MEPM のいずれか) が微量液体希釈法で耐性†、またはディスク拡散法で “R” ・ アミノグリコシド系は AMK が微量液体希釈法で耐性†、またはディスク拡散法で “R” ・ フルオロキノロン系が “R” (NFLX、OFLX、LVFX、LFLX、CPFX のいずれか)	4001	IPM・MEPM $\geq$ 16 μ g/mL† AMK $\geq$ 32 μ g/mL† NFLX $\geq$ 16 μ g/mL* OFLX・LVFX・LFLX $\geq$ 8mL* CPFX $\geq$ 4 μ g/mL*†	IPM・MEPM $\leq$ 13mm† AMK $\leq$ 14mm* NFLX・OFLX $\leq$ 12mm* LVFX $\leq$ 13mm* LFLX $\leq$ 18mm* CPFX $\leq$ 15mm*†
多剤耐性アシネトバクター属 (MDRA)	下記のすべての条件を満たす <i>Acinetobacter</i> spp. ・ カルバペネム系が “R” (IPM、MEPM のいずれか) ・ アミノグリコシド系は AMK が微量液体希釈法で耐性† またはディスク拡散法で “R” ・ フルオロキノロン系が “R” (LVFX、CPFX のいずれか)	4400-4403	IPM・MEPM $\geq$ 16 μ g/mL† AMK $\geq$ 32 μ g/mL† LVFX $\geq$ 8 μ g/mL* CPFX $\geq$ 4 μ g/mL*†	IPM・MEPM $\leq$ 13mm† AMK $\leq$ 14mm† LVFX $\leq$ 13mm* CPFX $\leq$ 15mm*†
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌 (CRE)	下記のいずれかの条件を満たす腸内細菌科細菌 ・ MEPM が耐性† ・ IPM が耐性†、かつ CMZ が “R”	2000-2691、3150-3151	MEPM $\geq$ 2 μ g/mL† IPM $\geq$ 2 μ g/mL† かつ CMZ $\geq$ 64 μ g/mL*†	MEPM $\leq$ 22mm† IPM $\leq$ 22mm† かつ CMZ $\leq$ 12mm*†

* S,I,R の判定は CLSI2012(M100-S22)に準拠

† 感染症発生动向調査の基準に準拠

1. データ提出医療機関*数(58医療機関)



*ここではデータ提出医療機関は集計対象医療機関を表す

† JANIS参加 = 2020年10月～12月 集計対象医療機関数

‡ JANIS非参加 = (2019年 都道府県別医療機関数¶) - (2020年10月～12月 集計対象医療機関数)

病床数	2019年 都道府県別医療機関数¶	2020年10月～12月 集計対象医療機関数 (都道府県別医療機関数に占める割合)
900床以上	9	2 (22.2%)
500～899床	27	9 (33.3%)
200～499床	143	32 (22.4%)
200床未満	334	15 (4.5%)
病床数不明	-	0 (-)
合計	513	58 (11.3%)

¶2019年医療施設（動態）調査を参照した。

(大阪府)

公開情報 2020年10月～12月 四半期報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門




2. 新規感染症患者数と罹患率

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症

罹患率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(%)の分布
MRSA	120,866	13	302	2.50%	0.00 2.43 19.84


集計対象医療機関の罹患率 (N=58)



感染率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	感染症患者数	全体の感染率	集計対象医療機関の感染率(%)の分布
MRSA	120,866	315	2.61%	0.00 2.50 23.02

集計対象医療機関の感染率 (N=58)



(大阪府)

公開情報 2020年10月～12月 四半期報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門




2. 新規感染症患者数と罹患率

ペニシリン耐性肺炎球菌(PRSP)感染症

罹患率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(‰)の分布
PRSP	120,866	0	4	0.03%	0.00 0.69


集計対象医療機関の罹患率 (N=58)



感染率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	感染症患者数	全体の感染率	集計対象医療機関の感染率(‰)の分布
PRSP	120,866	4	0.03%	0.00 0.69

集計対象医療機関の感染率 (N=58)



(大阪府)

公開情報 2020年10月～12月 四半期報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門




2. 新規感染症患者数と罹患率

多剤耐性緑膿菌(MDRP)感染症

罹患率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(%)の分布
MDRP	120,866	1	3	0.02%	0.00 0.68


集計対象医療機関の罹患率 (N=58)



感染率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	感染症患者数	全体の感染率	集計対象医療機関の感染率(%)の分布
MDRP	120,866	4	0.03%	0.00 0.78

集計対象医療機関の感染率 (N=58)



(大阪府)

公開情報 2020年10月～12月 四半期報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門




2. 新規感染症患者数と罹患率

多剤耐性アシネトバクター属(MDRA)感染症

罹患率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(%)の分布
MDRA	120,866	0	1	0.01%	0.00 0.40


集計対象医療機関の罹患率 (N=58)



感染率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	感染症患者数	全体の感染率	集計対象医療機関の感染率(%)の分布
MDRA	120,866	1	0.01%	0.00 0.40

集計対象医療機関の感染率 (N=58)



(大阪府)

公開情報 2020年10月～12月 四半期報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門




2. 新規感染症患者数と罹患率

カルバペネム耐性腸内細菌科細菌(CRE)感染症

罹患率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(%)の分布
CRE	120,866	0	12	0.10%	0.00 1.48


集計対象医療機関の罹患率 (N=58)



感染率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	感染症患者数	全体の感染率	集計対象医療機関の感染率(%)の分布
CRE	120,866	12	0.10%	0.00 1.48

集計対象医療機関の感染率 (N=58)



(大阪府)

公開情報 2020年10月～12月 四半期報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門



2. 新規感染症患者数と罹患率

バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌(VRSA)感染症の報告はありませんでした

バンコマイシン耐性腸球菌(VRE)感染症の報告はありませんでした

総入院患者数、感染症患者数、罹患率、感染率の説明

総入院患者数 = (対象期間の各月の新規入院患者数の合計) + (対象期間の一番初めの月の継続入院患者数)

感染症患者数 = (新規感染症患者数) + (対象期間の一番初めの月の継続感染症患者数)

新規感染症患者数 = 対象期間の各月の新規感染症患者数の合計

継続感染症患者数 = 対象期間の一番初めの月より前に新規感染症患者とされ、対象期間の一番初めの月に改めて検査した際にも、継続的に同じ耐性菌に感染していた患者の数

罹患率 = (新規感染症患者数) ÷ ((総入院患者数) - (対象期間の一番初めの月の継続感染症患者数)) × 1000


感染率 = (感染症患者数) ÷ (総入院患者数) × 1000

全体の罹患率 = (集計対象医療機関の新規感染症患者数合計) ÷ ((集計対象医療機関の総入院患者数合計) - (集計対象医療機関の対象期間の一番初めの月の継続感染症患者数合計)) × 1000

全体の感染率 = (集計対象医療機関の感染症患者数合計) ÷ (集計対象医療機関の総入院患者数合計) × 1000

3. 耐性菌新規感染症・感染症患者の性別内訳


新規感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
男	209(64.9%)	196(64.9%)	0(-)	0(-)	2(50.0%)	2(66.7%)	1(100.0%)	8(66.7%)
女	113(35.1%)	106(35.1%)	0(-)	0(-)	2(50.0%)	1(33.3%)	0(-)	4(33.3%)
合計	322	302	0	0	4	3	1	12

3. 耐性菌新規感染症・感染症患者の性別内訳


感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
男	218(64.9%)	204(64.8%)	0(-)	0(-)	2(50.0%)	3(75.0%)	1(100.0%)	8(66.7%)
女	118(35.1%)	111(35.2%)	0(-)	0(-)	2(50.0%)	1(25.0%)	0(-)	4(33.3%)
合計	336	315	0	0	4	4	1	12

4. 耐性菌新規感染症・感染症患者の年齢別内訳


新規感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
1歳未満	1(0.3%)	1(0.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
1歳以上5歳未満	2(0.6%)	1(0.3%)	0(-)	0(-)	1(25.0%)	0(-)	0(-)	0(-)
5歳以上10歳未満	2(0.6%)	2(0.7%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
10歳代	1(0.3%)	1(0.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
20歳代	1(0.3%)	1(0.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
30歳代	5(1.6%)	5(1.7%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
40歳代	14(4.3%)	12(4.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	1(33.3%)	0(-)	1(8.3%)
50歳代	24(7.5%)	24(7.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
60歳代	36(11.2%)	35(11.6%)	0(-)	0(-)	0(-)	1(33.3%)	0(-)	0(-)
70歳代	93(28.9%)	83(27.5%)	0(-)	0(-)	1(25.0%)	1(33.3%)	1(100.0%)	7(58.3%)
80歳代	106(32.9%)	102(33.8%)	0(-)	0(-)	2(50.0%)	0(-)	0(-)	2(16.7%)
90歳以上	37(11.5%)	35(11.6%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	2(16.7%)
合計	322	302	0	0	4	3	1	12

4. 耐性菌新規感染症・感染症患者の年齢別内訳


感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
1歳未満	2(0.6%)	2(0.6%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
1歳以上5歳未満	2(0.6%)	1(0.3%)	0(-)	0(-)	1(25.0%)	0(-)	0(-)	0(-)
5歳以上10歳未満	2(0.6%)	2(0.6%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
10歳代	1(0.3%)	1(0.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
20歳代	1(0.3%)	1(0.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
30歳代	5(1.5%)	5(1.6%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
40歳代	15(4.5%)	13(4.1%)	0(-)	0(-)	0(-)	1(25.0%)	0(-)	1(8.3%)
50歳代	26(7.7%)	26(8.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
60歳代	38(11.3%)	36(11.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	2(50.0%)	0(-)	0(-)
70歳代	93(27.7%)	83(26.3%)	0(-)	0(-)	1(25.0%)	1(25.0%)	1(100.0%)	7(58.3%)
80歳代	111(33.0%)	107(34.0%)	0(-)	0(-)	2(50.0%)	0(-)	0(-)	2(16.7%)
90歳以上	40(11.9%)	38(12.1%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	2(16.7%)
合計	336	315	0	0	4	4	1	12

5. 耐性菌新規感染症・感染症患者の検体*内訳

新規感染症患者




分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
呼吸器系	130(40.4%)	118(39.1%)	0(-)	0(-)	4(100.0%)	2(66.7%)	1(100.0%)	5(41.7%)
尿検体	14(4.3%)	13(4.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(8.3%)
便検体	4(1.2%)	4(1.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
血液検体	89(27.6%)	85(28.1%)	0(-)	0(-)	0(-)	1(33.3%)	0(-)	3(25.0%)
髄液検体	1(0.3%)	1(0.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	84(26.1%)	81(26.8%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	3(25.0%)
合計	322	302	0	0	4	3	1	12

*検体区分については巻末の資料 1 を参照

5. 耐性菌新規感染症・感染症患者の検体*内訳

感染症患者




分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
呼吸器系	136(40.5%)	124(39.4%)	0(-)	0(-)	4(100.0%)	2(50.0%)	1(100.0%)	5(41.7%)
尿検体	15(4.5%)	14(4.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(8.3%)
便検体	4(1.2%)	4(1.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
血液検体	91(27.1%)	87(27.6%)	0(-)	0(-)	0(-)	1(25.0%)	0(-)	3(25.0%)
髄液検体	1(0.3%)	1(0.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	89(26.5%)	85(27.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	1(25.0%)	0(-)	3(25.0%)
合計	336	315	0	0	4	4	1	12

*検体区分については巻末の資料 1 を参照

6. 耐性菌新規感染症・感染症患者の感染症名別内訳


新規感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
尿路	16(5.0%)	14(4.6%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	2(16.7%)
肺炎	118(36.6%)	106(35.1%)	0(-)	0(-)	4(100.0%)	2(66.7%)	1(100.0%)	5(41.7%)
肺炎以外	6(1.9%)	6(2.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
消化器系	8(2.5%)	6(2.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	2(16.7%)
中枢神経系	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
皮膚・軟部	49(15.2%)	49(16.2%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
手術創	25(7.8%)	25(8.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
菌血症	88(27.3%)	84(27.8%)	0(-)	0(-)	0(-)	1(33.3%)	0(-)	3(25.0%)
その他	12(3.7%)	12(4.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	322	302	0	0	4	3	1	12

6. 耐性菌新規感染症・感染症患者の感染症名別内訳


感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
尿路	16(4.8%)	14(4.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	2(16.7%)
肺炎	124(36.9%)	112(35.6%)	0(-)	0(-)	4(100.0%)	2(50.0%)	1(100.0%)	5(41.7%)
肺炎以外	6(1.8%)	6(1.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
消化器系	8(2.4%)	6(1.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	2(16.7%)
中枢神経系	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
皮膚・軟部	51(15.2%)	51(16.2%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
手術創	26(7.7%)	26(8.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
菌血症	93(27.7%)	88(27.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	2(50.0%)	0(-)	3(25.0%)
その他	12(3.6%)	12(3.8%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	336	315	0	0	4	4	1	12

7. 耐性菌新規感染症・感染症患者の診療科*別内訳

新規感染症患者




分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
内科系	155(48.1%)	143(47.4%)	0(-)	0(-)	1(25.0%)	3(100.0%)	0(-)	8(66.7%)
外科系	106(32.9%)	99(32.8%)	0(-)	0(-)	2(50.0%)	0(-)	1(100.0%)	4(33.3%)
小児科系	4(1.2%)	3(1.0%)	0(-)	0(-)	1(25.0%)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	57(17.7%)	57(18.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	322	302	0	0	4	3	1	12

*診療科の内訳については巻末の資料2を参照

7. 耐性菌新規感染症・感染症患者の診療科*別内訳

感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
内科系	164(48.8%)	151(47.9%)	0(-)	0(-)	1(25.0%)	4(100.0%)	0(-)	8(66.7%)
外科系	109(32.4%)	102(32.4%)	0(-)	0(-)	2(50.0%)	0(-)	1(100.0%)	4(33.3%)
小児科系	5(1.5%)	4(1.3%)	0(-)	0(-)	1(25.0%)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	58(17.3%)	58(18.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	336	315	0	0	4	4	1	12

*診療科の内訳については巻末の資料2を参照

・資料 1

呼吸器系検体	喀出痰
	気管内採痰
	気管支洗浄液
	咽頭粘液
	鼻腔内
	口腔内
	生検材料(肺)
	胸水
	その他(呼吸器)
尿検体	自然排尿
	採尿カテーテル
	留置カテーテル
	カテーテル尿
便検体	糞便
血液検体	静脈血
	動脈血
髄液検体	髄液
その他	尿道分泌液
	膣分泌液
	胃・十二指腸液
	胆汁
	生検材料(消化管)
	腹水
	関節液
	その他

・資料 2

内科系	内科
	循環器内科
	神経内科
	呼吸器内科
	消化器内科
	胃腸科
	内分泌・代謝内科
	腎臓内科
	糖尿病内科
	アレルギー・膠原病内科
	膠原病内科
	アレルギー内科
	リウマチ内科
	血液内科
	感染症内科
	老人内科
	心療内科
外科系	外科
	消化器外科
	肛門科
	肝胆脾外科
	心血管外科
	内分泌外科
	呼吸器外科
	小児外科
	小児循環器外科
	小児消化器外科
	産婦人科
	産科
	婦人科
	整形外科
	美容外科
	眼科
	耳鼻咽喉科
	気管食道科
	泌尿器科
	皮膚・泌尿器科
小児科系	皮膚科
	脳神経外科
	形成外科
	歯科口腔外科
	歯科
	小児歯科
	矯正歯科
	口腔外科
	手術部
	移植・人工臓器科
	小児科
	新生児科
	新生児集中治療部(NICU)
	周産期センター
その他	性病科
	神経科
	精神科
	放射線科
	総合診療部
	救急部
	救急・集中治療部
	集中治療部(ICU)
	冠動脈疾患集中治療部(CCU)
	内視鏡科
	透析科
	理学療法・リハビリテーション科
	理学療法科
	リハビリテーション科
	麻酔科
	その他

精度管理について

四半期報ではVRSAに対してのみ、報告医療機関にその真偽を確認し誤報告を除外している。


厚生労働省 院内感染対策サーベイランス 薬剤耐性菌 判定基準 (Ver.3.2)

菌名	概要	菌名コード	微量液体希釈法の基準	ディスク拡散法の基準
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌 (MRSA)	MPIPC または CFX が “R” の <i>Staphylococcus aureus</i> または選択培地で MRSA と確認された菌	1301、1303	MPIPC $\geq$ 4 μ g/mL* または CFX $\geq$ 8 μ g/mL*	MPIPC $\leq$ 10mm† CFX $\leq$ 21mm*
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌 (VRSA)	VCM が微量液体希釈法で “R” の <i>Staphylococcus aureus</i>	1301、1303-1306	VCM $\geq$ 16 μ g/mL*	
バンコマイシン耐性腸球菌 (VRE)	下記のいずれかの条件を満たす <i>Enterococcus</i> spp. ・ VCM が微量液体希釈法で耐性† ・ VCM がディスク拡散法で “R” ・ 選択培地で VRE と確認された菌 注) 種の同定が行われていない <i>Enterococcus</i> sp.は除く	1201、1202、1205、1206、1209、1210、1213-1217	VCM $\geq$ 16 μ g/mL†	VCM $\leq$ 14mm*
ペニシリン耐性肺炎球菌 (PRSP)	PCG が微量液体希釈法で耐性†、または MPIPC がディスク拡散法で “S 以外” の <i>Streptococcus pneumoniae</i>	1131	PCG $\geq$ 0.125 μ g/mL†	MPIPC $\leq$ 19mm†
多剤耐性緑膿菌 (MDRP)	下記のすべての条件を満たす <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ・ カルバペネム系 (IPM、MEPM のいずれか) が微量液体希釈法で耐性†、またはディスク拡散法で “R” ・ アミノグリコシド系は AMK が微量液体希釈法で耐性†、またはディスク拡散法で “R” ・ フルオロキノロン系が “R” (NFLX、OFLX、LVFX、LFLX、CPFX のいずれか)	4001	IPM・MEPM $\geq$ 16 μ g/mL† AMK $\geq$ 32 μ g/mL† NFLX $\geq$ 16 μ g/mL* OFLX・LVFX・LFLX $\geq$ 8mL* CPFX $\geq$ 4 μ g/mL*†	IPM・MEPM $\leq$ 13mm† AMK $\leq$ 14mm* NFLX・OFLX $\leq$ 12mm* LVFX $\leq$ 13mm* LFLX $\leq$ 18mm* CPFX $\leq$ 15mm*†
多剤耐性アシネトバクター属 (MDRA)	下記のすべての条件を満たす <i>Acinetobacter</i> spp. ・ カルバペネム系が “R” (IPM、MEPM のいずれか) ・ アミノグリコシド系は AMK が微量液体希釈法で耐性† またはディスク拡散法で “R” ・ フルオロキノロン系が “R” (LVFX、CPFX のいずれか)	4400-4403	IPM・MEPM $\geq$ 16 μ g/mL† AMK $\geq$ 32 μ g/mL† LVFX $\geq$ 8 μ g/mL* CPFX $\geq$ 4 μ g/mL*†	IPM・MEPM $\leq$ 13mm† AMK $\leq$ 14mm† LVFX $\leq$ 13mm* CPFX $\leq$ 15mm*†
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌 (CRE)	下記のいずれかの条件を満たす腸内細菌科細菌 ・ MEPM が耐性† ・ IPM が耐性†、かつ CMZ が “R”	2000-2691、3150-3151	MEPM $\geq$ 2 μ g/mL† IPM $\geq$ 2 μ g/mL†かつ CMZ $\geq$ 64 μ g/mL*†	MEPM $\leq$ 22mm† IPM $\leq$ 22mm† かつ CMZ $\leq$ 12mm*†

* S,I,R の判定は CLSI2012(M100-S22)に準拠

† 感染症発生动向調査の基準に準拠

1. データ提出医療機関*数(51医療機関)



*ここではデータ提出医療機関は集計対象医療機関を表す

† JANIS参加 = 2020年10月～12月 集計対象医療機関数

‡ JANIS非参加 = (2019年 都道府県別医療機関数¶) - (2020年10月～12月 集計対象医療機関数)

病床数	2019年 都道府県別医療機関数¶	2020年10月～12月 集計対象医療機関数 (都道府県別医療機関数に占める割合)
900床以上	2	1 (50%)
500～899床	10	2 (20%)
200～499床	90	21 (23.3%)
200床未満	246	27 (11%)
病床数不明	-	0 (-)
合計	348	51 (14.7%)

¶2019年医療施設（動態）調査を参照した。

(兵庫県)

公開情報 2020年10月～12月 四半期報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門




2. 新規感染症患者数と罹患率

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症

罹患率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(%)の分布
MRSA	70,522	12	200	2.84%	0.00 2.23 14.99


集計対象医療機関の罹患率 (N=51)



感染率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	感染症患者数	全体の感染率	集計対象医療機関の感染率(%)の分布
MRSA	70,522	212	3.01%	0.00 2.28 17.14

集計対象医療機関の感染率 (N=51)



(兵庫県)

公開情報 2020年10月～12月 四半期報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門




2. 新規感染症患者数と罹患率

バンコマイシン耐性腸球菌(VRE)感染症

罹患率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(‰)の分布
VRE	70,522	0	1	0.01%	0.00 0.21


集計対象医療機関の罹患率 (N=51)



感染率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	感染症患者数	全体の感染率	集計対象医療機関の感染率(‰)の分布
VRE	70,522	1	0.01%	0.00 0.21

集計対象医療機関の感染率 (N=51)



(兵庫県)

公開情報 2020年10月～12月 四半期報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門




2. 新規感染症患者数と罹患率

ペニシリン耐性肺炎球菌(PRSP)感染症

罹患率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(‰)の分布
PRSP	70,522	0	2	0.03%	0.00 0.91


集計対象医療機関の罹患率 (N=51)



感染率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	感染症患者数	全体の感染率	集計対象医療機関の感染率(‰)の分布
PRSP	70,522	2	0.03%	0.00 0.91

集計対象医療機関の感染率 (N=51)



(兵庫県)

公開情報 2020年10月～12月 四半期報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門




2. 新規感染症患者数と罹患率

多剤耐性緑膿菌(MDRP)感染症

罹患率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(%)の分布
MDRP	70,522	0	3	0.04%	0.00 0.46


集計対象医療機関の罹患率 (N=51)



感染率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	感染症患者数	全体の感染率	集計対象医療機関の感染率(%)の分布
MDRP	70,522	3	0.04%	0.00 0.46

集計対象医療機関の感染率 (N=51)



(兵庫県)

公開情報 2020年10月～12月 四半期報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門




2. 新規感染症患者数と罹患率

カルバペネム耐性腸内細菌科細菌(CRE)感染症

罹患率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(%)の分布
CRE	70,522	0	6	0.09%	0.00 0.87


集計対象医療機関の罹患率 (N=51)



感染率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	感染症患者数	全体の感染率	集計対象医療機関の感染率(%)の分布
CRE	70,522	6	0.09%	0.00 0.87

集計対象医療機関の感染率 (N=51)



(兵庫県)

公開情報 2020年10月～12月 四半期報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門



2. 新規感染症患者数と罹患率

バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌(VRSA)感染症の報告はありませんでした

多剤耐性アシネトバクター属(MDRA)感染症の報告はありませんでした

総入院患者数、感染症患者数、罹患率、感染率の説明

総入院患者数 = (対象期間の各月の新規入院患者数の合計) + (対象期間の一番初めの月の継続入院患者数)

感染症患者数 = (新規感染症患者数) + (対象期間の一番初めの月の継続感染症患者数)

新規感染症患者数 = 対象期間の各月の新規感染症患者数の合計

継続感染症患者数 = 対象期間の一番初めの月より前に新規感染症患者とされ、対象期間の一番初めの月に改めて検査した際にも、継続的に同じ耐性菌に感染していた患者の数

罹患率 = (新規感染症患者数) ÷ ((総入院患者数) - (対象期間の一番初めの月の継続感染症患者数)) × 1000

感染率 = (感染症患者数) ÷ (総入院患者数) × 1000

全体の罹患率 = (集計対象医療機関の新規感染症患者数合計) ÷ ((集計対象医療機関の総入院患者数合計) - (集計対象医療機関の対象期間の一番初めの月の継続感染症患者数合計)) × 1000

全体の感染率 = (集計対象医療機関の感染症患者数合計) ÷ (集計対象医療機関の総入院患者数合計) × 1000

(兵庫県)


公開情報 2020年10月～12月 四半期報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門



3. 耐性菌新規感染症・感染症患者の性別内訳


新規感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
男	145 (68.4%)	136 (68.0%)	0 (-)	1 (100.0%)	1 (50.0%)	2 (66.7%)	0 (-)	5 (83.3%)
女	67 (31.6%)	64 (32.0%)	0 (-)	0 (-)	1 (50.0%)	1 (33.3%)	0 (-)	1 (16.7%)
合計	212	200	0	1	2	3	0	6

3. 耐性菌新規感染症・感染症患者の性別内訳


感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
男	150 (67.0%)	141 (66.5%)	0 (-)	1 (100.0%)	1 (50.0%)	2 (66.7%)	0 (-)	5 (83.3%)
女	74 (33.0%)	71 (33.5%)	0 (-)	0 (-)	1 (50.0%)	1 (33.3%)	0 (-)	1 (16.7%)
合計	224	212	0	1	2	3	0	6

4. 耐性菌新規感染症・感染症患者の年齢別内訳

新規感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
1歳未満	2(0.9%)	2(1.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
1歳以上5歳未満	2(0.9%)	2(1.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
5歳以上10歳未満	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
10歳代	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
20歳代	4(1.9%)	4(2.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
30歳代	6(2.8%)	5(2.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	1(33.3%)	0(-)	0(-)
40歳代	6(2.8%)	5(2.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(16.7%)
50歳代	12(5.7%)	11(5.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	1(33.3%)	0(-)	0(-)
60歳代	19(9.0%)	17(8.5%)	0(-)	1(100.0%)	1(50.0%)	0(-)	0(-)	0(-)
70歳代	51(24.1%)	49(24.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	2(33.3%)
80歳代	82(38.7%)	78(39.0%)	0(-)	0(-)	1(50.0%)	0(-)	0(-)	3(50.0%)
90歳以上	28(13.2%)	27(13.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	1(33.3%)	0(-)	0(-)
合計	212	200	0	1	2	3	0	6

(兵庫県)


公開情報 2020年10月～12月 四半期報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門



4. 耐性菌新規感染症・感染症患者の年齢別内訳


感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
1歳未満	2(0.9%)	2(0.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
1歳以上5歳未満	2(0.9%)	2(0.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
5歳以上10歳未満	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
10歳代	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
20歳代	4(1.8%)	4(1.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
30歳代	6(2.7%)	5(2.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	1(33.3%)	0(-)	0(-)
40歳代	8(3.6%)	7(3.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(16.7%)
50歳代	12(5.4%)	11(5.2%)	0(-)	0(-)	0(-)	1(33.3%)	0(-)	0(-)
60歳代	20(8.9%)	18(8.5%)	0(-)	1(100.0%)	1(50.0%)	0(-)	0(-)	0(-)
70歳代	55(24.6%)	53(25.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	2(33.3%)
80歳代	87(38.8%)	83(39.2%)	0(-)	0(-)	1(50.0%)	0(-)	0(-)	3(50.0%)
90歳以上	28(12.5%)	27(12.7%)	0(-)	0(-)	0(-)	1(33.3%)	0(-)	0(-)
合計	224	212	0	1	2	3	0	6

5. 耐性菌新規感染症・感染症患者の検体*内訳

新規感染症患者




分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
呼吸器系	91(42.9%)	86(43.0%)	0(-)	0(-)	2(100.0%)	2(66.7%)	0(-)	1(16.7%)
尿検体	11(5.2%)	8(4.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	1(33.3%)	0(-)	2(33.3%)
便検体	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
血液検体	53(25.0%)	53(26.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
髄液検体	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	57(26.9%)	53(26.5%)	0(-)	1(100.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	3(50.0%)
合計	212	200	0	1	2	3	0	6

*検体区分については巻末の資料 1 を参照

5. 耐性菌新規感染症・感染症患者の検体*内訳

感染症患者




分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
呼吸器系	94(42.0%)	89(42.0%)	0(-)	0(-)	2(100.0%)	2(66.7%)	0(-)	1(16.7%)
尿検体	13(5.8%)	10(4.7%)	0(-)	0(-)	0(-)	1(33.3%)	0(-)	2(33.3%)
便検体	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
血液検体	56(25.0%)	56(26.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
髄液検体	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	61(27.2%)	57(26.9%)	0(-)	1(100.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	3(50.0%)
合計	224	212	0	1	2	3	0	6

*検体区分については巻末の資料 1 を参照

6. 耐性菌新規感染症・感染症患者の感染症名別内訳


新規感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
尿路	12(5.7%)	9(4.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	1(33.3%)	0(-)	2(33.3%)
肺炎	89(42.0%)	84(42.0%)	0(-)	0(-)	2(100.0%)	2(66.7%)	0(-)	1(16.7%)
肺炎以外	2(0.9%)	2(1.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
消化器系	6(2.8%)	4(2.0%)	0(-)	1(100.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	1(16.7%)
中枢神経系	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
皮膚・軟部	26(12.3%)	26(13.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
手術創	18(8.5%)	16(8.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	2(33.3%)
菌血症	49(23.1%)	49(24.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	10(4.7%)	10(5.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	212	200	0	1	2	3	0	6

6. 耐性菌新規感染症・感染症患者の感染症名別内訳

感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
尿路	14(6.3%)	11(5.2%)	0(-)	0(-)	0(-)	1(33.3%)	0(-)	2(33.3%)
肺炎	93(41.5%)	88(41.5%)	0(-)	0(-)	2(100.0%)	2(66.7%)	0(-)	1(16.7%)
肺炎以外	2(0.9%)	2(0.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
消化器系	6(2.7%)	4(1.9%)	0(-)	1(100.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	1(16.7%)
中枢神経系	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
皮膚・軟部	28(12.5%)	28(13.2%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
手術創	19(8.5%)	17(8.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	2(33.3%)
菌血症	50(22.3%)	50(23.6%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	12(5.4%)	12(5.7%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	224	212	0	1	2	3	0	6

(兵庫県)


公開情報 2020年10月～12月 四半期報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門



7. 耐性菌新規感染症・感染症患者の診療科*別内訳

新規感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
内科系	86(40.6%)	82(41.0%)	0(-)	1(100.0%)	1(50.0%)	1(33.3%)	0(-)	1(16.7%)
外科系	85(40.1%)	78(39.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	2(66.7%)	0(-)	5(83.3%)
小児科系	4(1.9%)	4(2.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	37(17.5%)	36(18.0%)	0(-)	0(-)	1(50.0%)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	212	200	0	1	2	3	0	6

*診療科の内訳については巻末の資料2を参照

(兵庫県)


公開情報 2020年10月～12月 四半期報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門



7. 耐性菌新規感染症・感染症患者の診療科*別内訳

感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
内科系	95(42.4%)	91(42.9%)	0(-)	1(100.0%)	1(50.0%)	1(33.3%)	0(-)	1(16.7%)
外科系	88(39.3%)	81(38.2%)	0(-)	0(-)	0(-)	2(66.7%)	0(-)	5(83.3%)
小児科系	4(1.8%)	4(1.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	37(16.5%)	36(17.0%)	0(-)	0(-)	1(50.0%)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	224	212	0	1	2	3	0	6

*診療科の内訳については巻末の資料2を参照

・資料 1

呼吸器系検体	喀出痰
	気管内採痰
	気管支洗浄液
	咽頭粘液
	鼻腔内
	口腔内
	生検材料(肺)
	胸水
	その他(呼吸器)
尿検体	自然排尿
	採尿カテーテル
	留置カテーテル
	カテーテル尿
便検体	糞便
血液検体	静脈血
	動脈血
髄液検体	髄液
その他	尿道分泌液
	膣分泌液
	胃・十二指腸液
	胆汁
	生検材料(消化管)
	腹水
	関節液
	その他

・資料 2

内科系	内科
	循環器内科
	神経内科
	呼吸器内科
	消化器内科
	胃腸科
	内分泌・代謝内科
	腎臓内科
	糖尿病内科
	アレルギー・膠原病内科
	膠原病内科
	アレルギー内科
	リウマチ内科
	血液内科
	感染症内科
	老人内科
	心療内科
外科系	外科
	消化器外科
	肛門科
	肝胆脾外科
	心血管外科
	内分泌外科
	呼吸器外科
	小児外科
	小児循環器外科
	小児消化器外科
	産婦人科
	産科
	婦人科
	整形外科
	美容外科
	眼科
	耳鼻咽喉科
	気管食道科
	泌尿器科
	皮膚・泌尿器科
小児科系	皮膚科
	脳神経外科
	形成外科
	歯科口腔外科
	歯科
	小児歯科
	矯正歯科
	口腔外科
	手術部
	移植・人工臓器科
	小児科
	新生児科
	新生児集中治療部(NICU)
	周産期センター
内科系	性病科
	神経科
	精神科
	放射線科
	総合診療部
	救急部
	救急・集中治療部
	集中治療部(ICU)
	冠動脈疾患集中治療部(CCU)
	内視鏡科
	透析科
	理学療法・リハビリテーション科
	理学療法科
	リハビリテーション科
	麻酔科
	その他
外科系	性病科
	神経科
	精神科
	放射線科
	総合診療部
	救急部
	救急・集中治療部
	集中治療部(ICU)
	冠動脈疾患集中治療部(CCU)
	内視鏡科
	透析科
	理学療法・リハビリテーション科
	理学療法科
	リハビリテーション科
	麻酔科
	その他

精度管理について

四半期報ではVRSAに対してのみ、報告医療機関にその真偽を確認し誤報告を除外している。


厚生労働省 院内感染対策サーベイランス 薬剤耐性菌 判定基準 (Ver.3.2)

菌名	概要	菌名コード	微量液体希釈法の基準	ディスク拡散法の基準
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌 (MRSA)	MPIPC または CFX が “R” の <i>Staphylococcus aureus</i> または選択培地で MRSA と確認された菌	1301、1303	MPIPC $\geq$ 4 μ g/mL* または CFX $\geq$ 8 μ g/mL*	MPIPC $\leq$ 10mm† CFX $\leq$ 21mm*
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌 (VRSA)	VCM が微量液体希釈法で “R” の <i>Staphylococcus aureus</i>	1301、1303-1306	VCM $\geq$ 16 μ g/mL*	
バンコマイシン耐性腸球菌 (VRE)	下記のいずれかの条件を満たす <i>Enterococcus</i> spp. ・ VCM が微量液体希釈法で耐性† ・ VCM がディスク拡散法で “R” ・ 選択培地で VRE と確認された菌 注) 種の同定が行われていない <i>Enterococcus</i> sp.は除く	1201、1202、1205、1206、1209、1210、1213-1217	VCM $\geq$ 16 μ g/mL†	VCM $\leq$ 14mm*
ペニシリン耐性肺炎球菌 (PRSP)	PCG が微量液体希釈法で耐性†、または MPIPC がディスク拡散法で “S 以外” の <i>Streptococcus pneumoniae</i>	1131	PCG $\geq$ 0.125 μ g/mL†	MPIPC $\leq$ 19mm†
多剤耐性緑膿菌 (MDRP)	下記のすべての条件を満たす <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ・ カルバペネム系 (IPM、MEPM のいずれか) が微量液体希釈法で耐性†、またはディスク拡散法で “R” ・ アミノグリコシド系は AMK が微量液体希釈法で耐性†、またはディスク拡散法で “R” ・ フルオロキノロン系が “R” (NFLX、OFLX、LVFX、LFLX、CPFX のいずれか)	4001	IPM・MEPM $\geq$ 16 μ g/mL† AMK $\geq$ 32 μ g/mL† NFLX $\geq$ 16 μ g/mL* OFLX・LVFX・LFLX $\geq$ 8mL* CPFX $\geq$ 4 μ g/mL*†	IPM・MEPM $\leq$ 13mm† AMK $\leq$ 14mm* NFLX・OFLX $\leq$ 12mm* LVFX $\leq$ 13mm* LFLX $\leq$ 18mm* CPFX $\leq$ 15mm*†
多剤耐性アシネトバクター属 (MDRA)	下記のすべての条件を満たす <i>Acinetobacter</i> spp. ・ カルバペネム系が “R” (IPM、MEPM のいずれか) ・ アミノグリコシド系は AMK が微量液体希釈法で耐性† またはディスク拡散法で “R” ・ フルオロキノロン系が “R” (LVFX、CPFX のいずれか)	4400-4403	IPM・MEPM $\geq$ 16 μ g/mL† AMK $\geq$ 32 μ g/mL† LVFX $\geq$ 8 μ g/mL* CPFX $\geq$ 4 μ g/mL*†	IPM・MEPM $\leq$ 13mm† AMK $\leq$ 14mm† LVFX $\leq$ 13mm* CPFX $\leq$ 15mm*†
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌 (CRE)	下記のいずれかの条件を満たす腸内細菌科細菌 ・ MEPM が耐性† ・ IPM が耐性†、かつ CMZ が “R”	2000-2691、3150-3151	MEPM $\geq$ 2 μ g/mL† IPM $\geq$ 2 μ g/mL†かつ CMZ $\geq$ 64 μ g/mL*†	MEPM $\leq$ 22mm† IPM $\leq$ 22mm† かつ CMZ $\leq$ 12mm*†

* S,I,R の判定は CLSI2012(M100-S22)に準拠

† 感染症発生动向調査の基準に準拠

1. データ提出医療機関*数(8医療機関)



*ここではデータ提出医療機関は集計対象医療機関を表す

† JANIS参加 = 2020年10月～12月 集計対象医療機関数

‡ JANIS非参加 = (2019年 都道府県別医療機関数¶) - (2020年10月～12月 集計対象医療機関数)

病床数	2019年 都道府県別医療機関数¶	2020年10月～12月 集計対象医療機関数 (都道府県別医療機関数に占める割合)
900床以上	1	1 (100%)
500～899床	5	1 (20%)
200～499床	26	5 (19.2%)
200床未満	47	1 (2.1%)
病床数不明	-	0 (-)
合計	79	8 (10.1%)

¶2019年医療施設（動態）調査を参照した。

(奈良県)

公開情報 2020年10月～12月 四半期報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門




2. 新規感染症患者数と罹患率

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症

罹患率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(%)の分布
MRSA	16,813	1	39	2.32%	0.00 1.45 4.06


集計対象医療機関の罹患率 (N=8)



感染率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	感染症患者数	全体の感染率	集計対象医療機関の感染率(%)の分布
MRSA	16,813	40	2.38%	0.00 1.45 4.29

集計対象医療機関の感染率 (N=8)



(奈良県)

公開情報 2020年10月～12月 四半期報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門




2. 新規感染症患者数と罹患率

ペニシリン耐性肺炎球菌(PRSP)感染症

罹患率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(%)の分布
PRSP	16,813	0	3	0.18%	0.00 0.89


集計対象医療機関の罹患率 (N=8)



感染率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	感染症患者数	全体の感染率	集計対象医療機関の感染率(%)の分布
PRSP	16,813	3	0.18%	0.00 0.89

集計対象医療機関の感染率 (N=8)




2. 新規感染症患者数と罹患率

カルバペネム耐性腸内細菌科細菌(CRE)感染症

罹患率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(%)の分布
CRE	16,813	0	2	0.12%	0.00 0.23


集計対象医療機関の罹患率 (N=8)



感染率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	感染症患者数	全体の感染率	集計対象医療機関の感染率(%)の分布
CRE	16,813	2	0.12%	0.00 0.23

集計対象医療機関の感染率 (N=8)



(奈良県)

公開情報 2020年10月～12月 四半期報(全集計対象医療機関)
院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門



2. 新規感染症患者数と罹患率

バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌(VRSA)感染症の報告はありませんでした

バンコマイシン耐性腸球菌(VRE)感染症の報告はありませんでした

多剤耐性緑膿菌(MDRP)感染症の報告はありませんでした

多剤耐性アシネトバクター属(MDRA)感染症の報告はありませんでした

総入院患者数、感染症患者数、罹患率、感染率の説明

総入院患者数 = (対象期間の各月の新規入院患者数の合計) + (対象期間の一番初めの月の継続入院患者数)

感染症患者数 = (新規感染症患者数) + (対象期間の一番初めの月の継続感染症患者数)

新規感染症患者数 = 対象期間の各月の新規感染症患者数の合計

継続感染症患者数 = 対象期間の一番初めの月より前に新規感染症患者とされ、対象期間の一番初めの月に改めて検査した際にも、継続的に同じ耐性菌に感染していた患者の数

罹患率 = (新規感染症患者数) ÷ ((総入院患者数) - (対象期間の一番初めの月の継続感染症患者数)) × 1000


感染率 = (感染症患者数) ÷ (総入院患者数) × 1000

全体の罹患率 = (集計対象医療機関の新規感染症患者数合計) ÷ ((集計対象医療機関の総入院患者数合計) - (集計対象医療機関の対象期間の一番初めの月の継続感染症患者数合計)) × 1000

全体の感染率 = (集計対象医療機関の感染症患者数合計) ÷ (集計対象医療機関の総入院患者数合計) × 1000

3. 耐性菌新規感染症・感染症患者の性別内訳


新規感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
男	23 (52.3%)	22 (56.4%)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	1 (50.0%)
女	21 (47.7%)	17 (43.6%)	0 (-)	0 (-)	3 (100.0%)	0 (-)	0 (-)	1 (50.0%)
合計	44	39	0	0	3	0	0	2

3. 耐性菌新規感染症・感染症患者の性別内訳


感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
男	24 (53.3%)	23 (57.5%)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	1 (50.0%)
女	21 (46.7%)	17 (42.5%)	0 (-)	0 (-)	3 (100.0%)	0 (-)	0 (-)	1 (50.0%)
合計	45	40	0	0	3	0	0	2

4. 耐性菌新規感染症・感染症患者の年齢別内訳


新規感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
1歳未満	4(9.1%)	4(10.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
1歳以上5歳未満	1(2.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	1(33.3%)	0(-)	0(-)	0(-)
5歳以上10歳未満	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
10歳代	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
20歳代	1(2.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	1(33.3%)	0(-)	0(-)	0(-)
30歳代	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
40歳代	2(4.5%)	2(5.1%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
50歳代	3(6.8%)	3(7.7%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
60歳代	6(13.6%)	6(15.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
70歳代	16(36.4%)	14(35.9%)	0(-)	0(-)	1(33.3%)	0(-)	0(-)	1(50.0%)
80歳代	7(15.9%)	6(15.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(50.0%)
90歳以上	4(9.1%)	4(10.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	44	39	0	0	3	0	0	2

4. 耐性菌新規感染症・感染症患者の年齢別内訳


感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
1歳未満	4(8.9%)	4(10.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
1歳以上5歳未満	1(2.2%)	0(-)	0(-)	0(-)	1(33.3%)	0(-)	0(-)	0(-)
5歳以上10歳未満	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
10歳代	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
20歳代	1(2.2%)	0(-)	0(-)	0(-)	1(33.3%)	0(-)	0(-)	0(-)
30歳代	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
40歳代	2(4.4%)	2(5.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
50歳代	3(6.7%)	3(7.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
60歳代	7(15.6%)	7(17.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
70歳代	16(35.6%)	14(35.0%)	0(-)	0(-)	1(33.3%)	0(-)	0(-)	1(50.0%)
80歳代	7(15.6%)	6(15.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(50.0%)
90歳以上	4(8.9%)	4(10.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	45	40	0	0	3	0	0	2

5. 耐性菌新規感染症・感染症患者の検体*内訳

新規感染症患者




分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
呼吸器系	17(38.6%)	15(38.5%)	0(-)	0(-)	2(66.7%)	0(-)	0(-)	0(-)
尿検体	3(6.8%)	3(7.7%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
便検体	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
血液検体	10(22.7%)	8(20.5%)	0(-)	0(-)	1(33.3%)	0(-)	0(-)	1(50.0%)
髄液検体	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	14(31.8%)	13(33.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(50.0%)
合計	44	39	0	0	3	0	0	2

*検体区分については巻末の資料 1 を参照

5. 耐性菌新規感染症・感染症患者の検体*内訳

感染症患者




分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
呼吸器系	17(37.8%)	15(37.5%)	0(-)	0(-)	2(66.7%)	0(-)	0(-)	0(-)
尿検体	3(6.7%)	3(7.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
便検体	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
血液検体	10(22.2%)	8(20.0%)	0(-)	0(-)	1(33.3%)	0(-)	0(-)	1(50.0%)
髄液検体	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	15(33.3%)	14(35.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(50.0%)
合計	45	40	0	0	3	0	0	2

*検体区分については巻末の資料1を参照

6. 耐性菌新規感染症・感染症患者の感染症名別内訳


新規感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
尿路	4(9.1%)	4(10.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
肺炎	15(34.1%)	12(30.8%)	0(-)	0(-)	3(100.0%)	0(-)	0(-)	0(-)
肺炎以外	1(2.3%)	1(2.6%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
消化器系	4(9.1%)	3(7.7%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(50.0%)
中枢神経系	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
皮膚・軟部	6(13.6%)	6(15.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
手術創	2(4.5%)	2(5.1%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
菌血症	5(11.4%)	4(10.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(50.0%)
その他	7(15.9%)	7(17.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	44	39	0	0	3	0	0	2

6. 耐性菌新規感染症・感染症患者の感染症名別内訳


感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
尿路	4(8.9%)	4(10.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
肺炎	15(33.3%)	12(30.0%)	0(-)	0(-)	3(100.0%)	0(-)	0(-)	0(-)
肺炎以外	1(2.2%)	1(2.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
消化器系	4(8.9%)	3(7.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(50.0%)
中枢神経系	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
皮膚・軟部	6(13.3%)	6(15.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
手術創	2(4.4%)	2(5.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
菌血症	5(11.1%)	4(10.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(50.0%)
その他	8(17.8%)	8(20.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	45	40	0	0	3	0	0	2

7. 耐性菌新規感染症・感染症患者の診療科*別内訳

新規感染症患者




分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
内科系	12(27.3%)	10(25.6%)	0(-)	0(-)	1(33.3%)	0(-)	0(-)	1(50.0%)
外科系	19(43.2%)	18(46.2%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(50.0%)
小児科系	5(11.4%)	4(10.3%)	0(-)	0(-)	1(33.3%)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	8(18.2%)	7(17.9%)	0(-)	0(-)	1(33.3%)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	44	39	0	0	3	0	0	2

*診療科の内訳については巻末の資料2を参照

7. 耐性菌新規感染症・感染症患者の診療科*別内訳

感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
内科系	12(26.7%)	10(25.0%)	0(-)	0(-)	1(33.3%)	0(-)	0(-)	1(50.0%)
外科系	19(42.2%)	18(45.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(50.0%)
小児科系	5(11.1%)	4(10.0%)	0(-)	0(-)	1(33.3%)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	9(20.0%)	8(20.0%)	0(-)	0(-)	1(33.3%)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	45	40	0	0	3	0	0	2

*診療科の内訳については巻末の資料2を参照

・資料 1

呼吸器系検体	喀出痰
	気管内採痰
	気管支洗浄液
	咽頭粘液
	鼻腔内
	口腔内
	生検材料(肺)
	胸水
	その他(呼吸器)
尿検体	自然排尿
	採尿カテーテル
	留置カテーテル
	カテーテル尿
便検体	糞便
血液検体	静脈血
	動脈血
髄液検体	髄液
その他	尿道分泌液
	膣分泌液
	胃・十二指腸液
	胆汁
	生検材料(消化管)
	腹水
	関節液
	その他

・資料 2

内科系	内科	外科系	外科
	循環器内科		消化器外科
	神経内科		肛門科
	呼吸器内科		肝胆脾外科
	消化器内科		心血管外科
	胃腸科		内分泌外科
	内分泌・代謝内科		呼吸器外科
	腎臓内科		小児外科
	糖尿病内科		小児循環器外科
	アレルギー・膠原病内科		小児消化器外科
	膠原病内科		産婦人科
	アレルギー内科		産科
	リウマチ内科		婦人科
	血液内科		整形外科
	感染症内科		美容外科
	老人内科		眼科
	心療内科		耳鼻咽喉科
その他	性病科		気管食道科
	神経科		泌尿器科
	精神科		皮膚・泌尿器科
	放射線科		皮膚科
	総合診療部		脳神経外科
	救急部		形成外科
	救急・集中治療部		歯科口腔外科
	集中治療部(ICU)		歯科
	冠動脈疾患集中治療部(CCU)		小児歯科
	内視鏡科		矯正歯科
	透析科		口腔外科
	理学療法・リハビリテーション科		手術部
	理学療法科		移植・人工臓器科
	リハビリテーション科	小児科系	小児科
	麻酔科		新生児科
	その他		新生児集中治療部(NICU)
			周産期センター

精度管理について

四半期報ではVRSAに対してのみ、報告医療機関にその真偽を確認し誤報告を除外している。


厚生労働省 院内感染対策サーベイランス 薬剤耐性菌 判定基準 (Ver.3.2)

菌名	概要	菌名コード	微量液体希釈法の基準	ディスク拡散法の基準
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌 (MRSA)	MPIPC または CFX が “R” の <i>Staphylococcus aureus</i> または選択培地で MRSA と確認された菌	1301、1303	MPIPC $\geq$ 4 μ g/mL* または CFX $\geq$ 8 μ g/mL*	MPIPC $\leq$ 10mm† CFX $\leq$ 21mm*
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌 (VRSA)	VCM が微量液体希釈法で “R” の <i>Staphylococcus aureus</i>	1301、1303-1306	VCM $\geq$ 16 μ g/mL*	
バンコマイシン耐性腸球菌 (VRE)	下記のいずれかの条件を満たす <i>Enterococcus</i> spp. ・ VCM が微量液体希釈法で耐性† ・ VCM がディスク拡散法で “R” ・ 選択培地で VRE と確認された菌 注) 種の同定が行われていない <i>Enterococcus</i> sp. は除く	1201、1202、1205、1206、1209、1210、1213-1217	VCM $\geq$ 16 μ g/mL†	VCM $\leq$ 14mm*
ペニシリン耐性肺炎球菌 (PRSP)	PCG が微量液体希釈法で耐性†、または MPIPC がディスク拡散法で “S 以外” の <i>Streptococcus pneumoniae</i>	1131	PCG $\geq$ 0.125 μ g/mL†	MPIPC $\leq$ 19mm†
多剤耐性緑膿菌 (MDRP)	下記のすべての条件を満たす <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ・ カルバペネム系 (IPM、MEPM のいずれか) が微量液体希釈法で耐性†、またはディスク拡散法で “R” ・ アミノグリコシド系は AMK が微量液体希釈法で耐性†、またはディスク拡散法で “R” ・ フルオロキノロン系が “R” (NFLX、OFLX、LVFX、LFLX、CPFX のいずれか)	4001	IPM・MEPM $\geq$ 16 μ g/mL† AMK $\geq$ 32 μ g/mL† NFLX $\geq$ 16 μ g/mL* OFLX・LVFX・LFLX $\geq$ 8mL* CPFX $\geq$ 4 μ g/mL*†	IPM・MEPM $\leq$ 13mm† AMK $\leq$ 14mm* NFLX・OFLX $\leq$ 12mm* LVFX $\leq$ 13mm* LFLX $\leq$ 18mm* CPFX $\leq$ 15mm*†
多剤耐性アシネトバクター属 (MDRA)	下記のすべての条件を満たす <i>Acinetobacter</i> spp. ・ カルバペネム系が “R” (IPM、MEPM のいずれか) ・ アミノグリコシド系は AMK が微量液体希釈法で耐性† またはディスク拡散法で “R” ・ フルオロキノロン系が “R” (LVFX、CPFX のいずれか)	4400-4403	IPM・MEPM $\geq$ 16 μ g/mL† AMK $\geq$ 32 μ g/mL† LVFX $\geq$ 8 μ g/mL* CPFX $\geq$ 4 μ g/mL*†	IPM・MEPM $\leq$ 13mm† AMK $\leq$ 14mm† LVFX $\leq$ 13mm* CPFX $\leq$ 15mm*†
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌 (CRE)	下記のいずれかの条件を満たす腸内細菌科細菌 ・ MEPM が耐性† ・ IPM が耐性†、かつ CMZ が “R”	2000-2691、3150-3151	MEPM $\geq$ 2 μ g/mL† IPM $\geq$ 2 μ g/mL† かつ CMZ $\geq$ 64 μ g/mL*†	MEPM $\leq$ 22mm† IPM $\leq$ 22mm† かつ CMZ $\leq$ 12mm*†

* S,I,R の判定は CLSI2012(M100-S22)に準拠

† 感染症発生动向調査の基準に準拠

1. データ提出医療機関*数(13医療機関)



*ここではデータ提出医療機関は集計対象医療機関を表す

† JANIS参加 = 2020年10月～12月 集計対象医療機関数

‡ JANIS非参加 = (2019年 都道府県別医療機関数¶) - (2020年10月～12月 集計対象医療機関数)

病床数	2019年 都道府県別医療機関数¶	2020年10月～12月 集計対象医療機関数 (都道府県別医療機関数に占める割合)
900床以上	0	0 (-)
500～899床	2	2 (100%)
200～499床	15	9 (60%)
200床未満	66	2 (3%)
病床数不明	-	0 (-)
合計	83	13 (15.7%)

¶2019年医療施設（動態）調査を参照した。


2. 新規感染症患者数と罹患率

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症

罹患率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(%)の分布
MRSA	24,449	0	64	2.62%	0.00 3.02 9.46 ----- -----


集計対象医療機関の罹患率 (N=13)



感染率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	感染症患者数	全体の感染率	集計対象医療機関の感染率(%)の分布
MRSA	24,449	64	2.62%	0.00 3.02 9.46 ----- -----

集計対象医療機関の感染率 (N=13)




2. 新規感染症患者数と罹患率

バンコマイシン耐性腸球菌(VRE)感染症

罹患率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(%)の分布
VRE	24,449	0	4	0.16%	0.00 4.22


集計対象医療機関の罹患率 (N=13)



感染率

薬剤耐性菌名	総入院患者数	感染症患者数	全体の感染率	集計対象医療機関の感染率(%)の分布
VRE	24,449	4	0.16%	0.00 4.22

集計対象医療機関の感染率 (N=13)



(和歌山県)

公開情報 2020年10月～12月 四半期報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門



2. 新規感染症患者数と罹患率

バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌(VRSA)感染症の報告はありませんでした

ペニシリン耐性肺炎球菌(PRSP)感染症の報告はありませんでした

多剤耐性緑膿菌(MDRP)感染症の報告はありませんでした

多剤耐性アシネトバクター属(MDRA)感染症の報告はありませんでした

カルバペネム耐性腸内細菌科細菌(CRE)感染症の報告はありませんでした

総入院患者数、感染症患者数、罹患率、感染率の説明

総入院患者数 = (対象期間の各月の新規入院患者数の合計) + (対象期間の一番初めの月の継続入院患者数)

感染症患者数 = (新規感染症患者数) + (対象期間の一番初めの月の継続感染症患者数)

新規感染症患者数 = 対象期間の各月の新規感染症患者数の合計

継続感染症患者数 = 対象期間の一番初めの月より前に新規感染症患者とされ、対象期間の一番初めの月に改めて検査した際にも、継続的に同じ耐性菌に感染していた患者の数

罹患率 = (新規感染症患者数) ÷ ((総入院患者数) - (対象期間の一番初めの月の継続感染症患者数)) × 1000


感染率 = (感染症患者数) ÷ (総入院患者数) × 1000

全体の罹患率 = (集計対象医療機関の新規感染症患者数合計) ÷ ((集計対象医療機関の総入院患者数合計) - (集計対象医療機関の対象期間の一番初めの月の継続感染症患者数合計)) × 1000

全体の感染率 = (集計対象医療機関の感染症患者数合計) ÷ (集計対象医療機関の総入院患者数合計) × 1000

3. 耐性菌新規感染症・感染症患者の性別内訳


新規感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
男	45 (66.2%)	43 (67.2%)	0 (-)	2 (50.0%)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)
女	23 (33.8%)	21 (32.8%)	0 (-)	2 (50.0%)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)
合計	68	64	0	4	0	0	0	0

3. 耐性菌新規感染症・感染症患者の性別内訳


感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
男	45 (66.2%)	43 (67.2%)	0 (-)	2 (50.0%)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)
女	23 (33.8%)	21 (32.8%)	0 (-)	2 (50.0%)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)
合計	68	64	0	4	0	0	0	0

4. 耐性菌新規感染症・感染症患者の年齢別内訳


新規感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
1歳未満	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
1歳以上5歳未満	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
5歳以上10歳未満	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
10歳代	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
20歳代	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
30歳代	2(2.9%)	2(3.1%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
40歳代	2(2.9%)	2(3.1%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
50歳代	4(5.9%)	4(6.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
60歳代	8(11.8%)	8(12.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
70歳代	21(30.9%)	21(32.8%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
80歳代	25(36.8%)	21(32.8%)	0(-)	4(100.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
90歳以上	6(8.8%)	6(9.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	68	64	0	4	0	0	0	0

4. 耐性菌新規感染症・感染症患者の年齢別内訳


感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
1歳未満	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
1歳以上5歳未満	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
5歳以上10歳未満	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
10歳代	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
20歳代	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
30歳代	2(2.9%)	2(3.1%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
40歳代	2(2.9%)	2(3.1%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
50歳代	4(5.9%)	4(6.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
60歳代	8(11.8%)	8(12.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
70歳代	21(30.9%)	21(32.8%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
80歳代	25(36.8%)	21(32.8%)	0(-)	4(100.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
90歳以上	6(8.8%)	6(9.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	68	64	0	4	0	0	0	0

5. 耐性菌新規感染症・感染症患者の検体*内訳

新規感染症患者




分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
呼吸器系	13(19.1%)	13(20.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
尿検体	5(7.4%)	4(6.3%)	0(-)	1(25.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
便検体	2(2.9%)	2(3.1%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
血液検体	16(23.5%)	15(23.4%)	0(-)	1(25.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
髄液検体	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	32(47.1%)	30(46.9%)	0(-)	2(50.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	68	64	0	4	0	0	0	0

*検体区分については巻末の資料1を参照

5. 耐性菌新規感染症・感染症患者の検体*内訳

感染症患者




分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
呼吸器系	13(19.1%)	13(20.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
尿検体	5(7.4%)	4(6.3%)	0(-)	1(25.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
便検体	2(2.9%)	2(3.1%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
血液検体	16(23.5%)	15(23.4%)	0(-)	1(25.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
髄液検体	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	32(47.1%)	30(46.9%)	0(-)	2(50.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	68	64	0	4	0	0	0	0

*検体区分については巻末の資料1を参照

6. 耐性菌新規感染症・感染症患者の感染症名別内訳


新規感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
尿路	5(7.4%)	4(6.3%)	0(-)	1(25.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
肺炎	14(20.6%)	14(21.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
肺炎以外	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
消化器系	2(2.9%)	2(3.1%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
中枢神経系	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
皮膚・軟部	18(26.5%)	18(28.1%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
手術創	12(17.6%)	10(15.6%)	0(-)	2(50.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
菌血症	14(20.6%)	13(20.3%)	0(-)	1(25.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	3(4.4%)	3(4.7%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	68	64	0	4	0	0	0	0

6. 耐性菌新規感染症・感染症患者の感染症名別内訳


感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
尿路	5(7.4%)	4(6.3%)	0(-)	1(25.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
肺炎	14(20.6%)	14(21.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
肺炎以外	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
消化器系	2(2.9%)	2(3.1%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
中枢神経系	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
皮膚・軟部	18(26.5%)	18(28.1%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
手術創	12(17.6%)	10(15.6%)	0(-)	2(50.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
菌血症	14(20.6%)	13(20.3%)	0(-)	1(25.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	3(4.4%)	3(4.7%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	68	64	0	4	0	0	0	0

7. 耐性菌新規感染症・感染症患者の診療科*別内訳

新規感染症患者




分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
内科系	25(36.8%)	23(35.9%)	0(-)	2(50.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
外科系	36(52.9%)	34(53.1%)	0(-)	2(50.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
小児科系	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	7(10.3%)	7(10.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	68	64	0	4	0	0	0	0

*診療科の内訳については巻末の資料2を参照

7. 耐性菌新規感染症・感染症患者の診療科*別内訳

感染症患者



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
内科系	25(36.8%)	23(35.9%)	0(-)	2(50.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
外科系	36(52.9%)	34(53.1%)	0(-)	2(50.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
小児科系	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	7(10.3%)	7(10.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	68	64	0	4	0	0	0	0

*診療科の内訳については巻末の資料2を参照

・資料 1

呼吸器系検体	喀出痰
	気管内採痰
	気管支洗浄液
	咽頭粘液
	鼻腔内
	口腔内
	生検材料(肺)
	胸水
	その他(呼吸器)
尿検体	自然排尿
	採尿カテーテル
	留置カテーテル
	カテーテル尿
便検体	糞便
血液検体	静脈血
	動脈血
髄液検体	髄液
その他	尿道分泌液
	膣分泌液
	胃・十二指腸液
	胆汁
	生検材料(消化管)
	腹水
	関節液
	その他

・資料 2

内科系	内科
	循環器内科
	神経内科
	呼吸器内科
	消化器内科
	胃腸科
	内分泌・代謝内科
	腎臓内科
	糖尿病内科
	アレルギー・膠原病内科
	膠原病内科
	アレルギー内科
	リウマチ内科
	血液内科
	感染症内科
	老人内科
	心療内科
外科系	外科
	消化器外科
	肛門科
	肝胆脾外科
	心血管外科
	内分泌外科
	呼吸器外科
	小児外科
	小児循環器外科
	小児消化器外科
	産婦人科
	産科
	婦人科
	整形外科
	美容外科
	眼科
	耳鼻咽喉科
	気管食道科
	泌尿器科
	皮膚・泌尿器科
小児科系	皮膚科
	脳神経外科
	形成外科
	歯科口腔外科
	歯科
	小児歯科
	矯正歯科
	口腔外科
	手術部
	移植・人工臓器科
	小児科
	新生児科
	新生児集中治療部(NICU)
	周産期センター
その他	性病科
	神経科
	精神科
	放射線科
	総合診療部
	救急部
	救急・集中治療部
	集中治療部(ICU)
	冠動脈疾患集中治療部(CCU)
	内視鏡科
	透析科
	理学療法・リハビリテーション科
	理学療法科
	リハビリテーション科
	麻酔科
	その他

精度管理について

四半期報ではVRSAに対してのみ、報告医療機関にその真偽を確認し誤報告を除外している。

厚生労働省 院内感染対策サーベイランス 薬剤耐性菌 判定基準 (Ver.3.2)

菌名	概要	菌名コード	微量液体希釈法の基準	ディスク拡散法の基準
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌 (MRSA)	MPIPC または CFX が “R” の <i>Staphylococcus aureus</i> または選択培地で MRSA と確認された菌	1301、1303	MPIPC $\geq$ 4 μ g/mL* または CFX $\geq$ 8 μ g/mL*	MPIPC $\leq$ 10mm† CFX $\leq$ 21mm*
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌 (VRSA)	VCM が微量液体希釈法で “R” の <i>Staphylococcus aureus</i>	1301、1303-1306	VCM $\geq$ 16 μ g/mL*	
バンコマイシン耐性腸球菌 (VRE)	下記のいずれかの条件を満たす <i>Enterococcus</i> spp. ・ VCM が微量液体希釈法で耐性† ・ VCM がディスク拡散法で “R” ・ 選択培地で VRE と確認された菌 注) 種の同定が行われていない <i>Enterococcus</i> sp.は除く	1201、1202、1205、1206、1209、1210、1213-1217	VCM $\geq$ 16 μ g/mL†	VCM $\leq$ 14mm*
ペニシリン耐性肺炎球菌 (PRSP)	PCG が微量液体希釈法で耐性†、または MPIPC がディスク拡散法で “S 以外” の <i>Streptococcus pneumoniae</i>	1131	PCG $\geq$ 0.125 μ g/mL†	MPIPC $\leq$ 19mm†
多剤耐性緑膿菌 (MDRP)	下記のすべての条件を満たす <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ・ カルバペネム系 (IPM、MEPM のいずれか) が微量液体希釈法で耐性†、またはディスク拡散法で “R” ・ アミノグリコシド系は AMK が微量液体希釈法で耐性†、またはディスク拡散法で “R” ・ フルオロキノロン系が “R” (NFLX、OFLX、LVFX、LFLX、CPFX のいずれか)	4001	IPM・MEPM $\geq$ 16 μ g/mL† AMK $\geq$ 32 μ g/mL† NFLX $\geq$ 16 μ g/mL* OFLX・LVFX・LFLX $\geq$ 8mL* CPFX $\geq$ 4 μ g/mL*†	IPM・MEPM $\leq$ 13mm† AMK $\leq$ 14mm* NFLX・OFLX $\leq$ 12mm* LVFX $\leq$ 13mm* LFLX $\leq$ 18mm* CPFX $\leq$ 15mm*†
多剤耐性アシネトバクター属 (MDRA)	下記のすべての条件を満たす <i>Acinetobacter</i> spp. ・ カルバペネム系が “R” (IPM、MEPM のいずれか) ・ アミノグリコシド系は AMK が微量液体希釈法で耐性† またはディスク拡散法で “R” ・ フルオロキノロン系が “R” (LVFX、CPFX のいずれか)	4400-4403	IPM・MEPM $\geq$ 16 μ g/mL† AMK $\geq$ 32 μ g/mL† LVFX $\geq$ 8 μ g/mL* CPFX $\geq$ 4 μ g/mL*†	IPM・MEPM $\leq$ 13mm† AMK $\leq$ 14mm† LVFX $\leq$ 13mm* CPFX $\leq$ 15mm*†
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌 (CRE)	下記のいずれかの条件を満たす腸内細菌科細菌 ・ MEPM が耐性† ・ IPM が耐性†、かつ CMZ が “R”	2000-2691、3150-3151	MEPM $\geq$ 2 μ g/mL† IPM $\geq$ 2 μ g/mL† かつ CMZ $\geq$ 64 μ g/mL*†	MEPM $\leq$ 22mm† IPM $\leq$ 22mm† かつ CMZ $\leq$ 12mm*†

* S,I,R の判定は CLSI2012(M100-S22)に準拠

† 感染症発生动向調査の基準に準拠