

表5.17 性・年齢別

死亡数, 死亡率(人口10万対), 割合(%)³⁾ 総数

Table with 10 columns for ranks (第1位 to 第10位) and rows for age groups (総数, 0歳, 1~4, 5~9, 10~14, 15~19, 20~24, 25~29, 30~34, 35~39, 40~44, 45~49, 50~54, 55~59, 60~64, 65~69, 70~74, 75~79, 80~84, 85~89, 90~(再掲), 65~, 75~, 80~). Each cell contains cause of death, death count, and death rate.

注: 1) [1] 死因順位の並び方については巻末の参考表6(1)を参照されたい。 [2] 乳児(0歳)の死因については乳児死因単分類を使用、死因順位の並び方については巻末の参考表6(2)を参照されたい。 [3] 死因名は次のように略称した。 周産期に特異的な呼吸障害等 ← 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害 胎児及び新生児の出血性障害等 ← 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害 妊娠期間等に関連する障害 ← 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害 血管性等の痲呆 ← 血管性及び詳細不明の痲呆

にみた死因順位¹⁾

総数

平成7年

Table with 10 columns for ranks (第6位 to 第10位) and rows for causes of death (老衰, 心疾患, 乳幼児突然死候群, 肺炎, 喘息, 肝疾患, 慢性閉塞性肺疾患, 腎不全, 不慮の事故, 不慮の事故). Each cell contains cause of death, death count, and death rate.

[4] 死因順位は死亡数の多いものから定めた。死亡数が同数の場合は、同一順位に死因名を列記し、次位を空欄とした。 2) 0歳の死亡率は出生10万対の率である。 3) 割合(%)は、それぞれの年齢別死亡数を100とした場合の割合である。

表5.17 性・年齢別

死亡数, 死亡率(人口10万対), 割合(%)³⁾ 男

Table with 10 columns for ranks (第1位 to 第10位) and rows for age groups (総数, 0歳, 1~4, 5~9, 10~14, 15~19, 20~24, 25~29, 30~34, 35~39, 40~44, 45~49, 50~54, 55~59, 60~64, 65~69, 70~74, 75~79, 80~84, 85~89, 90~(再掲), 65~, 75~, 80~). Each cell contains cause of death, number of deaths, and mortality rate.

注: 1)~3) 224ページの同番号の注を参照されたい。

にみた死因順位¹⁾(つづき)

男

平成7年

Table with 10 columns for ranks (第6位 to 第10位) and rows for causes of death (自殺, 周産期に特異的な感染症, 乳幼児突然死候群, 肺炎, 喘息, 肝疾患, 慢性閉塞性肺疾患, 不慮の事故, 慢性閉塞性肺疾患, 不慮の事故). Each cell contains cause of death, number of deaths, and mortality rate.

表5.17 性・年齢別

死亡数, 死亡率(人口10万対), 割合(%)³⁾ 女

Table with 11 columns: 年齢, 第1位, 第2位, 第3位, 第4位, 第5位. Each column contains cause of death, number of deaths, and death rate.

注: 1)~3) 224ページの同番号の注を参照されたい。

にみた死因順位¹⁾(つづき)

女

平成7年

Table with 10 columns: 第6位, 第7位, 第8位, 第9位, 第10位. Each column contains cause of death, number of deaths, and death rate.