表5.16　性・年齢別にみた死因（簡単分類）別死亡率（人口10万対）

Table 5.16 Death rates (per 100,000 population) by sex, age and causes of death (the 117 rubrics list of mortality for Japan) : Japan, 1990

平成２年

簡単分類番号 117 rubrics[a] list code	死因・性 Causes of death and sex		総数 Total	0歳[1] Years	1	2	3	4	1～4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～	65～	80～	85～
	総数 Total	総数T.	668.4	459.7	78.6	42.5	34.4	26.9	45.0	123.4	18.5	14.6	43.7	55.0	53.6	65.3	95.6	144.2	241.7	375.0	616.3	931.3	1 373.7	2 357.4	4 230.4	7 618.5	13 341.6	23 067.3	4 066.6	10 745.3	15 849.0
		男 M.	736.5	498.1	85.1	49.6	43.0	33.6	52.2	136.6	22.2	17.4	62.7	78.1	72.3	83.9	121.1	183.2	317.9	505.2	870.7	1 321.5	1 948.7	3 323.7	5 793.4	10 010.3	16 535.9	26 796.0	5 002.9	13 068.5	18 874.6
		女 F.	602.8	419.3	71.7	35.0	25.4	19.8	37.4	109.5	14.7	11.6	23.6	31.0	34.5	46.4	69.8	104.9	166.2	247.6	371.7	570.8	939.7	1 689.8	3 201.6	6 211.4	11 759.2	21 606.0	3 437.1	9 490.6	14 435.3
1	コレラ	総数T.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	腸チフス	総数T.	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	0.0	0.0	–
		男 M.	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	0.0	0.1	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	細菌性赤痢及びアメーバ症	総数T.	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	0.0	–	–	0.0	–	0.1	–	0.0	0.0	0.1
		男 M.	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	0.2	–	0.0	0.1	0.1
4	腸炎及びその他の下痢性疾患	総数T.	0.6	1.2	0.4	0.2	0.2	0.1	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.4	0.6	1.1	3.1	7.7	17.9	55.6	4.2	15.3	27.6
		男 M.	0.5	1.1	0.5	0.2	0.1	0.1	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.6	0.8	1.1	2.5	8.0	18.5	71.2	3.8	15.7	30.5
		女 F.	0.7	1.3	0.3	0.3	0.3	–	0.2	0.4	0.1	–	–	–	–	–	–	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5	1.1	3.5	7.5	17.6	49.6	4.4	15.0	26.3
5	呼吸系の結核	総数T.	2.8	–	–	–	–	–	–	–	0.0	–	0.0	0.1	0.1	0.1	0.3	0.5	1.2	2.1	3.0	5.2	8.8	13.3	19.9	30.1	32.4	35.9	16.7	31.3	33.3
		男 M.	4.4	–	–	–	–	–	–	–	0.0	–	–	0.1	0.1	0.2	0.4	0.8	2.0	3.4	5.1	8.5	15.6	24.6	39.6	60.6	64.5	73.7	30.9	62.7	66.6
		女 F.	1.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.4	0.7	1.1	2.2	3.7	5.5	6.9	12.1	16.5	21.2	7.1	14.4	17.8
6	その他の結核（後遺症を含まない）	総数T.	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.5	0.5	1.3	1.7	1.4	2.8	0.9	1.7	1.8
		男 M.	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.6	0.8	1.7	2.5	2.2	2.5	1.2	2.4	2.2
		女 F.	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.4	0.4	1.0	1.2	1.1	2.9	0.7	1.4	1.6
7	らい	総数T.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	ジフテリア	総数T.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳	総数T.	0.0	0.2	–	–	0.1	–	0.0	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	0.0	0.2	–	–	0.1	–	0.0	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	0.0	0.3	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	猩紅熱	総数T.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	髄膜炎菌感染	総数T.	0.0	0.1	0.1	–	–	–	0.0	0.0	0.0	–	–	–	–	–	–	0.0	–	–	0.0	–	–	–	0.0	–	–	–	0.0	–	–
		男 M.	0.0	0.2	–	–	–	–	–	0.0	0.0	–	–	–	–	–	–	0.0	–	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	0.0	–	0.2	–	–	–	0.0	0.0	–	–	–	–	–	–	–	0.0	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	0.0	–	–
12	破傷風（新生児破傷風を除く）	総数T.	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	–	–	–	–	–	0.0	0.0	0.0	–	0.0	0.1	0.1	0.2	0.7	0.3	0.1	0.4	0.6
		男 M.	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	0.1	0.0	–	0.0	0.1	–	0.4	0.7	–	0.1	0.5	0.6
		女 F.	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	–	–	–	–	–	–	0.0	–	–	–	0.1	0.2	0.1	0.7	0.5	0.1	0.3	0.7
13	敗血症（新生児敗血症を除く）	総数T.	2.8	6.6	1.0	0.4	0.2	0.1	0.4	1.6	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.4	0.7	1.3	1.9	3.3	6.0	11.8	21.4	35.4	56.0	71.2	18.3	44.7	59.9
		男 M.	2.7	7.3	1.4	0.5	0.4	0.1	0.6	1.9	0.1	–	0.1	0.2	0.1	0.3	0.3	0.5	0.8	1.6	2.4	4.2	7.1	13.7	26.7	38.5	53.6	68.7	19.3	44.9	57.1
		女 F.	3.0	5.9	0.7	0.3	–	–	0.2	1.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.6	0.9	1.5	2.4	5.2	10.5	17.9	33.6	57.1	72.2	17.6	44.6	61.2
14	急性灰白髄炎	総数T.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	痘瘡	総数T.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	麻疹	総数T.	0.0	0.6	1.3	0.5	0.2	0.1	0.5	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	–	0.0	0.0	–	–	0.0	–	–	–	0.0	–	–	–	0.0	–	–
		男 M.	0.0	0.5	1.1	0.6	0.3	0.1	0.5	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	0.0	–	–
		女 F.	0.0	0.7	1.5	0.3	0.2	0.2	0.5	0.5	0.1	0.0	0.0	–	0.0	–	0.0	0.0	–	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	日本脳炎	総数T.	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	–	–	0.0	0.0	0.0	–	0.1	0.3	0.0	0.1	0.2
		男 M.	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	–	0.0	0.0	0.0	–	–	0.0	–	–	–	–	1.2	0.0	0.1	0.3
		女 F.	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	–	–	–	–	–	–	0.0	0.1	–	0.2	–	0.0	0.1	0.1
18	ウイルス肝炎B	総数T.	0.2	–	–	–	–	–	–	–	0.0	–	–	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.5	0.6	0.6	0.6	0.9	0.8	0.8	0.5	2.4	0.8	0.9	1.0
		男 M.	0.3	–	–	–	–	–	–	–	0.0	–	–	–	0.1	0.1	0.2	0.2	0.4	0.8	0.8	0.7	0.8	1.2	1.1	1.2	1.1	1.2	1.0	1.2	1.1
		女 F.	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	0.1	–	–	0.1	0.1	0.1	0.4	0.5	0.4	0.7	0.6	0.6	0.2	2.9	0.6	0.7	0.9

注：1）　0歳は出生10万対の死亡率である。

Note : a)　117 rubrics list code see page 430

表5.16　性・年齢別にみた死因（簡単分類）別死亡率（人口10万対）（つづき）

Table 5.16 Death rates (per 100,000 population) by sex, age and causes of death (the 117 rubrics list of mortality for Japan) : Japan, 1990－con.

平成２年

簡単分類番号 117 rubrics[a] list code	死因・性 Causes of death and sex		総数 Total	0歳[1] Years	1	2	3	4	1～4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～	65～	80～	85～
19	その他のウイルス肝炎	総数T.	0.7	1.5	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.4	0.1	0.0	0.1	0.3	0.3	0.4	0.4	0.6	0.8	0.8	1.3	1.6	1.8	1.7	3.3	2.9	2.6	4.1	2.3	3.0	3.0
		男 M.	0.8	1.6	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.5	0.1	0.0	0.1	0.2	0.4	0.4	0.5	1.0	0.9	1.9	2.0	2.4	2.4	3.7	3.1	4.7	6.1	2.9	3.8	5.0
		女 F.	0.6	1.3	0.3	－	0.2	0.2	0.2	0.4	0.0	0.1	0.1	0.3	0.2	0.3	0.4	0.6	0.5	0.6	0.8	1.2	1.4	1.3	3.0	2.9	1.6	3.4	1.9	2.6	2.1
20	発疹チフス及びその他のリケッチア症	総数T.	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	0.0	－	－
		男 M.	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0	0.0	－	－	－	－	－	0.0	－	－
		女 F.	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
21	マラリア	総数T.	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男 M.	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
22	梅毒	総数T.	0.0	0.2	－	－	－	－	－	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	－	0.1	0.1	0.2
		男 M.	0.0	0.3	－	－	－	－	－	0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.4	0.2	0.3	0.4	－	0.3	0.3	0.3
		女 F.	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.0	－	0.1	－	0.2	－	0.0	0.1	0.1
23	カンジダ症（新生児カンジダ症を除く）	総数T.	0.1	0.1	－	－	－	－	－	0.0	－	－	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.3	0.4	0.4	1.0	1.4	2.1	0.5	1.2	1.6
		男 M.	0.1	0.2	－	－	－	－	－	0.0	－	－	－	－	－	－	－	0.0	0.0	－	0.0	0.0	0.4	0.3	0.7	1.0	2.9	2.5	0.6	1.6	2.8
		女 F.	0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0	0.1	－	0.2	0.4	0.2	1.0	0.7	1.9	0.4	1.0	1.0
24	日本住血吸虫症	総数T.	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0	－	－	0.0	0.0	0.1	－	－	0.2	0.3	0.0	0.1	0.3
		男 M.	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0	－	－	0.0	0.0	－	－	－	0.7	1.2	0.1	0.3	0.8
		女 F.	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0	0.1	－	－	－	－	0.0	－	－
25	フィラリア症	総数T.	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1	0.1	－	0.0	0.1	0.1
		男 M.	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1	－	－	0.0	0.1	－
		女 F.	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.2	－	0.0	0.1	0.1
26	その他の感染症及び寄生虫症	総数T.	2.2	2.0	0.4	0.6	0.3	0.1	0.4	0.7	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.6	0.9	2.3	4.2	7.4	10.6	16.0	20.5	25.2	23.8	12.9	22.1	24.9
		男 M.	2.8	2.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6	0.3	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.8	1.1	2.8	5.7	11.9	17.9	24.4	34.0	40.6	28.2	20.0	35.3	37.8
		女 F.	1.6	2.0	0.7	1.0	0.3	－	0.5	0.8	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.4	0.8	1.9	2.8	3.9	5.6	10.4	12.5	17.6	22.1	8.1	15.0	18.8
28－37	悪性新生物	総数T.	177.2	4.1	3.2	4.2	2.8	3.1	3.3	3.5	3.0	3.3	4.2	5.3	7.7	14.4	29.2	49.4	89.3	149.9	272.2	415.7	563.2	802.1	1 098.1	1 437.4	1 679.8	1 535.3	922.0	1 515.4	1 642.6
		男 M.	216.4	3.0	3.3	4.7	3.2	4.6	3.9	3.8	3.3	3.8	5.4	6.1	8.1	12.4	26.4	49.2	98.3	181.9	372.5	596.8	828.6	1 200.1	1 640.4	2 149.1	2 482.4	2 311.6	1 334.2	2 250.7	2 443.5
		女 F.	139.3	5.2	3.1	3.6	2.3	1.7	2.7	3.1	2.8	2.8	3.0	4.5	7.2	16.4	32.0	49.7	80.4	118.5	175.7	248.5	362.9	527.1	741.2	1 018.8	1 282.3	1 231.1	644.8	1 118.3	1 268.4
28	食道	総数T.	5.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1	0.3	0.7	2.6	5.9	11.6	17.0	21.8	28.6	34.9	38.1	44.4	35.6	29.7	39.6	42.1
		男 M.	10.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1	0.4	1.2	4.5	10.7	21.3	32.2	44.4	57.8	66.9	76.6	71.4	66.3	57.6	74.4	70.2
		女 F.	2.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1	0.2	0.2	0.6	1.3	2.3	2.9	4.8	8.4	13.8	15.3	31.1	23.6	11.0	20.8	29.0
29	胃	総数T.	38.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1	0.5	1.5	3.6	7.9	12.4	20.2	33.5	54.1	86.8	119.3	169.8	243.5	333.9	410.5	360.8	204.8	358.1	397.7
		男 M.	49.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.2	0.4	1.2	2.6	7.0	12.1	24.6	44.4	79.1	131.8	186.4	273.5	385.5	517.5	625.9	563.5	311.9	550.0	611.7
		女 F.	28.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0	0.6	1.9	4.7	8.7	12.8	15.8	23.0	30.0	45.2	68.6	98.1	150.0	225.9	303.8	281.4	132.8	254.5	297.7
30	直腸，直腸Ｓ状結腸移行部及び肛門	総数T.	7.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.1	0.6	1.2	2.2	5.1	8.4	12.7	17.9	22.8	30.1	41.7	60.9	75.2	81.9	37.3	67.0	76.9
		男 M.	9.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.1	0.6	1.4	2.9	5.9	10.4	17.3	25.1	33.5	44.5	60.2	93.0	104.7	131.4	53.1	99.1	110.8
		女 F.	5.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.5	1.0	1.6	4.3	6.5	8.2	11.3	14.7	20.2	29.5	42.1	60.5	62.5	26.6	49.6	61.1
31	肝	総数T.	20.7	0.2	0.4	0.2	0.1	－	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.5	1.7	4.2	8.6	20.2	53.8	69.6	74.2	85.3	96.5	113.4	128.5	107.8	90.1	117.1	123.2
		男 M.	30.5	0.2	0.6	0.2	－	－	0.2	0.2	－	0.0	0.1	0.1	0.2	0.7	2.8	7.4	15.6	35.4	95.7	117.6	121.6	133.5	147.6	171.0	173.2	168.2	138.5	171.4	172.1
		女 F.	11.1	0.3	0.2	0.2	0.2	－	0.1	0.2	0.0	0.0	－	0.1	0.2	0.4	0.6	1.0	2.3	5.3	13.5	25.2	38.4	51.9	62.8	79.6	106.3	84.2	57.5	87.8	100.3
32	膵	総数T.	10.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.0	0.4	1.2	2.0	4.5	8.0	14.0	24.2	36.8	54.1	77.7	94.7	106.5	107.1	61.9	99.3	106.7
		男 M.	12.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.3	1.3	2.8	6.3	11.0	18.5	33.0	49.0	71.5	99.5	115.1	122.5	139.9	77.1	119.0	126.5
		女 F.	9.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.1	0.4	1.0	1.2	2.8	5.0	9.7	16.1	27.5	42.2	63.3	82.7	98.6	94.3	51.7	88.6	97.4
33	気管，気管支及び肺	総数T.	29.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.3	0.9	2.6	4.9	9.3	16.6	34.1	67.4	106.2	163.7	226.7	266.2	279.8	206.7	176.7	264.2	260.9
		男 M.	44.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.4	1.0	3.3	6.8	12.9	23.0	53.4	113.0	190.2	300.3	419.7	515.0	531.3	384.2	320.1	509.1	497.8
		女 F.	15.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0	－	0.2	0.7	2.0	3.1	5.7	10.4	15.7	25.3	42.7	69.3	99.6	119.8	155.1	137.1	80.3	132.0	150.2
34	乳房	総数T.	4.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0	0.4	1.3	3.2	5.4	8.0	9.7	11.5	10.5	11.3	12.0	11.4	13.5	15.7	16.9	12.1	14.5	16.0
		男 M.	0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1	－	0.0	0.1	0.2	0.4	0.5	0.9	0.7	－	0.4	0.8	0.6
		女 F.	9.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0	0.8	2.6	6.4	10.8	15.8	19.2	22.5	20.2	19.6	20.1	18.5	20.9	23.2	23.6	20.0	21.8	23.3
35	子宮	女[2] F.	7.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.3	0.5	1.0	2.4	3.2	5.4	7.9	12.3	14.3	20.0	25.2	34.1	47.2	51.7	52.0	30.5	49.0	51.8
36	白血病	総数T.	4.6	1.6	1.4	1.7	1.2	1.0	1.3	1.4	1.4	1.6	1.7	1.8	1.7	1.9	2.8	3.0	4.0	5.1	6.9	9.1	10.3	13.7	17.0	23.5	20.5	15.6	14.8	21.9	19.2
		男 M.	5.4	0.8	1.4	1.7	1.3	1.7	1.5	1.4	1.4	2.0	2.2	2.3	2.1	2.2	3.1	3.5	4.3	6.0	8.3	11.9	13.2	18.2	24.5	33.0	31.5	30.7	20.1	32.4	31.3
		女 F.	3.9	2.5	1.3	1.7	1.1	0.3	1.1	1.4	1.4	1.2	1.2	1.2	1.3	1.6	2.5	2.6	3.7	4.3	5.6	6.5	8.2	10.6	12.0	17.9	15.1	9.6	11.3	16.2	13.6

注：1)　0歳は出生10万対の死亡率である。
　　2)　女子人口10万対の死亡率である。

表5.16 性・年齢別にみた死因

Table 5.16 Death rates (per 100,000 population) by sex, age and causes of death (the 117 rubrics list of mortality for Japan) : Japan, 1990－con.

（簡単分類）別死亡率（人口10万対）（つづき）

平成２年

簡単分類番号 117 rubrics[a] list code	死因・性 Causes of death and sex		総数 Total	0歳[1] Years	1	2	3	4	1～4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～	65～	80～	85～
37	その他	総数T.	50.6	2.2	1.4	2.3	1.5	2.1	1.8	1.9	1.6	1.6	2.3	2.7	3.2	4.7	7.3	12.9	24.0	38.3	67.2	105.9	149.2	230.0	328.4	463.5	564.2	565.5	276.3	501.9	564.5
		男 M.	54.9	2.1	1.2	2.9	1.9	2.8	2.2	2.2	1.9	1.8	2.9	3.1	4.0	4.9	7.2	12.7	24.1	41.0	78.8	132.1	190.0	300.5	436.0	627.0	820.9	827.4	355.4	694.4	822.4
		女 F.	46.5	2.4	1.6	1.7	1.1	1.4	1.4	1.6	1.3	1.5	1.7	2.2	2.3	4.5	7.4	13.2	23.9	35.6	56.0	81.7	118.4	181.2	257.6	367.3	437.0	462.8	223.1	397.9	444.0
38	良性及び性質不詳の新生物	総数T.	5.8	1.6	0.9	0.4	0.4	0.7	0.6	0.8	0.9	0.6	0.7	0.6	0.7	0.9	1.3	1.7	2.6	4.4	6.4	9.7	14.2	21.7	36.5	57.7	78.8	107.1	31.4	68.5	86.1
		男 M.	6.5	1.3	0.5	0.5	0.7	0.6	0.6	0.7	0.9	0.7	0.8	0.8	0.8	1.0	1.6	1.9	2.9	5.5	8.3	13.6	20.1	30.5	49.3	75.0	104.7	147.3	40.5	88.6	114.4
		女 F.	5.1	1.8	1.3	0.3	－	0.8	0.6	0.8	0.9	0.5	0.6	0.4	0.7	0.7	1.1	1.5	2.4	3.4	4.6	6.1	9.8	15.7	28.0	47.4	65.9	91.4	25.3	57.6	72.8
39	糖尿病	総数T.	7.7	－	－	0.1	－	－	0.0	0.0	－	－	0.1	0.1	0.4	0.4	0.8	1.3	2.3	4.4	8.5	12.7	20.1	35.7	59.3	91.9	110.9	113.4	47.8	99.4	111.6
		男 M.	7.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.2	0.2	0.5	0.5	1.0	1.8	3.1	6.6	12.5	16.4	23.1	37.1	63.0	92.4	111.6	144.9	48.4	101.7	119.2
		女 F.	8.0	－	－	0.2	－	－	0.0	0.0	－	－	0.0	0.1	0.2	0.3	0.6	0.9	1.4	2.2	4.7	9.3	17.8	34.7	56.8	91.7	110.6	101.0	47.4	98.2	108.0
40	栄養欠乏症	総数T.	0.5	0.3	－	－	0.1	－	0.0	0.1	－	－	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.5	0.5	0.7	1.0	2.8	4.5	11.9	22.1	2.7	8.3	14.5
		男 M.	0.5	0.3	－	－	－	－	－	0.1	－	－	－	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.3	0.4	0.9	0.7	0.9	2.0	3.9	5.0	13.8	22.1	3.1	8.7	15.7
		女 F.	0.4	0.3	－	－	0.2	－	0.0	0.1	－	－	0.0	－	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.6	0.4	2.0	4.2	11.0	22.1	2.5	8.1	14.0
41	貧血	総数T.	1.3	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.5	0.8	1.5	2.6	4.8	7.7	15.8	27.1	50.8	8.1	22.4	33.2
		男 M.	1.2	0.6	0.2	0.2	－	－	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1	0.3	0.1	0.2	0.3	0.4	0.6	1.0	1.6	3.1	5.8	8.5	16.1	27.9	43.0	8.0	21.3	31.3
		女 F.	1.5	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.0	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.5	0.7	1.3	2.3	4.0	7.1	15.7	26.8	53.9	8.2	23.0	34.1
42	精神障害	総数T.	2.5	－	0.1	－	0.1	－	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.5	0.6	1.0	1.3	1.5	1.8	2.4	5.0	13.6	34.4	81.0	153.1	16.6	59.2	99.6
		男 M.	2.1	－	－	－	0.1	－	0.0	0.0	－	－	0.0	0.2	0.1	0.4	0.6	0.9	1.5	2.0	2.2	2.8	3.2	5.7	13.2	32.7	65.6	132.6	13.9	49.3	80.9
		女 F.	2.9	－	0.2	－	0.2	－	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.3	0.3	0.4	0.6	0.7	0.8	1.8	4.4	13.8	35.4	88.7	161.2	18.4	64.5	108.4
43	髄膜炎	総数T.	0.4	2.0	1.1	0.2	－	0.1	0.3	0.7	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.4	0.7	0.5	1.1	1.4	1.7	2.7	2.4	1.7	1.6	2.5	2.2
		男 M.	0.4	2.2	1.2	0.3	－	－	0.4	0.7	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.5	0.8	0.7	1.6	1.7	1.8	2.9	3.3	2.5	1.9	3.0	3.1
		女 F.	0.3	1.8	1.0	0.2	－	0.2	0.3	0.6	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.3	0.5	0.3	0.7	1.2	1.7	2.5	2.0	1.4	1.4	2.2	1.8
44	中枢神経系の非炎症性疾患	総数T.	4.1	5.4	4.0	2.6	3.0	1.8	2.8	3.3	1.1	0.5	0.6	0.7	0.9	0.6	0.8	1.1	1.6	2.4	4.3	6.6	11.9	19.3	27.4	34.4	37.8	33.9	21.6	35.3	36.8
		男 M.	4.4	5.4	4.8	2.9	3.9	1.6	3.3	3.7	1.0	0.6	0.6	0.8	1.1	0.8	0.9	1.4	1.7	2.9	5.4	7.4	13.9	23.7	37.5	43.6	51.5	43.0	26.7	45.7	49.5
		女 F.	3.9	5.4	3.1	2.4	2.0	2.1	2.4	3.0	1.1	0.5	0.6	0.5	0.8	0.4	0.6	0.8	1.4	1.9	3.2	5.9	10.4	16.3	20.7	29.0	31.1	30.3	18.2	29.8	30.9
45	急性リウマチ熱	総数T.	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0	－	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.4	1.0	0.1	0.3	0.5
		男 M.	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0	－	0.0	－	0.2	0.2	－	0.4	－	0.1	0.1	0.3
		女 F.	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0	－	0.0	0.1	0.2	0.1	0.2	0.4	1.4	0.2	0.4	0.7
46	慢性リウマチ性心疾患	総数T.	1.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.4	0.6	1.7	2.0	4.0	5.2	7.0	9.4	14.4	18.3	6.4	11.7	15.4
		男 M.	0.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0	－	0.0	0.0	0.2	0.2	0.3	0.4	1.3	1.8	2.6	4.2	5.6	7.7	9.1	11.0	4.6	8.3	9.5
		女 F.	1.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.5	0.7	2.2	2.3	5.0	5.9	7.9	10.4	17.1	21.2	7.7	13.5	18.2
48－49	高血圧性疾患	総数T.	7.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0	－	0.0	0.1	0.2	0.2	0.7	1.0	2.2	3.8	7.7	17.0	45.4	115.4	286.0	593.8	58.0	210.3	365.4
		男 M.	5.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0	－	0.0	0.1	0.2	0.3	0.9	1.4	2.6	4.9	9.0	19.4	48.6	116.6	266.4	497.2	50.4	186.4	319.0
		女 F.	9.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1	0.1	0.2	0.5	0.6	1.8	2.8	6.8	15.4	43.2	114.6	295.7	631.7	63.1	223.2	387.0
48	高血圧性心疾患	総数T.	5.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.2	0.2	0.5	0.8	1.8	3.3	6.5	14.3	35.7	88.3	210.5	413.0	43.8	154.5	262.7
		男 M.	4.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.2	0.2	0.6	1.2	2.1	4.2	7.3	16.3	38.0	89.0	192.5	353.5	38.3	137.4	229.2
		女 F.	7.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1	0.1	0.1	0.3	0.5	1.6	2.4	5.9	13.0	34.2	87.8	219.4	436.4	47.6	163.8	278.4
49	その他の高血圧性疾患	総数T.	1.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0	－	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.3	0.5	1.2	2.7	9.7	27.1	75.5	180.8	14.2	55.8	102.7
		男 M.	1.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0	－	0.0	0.0	－	0.1	0.3	0.3	0.5	0.7	1.7	3.1	10.6	27.6	73.9	143.6	12.1	49.0	89.8
		女 F.	2.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.2	0.1	0.2	0.4	0.8	2.4	9.1	26.8	76.3	195.3	15.6	59.4	108.6
51－52	虚血性心疾患	総数T.	41.9	－	－	－	0.1	－	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.4	1.2	1.9	4.0	9.0	15.2	28.5	52.9	86.5	169.1	318.4	565.0	945.3	1 447.5	288.2	758.7	1 074.8
		男 M.	45.4	－	－	－	－	－	－	－	0.1	0.0	0.1	0.6	0.5	1.7	3.0	6.5	14.9	24.7	45.5	81.3	128.1	240.8	415.7	694.5	1 136.3	1 651.1	346.6	887.4	1 253.6
		女 F.	38.6	－	－	－	0.2	－	0.0	0.0	0.0	－	0.1	0.1	0.3	0.6	0.7	1.5	3.1	6.0	12.2	26.7	55.1	119.5	254.4	488.8	850.7	1 367.8	248.9	689.1	991.2
51	急性心筋梗塞	総数T.	26.0	－	－	－	0.1	－	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.9	1.4	3.1	6.7	11.4	21.2	40.2	62.2	117.3	207.0	331.0	468.1	570.7	171.4	393.1	494.6
		男 M.	29.7	－	－	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	1.3	2.3	4.9	11.2	18.4	33.9	61.8	91.4	166.3	273.2	423.5	587.9	689.9	216.0	488.2	611.1
		女 F.	22.5	－	－	－	0.2	－	0.0	0.0	0.0	－	0.1	0.0	0.2	0.5	0.5	1.2	2.3	4.6	9.1	20.2	40.1	83.5	163.4	276.6	408.8	523.9	141.4	341.8	440.1
52	その他の虚血性心疾患	総数T.	15.9	－	－	－	－	－	－	－	0.0	－	0.1	0.2	0.1	0.3	0.4	0.9	2.3	3.8	7.3	12.8	24.3	51.7	111.4	234.0	477.1	876.9	116.8	365.5	580.2
		男 M.	15.7	－	－	－	－	－	－	－	0.0	－	0.1	0.4	0.1	0.5	0.7	1.6	3.7	6.3	11.6	19.5	36.7	74.5	142.5	271.1	548.4	961.2	130.5	399.2	642.5
		女 F.	16.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.2	0.2	0.3	0.8	1.5	3.1	6.5	15.0	36.0	90.9	212.2	441.8	843.8	107.5	347.3	551.1
54－56	肺循環疾患及びその他の型の心疾患	総数T.	91.8	14.7	5.7	2.8	2.0	1.6	3.0	5.2	0.9	1.3	2.4	3.7	5.2	7.6	10.1	14.5	23.1	35.7	54.9	85.5	141.6	277.3	601.4	1 260.3	2 471.2	4 709.7	626.7	1 939.6	3 048.3
		男 M.	89.6	14.2	5.4	3.0	1.9	2.3	3.1	5.2	0.9	1.6	2.9	5.2	7.3	11.0	14.7	20.7	33.9	52.1	79.8	117.5	191.4	353.4	737.2	1 487.3	2 799.9	5 006.1	675.9	2 113.7	3 302.8
		女 F.	93.9	15.3	5.9	2.5	2.1	0.9	2.8	5.2	0.8	1.0	1.8	2.2	3.0	4.1	5.4	8.2	12.5	19.6	31.0	55.9	104.0	224.7	512.0	1 126.8	2 308.3	4 593.5	593.7	1 845.6	2 929.4

注：1） 0歳は出生10万対の死亡率である。

表5.16　性・年齢別にみた死因（簡単分類）別死亡率（人口10万対）（つづき）

Table 5.16 Death rates (per 100,000 population) by sex, age and causes of death (the 117 rubrics list of mortality for Japan) : Japan, 1990－con.

平成２年

簡単分類番号 117 rubrics[a] list code	死因・性 Causes of death and sex		総数 Total	0歳[1] Years	1	2	3	4	1～4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～	65～	80～	85～
54	心内膜の慢性疾患	総数T.	3.4	0.1	－	－	0.1	－	0.0	0.0	－	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.4	0.6	1.2	2.2	3.9	6.7	13.0	26.7	46.3	80.6	123.7	23.6	63.5	91.7
		男 M.	2.8	－	－	－	0.1	－	0.0	0.0	－	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	0.2	0.4	0.7	1.4	2.6	4.1	7.6	13.1	29.8	41.9	72.5	119.1	21.9	56.1	83.1
		女 F.	4.0	0.2	－	－	0.2	－	0.0	0.1	－	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.5	1.1	1.8	3.7	6.0	12.9	24.6	48.9	84.6	125.6	24.8	67.6	95.7
55	心不全	総数T.	78.3	10.3	4.3	2.1	1.3	1.3	2.2	3.7	0.6	0.7	1.7	2.8	4.1	6.0	8.2	11.7	19.3	29.5	44.6	69.4	115.9	229.8	511.2	1 087.7	2 172.1	4 226.8	540.1	1 700.9	2 701.8
		男 M.	76.2	9.6	4.4	2.3	1.5	1.9	2.4	3.8	0.7	0.8	2.2	4.1	5.8	8.9	12.1	16.9	28.6	43.8	65.8	97.4	157.0	294.6	626.1	1 288.1	2 458.8	4 477.0	580.2	1 850.7	2 918.9
		女 F.	80.4	11.1	4.2	1.9	1.1	0.8	2.0	3.7	0.5	0.5	1.3	1.4	2.3	3.0	4.2	6.4	10.1	15.5	24.3	43.6	84.8	185.1	435.5	969.8	2 030.0	4 128.8	513.1	1 620.0	2 600.4
56	その他の心疾患	総数T.	10.1	4.3	1.4	0.7	0.6	0.3	0.7	1.4	0.3	0.6	0.6	0.8	1.0	1.4	1.7	2.4	3.2	5.0	8.1	12.2	19.0	34.5	63.5	126.4	218.5	359.1	63.0	175.2	254.8
		男 M.	10.7	4.6	1.1	0.8	0.3	0.4	0.6	1.4	0.3	0.7	0.7	0.9	1.3	1.8	2.4	3.4	4.5	7.0	11.4	16.0	26.7	45.7	81.3	157.4	268.6	410.0	73.8	206.9	300.8
		女 F.	9.6	4.0	1.6	0.6	0.9	0.2	0.8	1.4	0.4	0.5	0.5	0.7	0.7	1.0	0.9	1.4	1.9	3.1	4.9	8.6	13.2	26.7	51.8	108.1	193.7	339.2	55.8	158.0	233.3
58－60	脳血管疾患	総数T.	99.4	2.5	0.5	0.3	0.4	0.1	0.3	0.7	0.1	0.2	0.3	0.9	1.6	3.0	6.9	15.2	27.5	44.1	66.6	102.2	162.9	334.0	707.2	1 396.9	2 594.1	3 991.4	679.8	1 988.6	2 954.4
		男 M.	95.6	2.6	0.6	0.5	0.7	－	0.4	0.8	0.2	0.2	0.4	1.1	2.1	4.2	9.8	19.6	35.6	58.6	91.1	136.8	210.1	425.9	865.0	1 631.9	2 852.5	4 209.4	735.1	2 159.7	3 161.8
		女 F.	103.0	2.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.6	0.1	0.2	0.3	0.7	1.0	1.8	4.0	10.9	19.4	29.9	43.1	70.2	127.3	270.6	603.3	1 258.6	2 466.1	3 906.0	642.5	1 896.1	2 857.5
58	脳出血	総数T.	25.1	1.8	0.4	0.3	0.2	－	0.2	0.5	0.1	0.1	0.2	0.5	0.7	1.3	3.1	7.1	13.7	23.1	32.3	43.1	57.8	94.6	164.0	262.5	395.0	488.4	141.3	322.0	419.1
		男 M.	27.5	2.1	0.5	0.5	0.3	－	0.3	0.6	0.1	0.1	0.2	0.6	0.9	2.0	4.6	10.4	19.7	34.0	47.8	61.3	78.0	120.3	196.0	298.2	432.4	527.9	160.1	352.0	454.2
		女 F.	22.8	1.5	0.3	0.2	0.2	－	0.2	0.4	0.1	0.1	0.1	0.4	0.5	0.7	1.6	3.7	7.7	12.5	17.4	26.2	42.6	76.9	143.0	241.5	376.5	472.9	128.6	305.8	402.7
59	脳梗塞	総数T.	52.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.2	0.2	0.5	1.1	2.2	5.6	12.9	32.0	67.1	175.6	421.3	892.8	1 687.1	2 542.5	407.3	1 278.4	1 907.7
		男 M.	50.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.1	0.1	0.7	1.2	3.0	7.9	18.9	47.8	96.5	246.2	558.3	1 096.0	1 922.8	2 737.5	461.6	1 445.3	2 108.5
		女 F.	54.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0	－	0.2	0.2	0.4	1.1	1.4	3.4	7.1	17.5	44.9	126.9	331.2	773.3	1 570.4	2 466.1	370.9	1 188.2	1 813.8
60	その他の脳血管疾患	総数T.	21.6	0.7	0.1	－	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.4	0.7	1.5	3.3	7.0	11.6	15.3	21.4	27.1	38.0	63.8	121.8	241.6	512.0	960.5	131.2	388.2	627.6
		男 M.	17.7	0.5	0.2	－	0.4	－	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.5	1.0	2.1	4.5	7.9	12.9	16.7	24.3	27.7	35.6	59.4	110.7	237.7	497.3	944.0	113.5	362.4	599.1
		女 F.	25.5	0.8	－	－	－	0.2	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3	0.4	1.0	2.0	6.1	10.3	14.0	18.5	26.6	39.7	66.8	129.2	243.8	519.2	967.0	143.1	402.2	640.9
61	循環系のその他の疾患	総数T.	6.3	0.6	0.6	0.2	－	－	0.2	0.3	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.3	0.5	0.8	1.6	2.2	4.0	7.5	13.8	23.9	46.7	81.3	136.3	267.2	43.2	115.0	170.0
		男 M.	7.3	0.5	0.5	0.5	－	－	0.2	0.3	－	0.1	0.1	0.2	0.2	0.4	0.8	1.1	2.4	3.3	5.9	10.8	22.7	38.7	72.8	118.2	164.6	294.6	58.0	144.4	194.2
		女 F.	5.3	0.7	0.7	－	－	－	0.2	0.3	0.0	－	0.1	0.0	0.0	0.2	0.2	0.5	0.7	1.1	2.2	4.4	7.1	13.8	29.5	59.6	122.3	256.4	33.2	99.1	158.7
62	急性気管支炎	総数T.	1.1	0.7	0.2	0.2	－	－	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	1.1	2.5	5.4	15.4	41.2	104.7	8.3	31.4	57.6
		男 M.	1.1	1.3	－	0.2	－	－	0.0	0.3	0.1	－	0.0	0.1	－	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6	1.5	3.4	7.9	22.0	54.7	149.8	10.1	40.7	76.4
		女 F.	1.1	－	0.3	0.3	－	－	0.2	0.1	0.0	0.0	－	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.8	1.9	3.7	11.5	34.5	87.1	7.2	26.4	48.8
63	肺炎	総数T.	55.6	11.1	4.5	2.3	1.4	1.4	2.4	4.0	0.7	0.5	0.6	0.8	1.0	1.1	1.6	2.1	4.0	7.1	14.9	32.4	67.7	173.0	417.2	912.6	1 740.2	3 135.3	423.0	1 363.6	2 099.9
		男 M.	64.1	13.6	4.5	3.0	1.5	1.9	2.7	4.7	0.9	0.4	0.8	0.9	1.0	1.2	1.7	2.8	5.7	10.1	21.7	48.9	106.2	277.1	667.4	1 401.3	2 587.5	4 480.7	584.1	1 959.4	3 019.1
		女 F.	47.4	8.6	4.6	1.6	1.4	0.9	2.1	3.3	0.4	0.6	0.4	0.7	1.0	1.0	1.6	1.3	2.4	4.1	8.4	17.2	38.8	101.1	252.5	625.1	1 320.5	2 608.0	314.7	1 041.9	1 670.4
64	インフルエンザ	総数T.	0.4	0.2	0.4	0.1	－	－	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.8	2.2	4.4	14.4	32.8	2.7	10.0	19.2
		男 M.	0.3	0.2	0.6	0.2	－	－	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	－	0.0	－	0.0	－	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.9	3.3	6.0	18.5	44.2	3.1	12.4	24.3
		女 F.	0.4	0.2	0.2	－	－	－	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	－	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.7	1.5	3.5	12.4	28.4	2.4	8.8	16.7
66－68	気管支炎，肺気腫及び喘息	総数T.	12.2	0.9	0.8	0.8	0.5	0.3	0.6	0.6	0.3	0.5	0.9	1.0	1.0	0.7	0.9	1.1	1.7	2.4	4.5	10.1	21.3	49.4	101.1	178.1	286.8	442.1	87.1	234.6	326.9
		男 M.	16.0	1.0	0.8	0.8	0.9	0.1	0.6	0.7	0.4	0.6	1.2	1.3	1.3	1.0	0.8	1.2	2.0	2.5	5.7	14.8	32.8	83.0	177.1	324.3	514.3	753.7	139.9	408.7	568.9
		女 F.	8.5	0.8	0.8	0.8	0.2	0.5	0.5	0.6	0.2	0.4	0.6	0.7	0.7	0.4	0.9	1.1	1.4	2.3	3.4	5.8	12.6	26.2	51.0	92.1	174.2	319.9	51.5	140.6	213.8
66	気管支炎	総数T.	4.1	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.5	1.7	4.1	12.3	30.8	69.2	135.1	268.9	32.1	107.3	169.6
		男 M.	4.8	0.2	0.5	0.5	0.1	0.1	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.2	0.7	2.4	5.8	20.0	50.2	115.6	213.8	421.1	46.1	165.8	261.1
		女 F.	3.4	0.5	0.2	0.2	－	0.2	0.1	0.2	－	0.0	0.0	0.0	－	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	1.0	2.8	6.9	18.0	41.9	96.1	209.3	22.7	75.8	126.8
67	肺気腫	総数T.	3.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0	－	－	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.8	2.5	6.9	19.1	35.7	50.8	59.8	46.3	25.0	52.9	56.3
		男 M.	5.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0	－	－	－	0.1	0.0	0.1	0.3	1.4	4.7	13.6	38.6	74.6	116.4	146.8	117.8	51.6	124.6	140.2
		女 F.	1.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1	0.0	－	0.1	0.0	0.3	0.5	1.8	5.5	10.1	12.2	16.7	18.3	7.1	14.2	17.1
68	喘息	総数T.	4.8	0.6	0.5	0.5	0.4	0.1	0.4	0.4	0.2	0.4	0.8	0.9	1.0	0.6	0.7	1.1	1.4	2.1	3.2	5.9	10.4	18.1	34.6	58.1	92.0	126.8	30.0	74.4	101.0
		男 M.	5.7	0.8	0.3	0.3	0.7	－	0.3	0.4	0.3	0.6	1.1	1.3	1.3	0.9	0.7	1.2	1.7	2.1	3.6	7.6	13.5	24.3	52.2	92.3	153.7	214.8	42.2	118.3	167.6
		女 F.	4.1	0.3	0.7	0.6	0.2	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.6	0.6	0.7	0.3	0.7	1.0	1.2	2.1	2.7	4.3	8.0	13.8	22.9	38.0	61.4	92.4	21.7	50.7	69.8
69	胃及び十二指腸潰瘍	総数T.	2.9	0.1	－	－	－	0.1	0.0	0.0	－	－	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.5	0.8	1.3	2.3	3.1	4.8	9.3	20.4	40.1	73.2	137.9	19.9	59.0	89.9
		男 M.	3.2	0.2	－	－	－	－	－	0.0	－	－	0.1	0.0	0.0	0.3	0.4	0.7	1.5	2.1	3.5	5.3	7.5	14.3	28.3	49.4	84.1	137.5	23.5	65.6	96.3
		女 F.	2.7	－	－	－	－	0.2	0.0	0.0	－	－	－	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.4	1.1	1.1	2.8	5.9	15.2	34.6	67.9	138.1	17.5	55.5	86.9
70	虫垂炎	総数T.	0.1	0.1	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.0	0.0	－	－	－	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.4	0.6	1.3	2.8	0.4	1.0	1.7
		男 M.	0.1	0.2	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.1	0.0	－	－	－	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.4	0.8	0.4	1.4	3.7	0.5	1.0	2.0
		女 F.	0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.3	0.1	0.7	1.3	2.4	0.3	1.0	1.6
71	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	総数T.	2.5	1.5	0.1	0.1	－	－	0.0	0.3	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.5	0.6	1.2	2.4	4.3	10.0	18.9	35.4	61.1	95.4	17.5	48.5	70.0
		男 M.	2.3	1.9	－	－	－	－	－	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.3	0.7	0.8	1.5	3.1	6.2	13.1	24.3	37.0	63.1	97.0	19.0	48.7	70.8
		女 F.	2.6	1.0	0.2	0.2	－	－	0.1	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.4	0.4	1.0	1.7	2.8	7.9	15.4	34.4	60.1	94.8	16.5	48.4	69.6

注：1)　0歳は出生10万対の死亡率である。

表5.16　性・年齢別にみた死因

Table 5.16 Death rates (per 100,000 population) by sex, age and causes of death (the 117 rubrics list of mortality for Japan) : Japan, 1990－con.

平成２年

簡単分類番号 117 rubrics[a] list code	死因・性 Causes of death and sex		総数 Total	0歳[1] Years	1	2	3	4	1～4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～	65～	80～	85～
72	胃炎，十二指腸炎及び慢性胃腸炎	総数T.	0.7	－	0.1	－	0.1	－	0.0	0.0	－	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.6	2.2	8.6	24.5	55.6	4.6	17.7	32.5
		男 M.	0.6	－	－	－	0.1	－	0.0	0.0	－	0.0	－	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.3	0.4	0.8	0.9	1.7	2.3	9.0	27.5	56.5	4.3	17.7	34.1
		女 F.	0.8	－	0.2	－	－	－	0.0	0.0	－	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.7	1.6	2.0	8.3	23.0	55.3	4.8	17.7	31.8
73	慢性肝疾患及び肝硬変	総数T.	13.7	－	－	－	0.1	－	0.0	0.0	－	0.0	0.0	0.1	0.2	0.8	2.9	6.4	13.2	21.6	35.0	38.7	38.3	47.3	57.2	65.8	75.3	72.6	50.6	69.1	74.6
		男 M.	19.1	－	－	－	0.1	－	0.0	0.0	－	0.0	0.0	0.2	0.3	1.4	4.7	11.1	23.2	37.0	58.2	59.7	55.4	60.4	71.0	86.8	109.5	105.6	66.6	94.3	108.6
		女 F.	8.5	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1	0.0	0.0	0.2	0.3	0.9	1.6	3.3	6.6	12.7	19.4	25.5	38.3	48.1	53.4	58.4	59.7	39.8	55.5	58.7
74	肝疾患（肝硬変を除く）	総数T.	2.4	0.8	0.3	－	0.1	－	0.1	0.2	0.1	－	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	1.0	1.7	2.2	3.2	4.1	4.9	8.5	13.7	23.9	32.9	42.5	12.2	28.2	35.4
		男 M.	2.9	0.8	－	－	0.1	－	0.0	0.2	0.1	－	0.1	0.1	0.3	0.4	0.6	1.4	2.7	3.3	5.0	6.4	7.5	12.1	18.0	30.5	44.6	44.2	15.6	35.3	44.5
		女 F.	1.9	0.8	0.7	－	－	－	0.2	0.3	－	－	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.5	0.8	1.2	1.5	2.1	2.9	6.0	10.8	19.9	27.1	41.9	9.9	24.4	31.1
76－77	腎炎，ネフローゼ症候群及びネフローゼ	総数T.	14.0	6.1	0.4	0.4	0.1	0.2	0.3	1.4	0.1	0.1	0.1	0.3	0.4	0.6	1.0	1.4	2.5	4.6	7.7	14.8	26.4	48.8	106.6	204.1	341.2	520.2	97.5	273.7	387.4
		男 M.	13.8	6.1	0.5	0.5	0.1	0.1	0.3	1.4	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.8	1.3	1.7	3.0	5.8	10.5	19.9	33.1	62.2	132.8	253.1	409.9	628.5	111.1	324.4	459.8
		女 F.	14.1	6.1	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	1.4	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.0	1.9	3.5	5.0	10.1	21.3	39.6	89.3	175.3	307.2	477.7	88.4	246.4	353.5
76	急性糸球体腎炎及びネフローゼ症候群	総数T.	3.2	2.9	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.7	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.6	0.9	1.7	3.1	5.9	10.6	24.5	45.7	79.7	121.3	22.2	62.7	90.4
		男 M.	3.1	2.7	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	0.7	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.4	0.8	1.2	2.5	4.1	7.4	14.1	28.8	58.5	92.4	121.5	24.7	72.5	99.1
		女 F.	3.3	3.0	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.4	0.6	0.9	2.1	4.8	8.2	21.7	38.2	73.4	121.2	20.5	57.5	86.4
77	その他	総数T.	10.8	3.2	0.2	0.2	－	0.1	0.1	0.7	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.5	0.8	1.1	1.9	3.7	6.0	11.8	20.4	38.2	82.0	158.4	261.5	398.9	75.3	211.0	296.9
		男 M.	10.7	3.3	0.3	0.2	－	－	0.1	0.7	－	0.0	0.1	0.2	0.2	0.6	1.0	1.4	2.3	4.6	8.0	15.8	25.7	48.1	104.0	194.6	317.5	507.0	86.4	251.9	360.7
		女 F.	10.9	3.0	－	0.2	－	0.2	0.1	0.6	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.5	2.8	4.0	8.1	16.5	31.4	67.5	137.1	233.8	356.5	67.9	188.9	267.1
78	前立腺肥大症	男[3] M.	0.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.1	0.9	1.8	6.6	22.8	65.1	3.3	15.5	32.5
79	直接産科的死亡	女[2] F.	0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0	0.2	0.7	0.6	0.5	0.2	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
80	間接産科的死亡	女[2] F.	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0	0.2	0.1	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
81	先天異常	総数T.	2.9	166.0	17.4	8.1	5.5	3.9	8.6	38.3	1.4	0.9	1.0	0.7	0.3	0.6	0.7	0.5	0.5	0.7	1.0	1.2	1.6	1.7	2.6	3.1	2.2	3.5	2.1	2.8	2.5
		男 M.	3.1	168.9	19.3	9.6	6.4	3.8	9.6	39.7	1.6	0.8	1.0	0.8	0.4	0.7	0.8	0.6	0.7	0.8	1.0	1.3	1.6	2.0	2.8	3.7	3.3	2.5	2.3	3.5	3.1
		女 F.	2.7	163.0	15.4	6.5	4.6	4.1	7.5	36.8	1.2	1.0	0.9	0.5	0.3	0.4	0.6	0.4	0.4	0.6	1.0	1.2	1.6	1.6	2.5	2.7	1.6	3.8	2.0	2.5	2.2
82	出産時外傷，低酸素症，分娩仮死及びその他の呼吸器病態	総数T.	1.0	97.0	1.5	0.6	0.3	0.1	0.6	18.8	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男 M.	1.2	111.6	2.0	0.8	0.4	0.1	0.8	21.8	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女 F.	0.8	81.6	1.0	0.5	0.2	－	0.4	15.7	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
84－87	その他の周産期の死因	総数T.	0.5	46.7	0.1	0.1	－	－	0.0	8.9	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男 M.	0.5	50.7	0.2	－	－	－	0.0	9.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女 F.	0.4	42.5	－	0.2	－	－	0.0	8.1	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
84	新生児破傷風	総数T.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
85	新生児カンジダ感染	総数T.	0.0	0.1	－	－	－	－	－	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女 F.	0.0	0.2	－	－	－	－	－	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
86	新生児敗血症	総数T.	0.1	7.2	－	－	－	－	－	1.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男 M.	0.1	6.9	－	－	－	－	－	1.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女 F.	0.1	7.6	－	－	－	－	－	1.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
87	その他	総数T.	0.4	39.5	0.1	0.1	－	－	0.0	7.5	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男 M.	0.5	43.9	0.2	－	－	－	0.0	8.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女 F.	0.3	34.8	－	0.2	－	－	0.0	6.6	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
88	精神病の記載のない老衰	総数T.	19.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1	1.5	8.4	46.2	245.1	948.9	3 457.1	162.6	758.1	1 595.5
		男 M.	13.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1	1.7	9.3	53.8	262.9	939.8	3 495.0	134.7	697.4	1 522.3
		女 F.	25.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1	1.2	7.8	41.2	234.6	953.4	3 442.2	181.4	790.9	1 629.7
89	その他のすべての疾患	総数T.	36.1	48.9	9.4	3.5	2.8	1.6	4.2	12.7	1.1	1.0	1.6	2.3	2.5	3.3	4.0	5.5	8.7	14.0	24.7	40.9	69.6	134.6	250.4	457.9	782.5	1 299.9	234.6	631.9	915.9
		男 M.	38.2	58.9	10.9	4.2	4.1	2.7	5.4	15.5	1.0	1.2	2.1	2.4	2.9	3.5	4.4	6.6	11.0	17.2	33.2	53.0	94.6	190.5	344.2	610.9	986.2	1 462.1	287.9	777.8	1 094.7
		女 F.	34.0	38.3	7.8	2.7	1.5	0.5	3.0	9.7	1.1	0.7	1.2	2.1	2.1	3.0	3.5	4.4	6.4	10.8	16.7	29.6	50.7	96.0	188.7	367.9	681.5	1 236.4	198.8	553.1	832.3

注：1)　0歳は出生10万対の死亡率である。
　　2)　女子人口10万対の死亡率である。
　　3)　男子人口10万対の死亡率である。

表5.16　性・年齢別にみた死因

Table 5.16 Death rates (per 100,000 population) by sex, age and causes of

簡単分類番号 117 rubrics[a] list code	死因・性 Causes of death and sex		総数 Total	0歳[1] Years	1	2	3	4	1～4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29
91－101	損傷及び中毒	総数T.	45.3	35.6	23.8	13.6	13.3	11.3	15.4	19.2	7.8	4.8	29.8	36.5	29.0
		男 M.	60.9	39.4	26.6	16.5	17.1	14.9	18.6	22.6	10.6	6.6	45.7	55.5	43.2
		女 F.	30.3	31.6	20.9	10.6	9.3	7.4	11.9	15.6	4.8	2.8	13.2	16.8	14.6
91	頭蓋骨折	総数T.	4.8	1.3	2.6	2.7	1.8	1.5	2.1	2.0	1.1	0.9	6.6	7.2	4.8
		男 M.	7.2	1.6	3.4	3.0	2.5	2.0	2.7	2.5	1.3	1.3	10.2	11.0	7.3
		女 F.	2.5	1.0	1.8	2.4	1.1	1.1	1.6	1.5	1.0	0.5	2.8	3.2	2.2
92	その他の骨の骨折	総数T.	2.7	0.1	0.5	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	2.6	2.6	1.5
		男 M.	3.1	－	0.9	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.2	3.9	3.9	2.1
		女 F.	2.3	0.2	－	－	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	1.2	1.1	0.9
93	頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	総数T.	6.9	2.7	2.5	2.7	2.6	2.4	2.6	2.6	1.6	1.2	8.4	7.6	4.2
		男 M.	9.8	2.9	3.0	3.3	3.1	3.1	3.1	3.1	2.0	1.6	12.8	11.6	6.6
		女 F.	4.0	2.5	2.1	2.1	2.1	1.7	2.0	2.1	1.1	0.9	3.9	3.5	1.7
94	胸，腹及び骨盤の内部損傷	総数T.	3.8	0.3	0.8	0.8	1.2	0.7	0.9	0.8	0.7	0.4	4.9	5.1	3.4
		男 M.	5.8	0.3	0.6	0.9	1.5	0.6	0.9	0.8	0.9	0.6	8.3	8.0	5.3
		女 F.	1.7	0.3	1.0	0.6	0.9	0.9	0.9	0.8	0.4	0.2	1.2	2.1	1.4
95	開放創	総数T.	0.8	0.2	－	0.2	0.1	－	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.6	0.5
		男 M.	1.2	0.2	－	0.2	－	－	0.0	0.1	0.2	0.1	0.4	0.9	0.8
		女 F.	0.5	0.2	－	0.2	0.2	－	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.3	0.2
96	熱傷	総数T.	1.9	1.5	1.2	0.8	0.9	1.1	1.0	1.1	0.5	0.2	0.5	1.0	1.1
		男 M.	2.2	1.3	0.8	1.2	1.3	1.1	1.1	1.1	0.5	0.2	0.7	1.4	1.4
		女 F.	1.5	1.7	1.6	0.3	0.5	1.1	0.9	1.0	0.4	0.2	0.3	0.6	0.8
97	神経及び脊髄の損傷	総数T.	0.4	0.1	－	0.1	0.4	－	0.1	0.1	0.1	0.0	0.5	0.4	0.2
		男 M.	0.6	0.2	－	0.2	0.6	－	0.2	0.2	0.2	－	0.8	0.7	0.2
		女 F.	0.2	－	－	－	0.2	－	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1
98	中毒及び毒作用	総数T.	2.8	0.6	0.6	0.2	0.6	0.1	0.4	0.4	0.3	0.1	0.7	2.2	3.1
		男 M.	3.7	0.3	0.3	0.2	0.7	0.3	0.4	0.4	0.2	0.1	0.7	3.2	4.3
		女 F.	2.0	0.8	1.0	0.2	0.5	－	0.4	0.5	0.3	0.1	0.7	1.3	1.9
99	溺死	総数T.	5.2	2.7	12.0	3.8	3.8	3.5	5.7	5.1	2.2	0.8	1.6	2.2	2.2
		男 M.	6.1	2.7	12.7	3.8	5.2	5.1	6.6	5.9	3.6	1.4	2.2	3.2	3.3
		女 F.	4.2	2.7	11.3	3.8	2.3	1.8	4.7	4.3	0.7	0.2	0.9	1.1	1.1
100	窒息及び絞首	総数T.	9.9	14.8	1.3	0.5	0.5	0.4	0.7	3.4	0.4	0.5	1.6	4.3	5.3
		男 M.	12.9	16.6	1.4	0.9	0.4	0.6	0.8	3.8	0.5	0.6	2.4	6.5	7.9
		女 F.	7.0	12.9	1.1	0.2	0.6	0.3	0.5	2.9	0.3	0.3	0.7	2.0	2.7
101	その他の損傷	総数T.	6.3	11.4	2.2	1.9	1.1	1.2	1.6	3.4	0.5	0.4	2.2	3.3	2.7
		男 M.	8.2	13.4	3.4	2.7	1.5	1.9	2.3	4.4	0.6	0.5	3.3	5.2	3.8
		女 F.	4.4	9.2	1.0	1.0	0.8	0.5	0.8	2.4	0.3	0.2	1.1	1.4	1.5
E104-E117	損傷及び中毒の外因	総数T.	45.3	35.6	23.8	13.6	13.3	11.3	15.4	19.2	7.8	4.8	29.8	36.5	29.0
		男 M.	60.9	39.4	26.6	16.5	17.1	14.9	18.6	22.6	10.6	6.6	45.7	55.5	43.2
		女 F.	30.3	31.6	20.9	10.6	9.3	7.4	11.9	15.6	4.8	2.8	13.2	16.8	14.6
E104-E114	不慮の事故及び有害作用	総数T.	26.2	28.3	22.1	12.0	11.8	9.8	13.8	16.6	7.0	3.8	25.0	24.0	13.6
		男 M.	36.8	32.4	24.7	14.3	15.7	13.0	16.8	19.8	9.7	5.3	39.7	38.8	22.9
		女 F.	15.9	24.0	19.3	9.7	7.7	6.5	10.6	13.2	4.2	2.1	9.6	8.6	4.0
E104	自動車事故	総数T.	11.9	2.3	3.8	4.4	5.6	4.1	4.5	4.1	3.5	1.8	22.1	19.7	9.4
		男 M.	17.5	2.2	4.8	5.3	7.4	5.4	5.7	5.1	4.4	2.3	35.2	31.7	15.7
		女 F.	6.6	2.4	2.8	3.5	3.7	2.7	3.2	3.0	2.5	1.3	8.3	7.2	2.9
E105	自動車事故以外の交通事故	総数T.	1.0	－	0.7	0.8	0.4	0.3	0.6	0.4	0.2	0.4	0.5	0.4	0.6
		男 M.	1.6	－	1.1	1.1	0.6	0.6	0.8	0.7	0.3	0.7	0.7	0.5	1.1
		女 F.	0.4	－	0.3	0.5	0.3	－	0.3	0.2	0.1	0.0	0.3	0.2	0.1
E106	不慮の中毒	総数T.	0.5	0.1	0.2	－	0.1	－	0.1	0.1	0.1	0.0	0.3	0.5	0.5
		男 M.	0.6	－	－	－	－	－	－	－	0.1	0.0	0.4	0.7	0.7
		女 F.	0.3	0.2	0.3	－	0.2	－	0.1	0.1	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3

注：1）0歳は出生10万対の死亡率である。

（簡単分類）別死亡率（人口10万対）（つづき）
death (the 117 rubrics list of mortality for Japan) : Japan, 1990－con.

平成2年

30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～	65～	80～	85～
27.0	29.2	33.5	44.4	52.0	58.5	63.6	72.1	102.2	145.8	213.4	291.9	400.9	130.8	253.9	320.0
39.9	44.6	49.4	65.5	75.9	86.2	91.5	100.7	141.0	194.2	283.3	388.9	497.2	169.3	328.2	413.6
13.8	13.6	17.4	23.5	28.5	31.8	37.8	50.4	75.4	113.9	172.2	243.8	363.2	104.9	213.7	276.3
3.6	3.4	3.7	4.3	5.1	6.2	5.9	6.2	8.1	9.9	11.6	10.2	10.0	8.4	11.1	10.2
5.5	5.4	5.4	6.8	8.0	9.8	8.9	9.2	13.1	14.9	17.5	16.3	16.0	12.7	17.1	16.2
1.5	1.4	2.0	1.7	2.3	2.8	3.1	3.9	4.6	6.5	8.2	7.2	7.7	5.4	7.8	7.3
1.2	1.0	1.3	1.8	2.0	2.4	3.1	2.9	5.3	9.4	18.7	42.1	102.7	10.9	33.5	57.7
1.6	1.6	1.9	2.5	3.0	3.5	4.0	4.1	6.8	11.4	15.9	39.5	77.3	10.2	27.0	48.1
0.8	0.4	0.6	1.1	1.0	1.4	2.2	2.0	4.3	8.1	20.4	43.4	112.6	11.4	37.1	62.2
3.0	3.5	4.1	5.0	6.6	8.4	10.3	11.5	16.8	22.6	32.2	34.6	31.1	19.3	32.7	33.7
4.6	5.6	6.5	7.6	10.0	12.8	15.6	17.2	25.1	34.9	52.3	55.1	52.8	29.0	53.1	54.6
1.4	1.3	1.8	2.5	3.2	4.3	5.3	7.1	11.1	14.5	20.3	24.4	22.6	12.8	21.7	23.9
2.5	2.9	3.2	3.9	4.9	5.3	5.3	5.2	6.1	7.5	8.1	8.5	4.1	6.4	7.9	7.4
3.9	4.4	5.1	6.2	7.9	8.5	8.8	8.3	9.9	11.7	13.3	14.5	8.6	10.3	13.2	13.2
1.0	1.3	1.3	1.7	1.9	2.3	2.0	2.9	3.4	4.8	5.1	5.6	2.4	3.9	5.0	4.7
0.8	0.9	0.9	1.3	1.2	1.3	1.3	1.1	1.4	1.5	1.6	2.2	2.4	1.4	1.9	2.2
1.2	1.2	1.4	1.9	1.8	2.0	1.8	1.4	1.7	2.3	2.2	4.0	3.7	1.9	2.8	3.9
0.3	0.7	0.4	0.7	0.7	0.6	0.8	0.8	1.3	0.9	1.3	1.3	1.9	1.1	1.4	1.4
1.4	1.6	2.1	2.1	2.2	1.9	2.0	2.3	4.1	5.8	10.3	13.8	18.0	5.4	12.1	14.9
1.8	2.0	2.6	2.6	2.6	2.5	2.4	3.2	4.9	6.5	13.7	23.2	28.2	6.8	17.4	24.3
1.1	1.2	1.5	1.5	1.8	1.3	1.7	1.7	3.6	5.4	8.3	9.2	14.0	4.5	9.2	10.5
0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.5	0.7	1.0	1.1	1.6	1.6	1.0	1.0	1.2	1.4	1.0
0.2	0.4	0.3	0.3	0.5	0.8	1.1	1.7	2.2	3.2	3.7	2.2	3.7	2.4	3.3	2.5
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	－	0.4	0.4	0.3
2.9	3.3	3.1	3.4	4.5	4.0	4.0	4.7	5.2	5.8	5.8	9.5	5.5	5.5	6.8	8.5
4.2	5.3	4.4	4.8	6.5	5.4	5.3	5.7	6.1	6.6	6.9	9.4	7.4	6.3	7.6	9.0
1.5	1.3	1.8	2.0	2.6	2.6	2.7	3.9	4.7	5.3	5.1	9.5	4.8	4.9	6.4	8.2
2.7	3.2	3.8	5.1	5.0	5.7	7.1	8.8	12.0	20.0	29.2	38.9	41.8	16.7	33.1	39.7
4.0	4.5	5.3	6.8	6.5	8.0	9.0	11.2	12.5	20.8	29.6	41.7	50.3	17.5	34.5	43.7
1.4	1.8	2.3	3.3	3.6	3.6	5.3	7.0	11.6	19.4	28.9	37.5	38.5	16.2	32.4	37.8
6.2	6.5	8.1	12.7	14.7	16.5	16.2	17.9	24.4	32.0	44.9	53.5	54.6	28.5	48.3	53.8
9.1	10.0	12.3	18.8	21.2	23.5	22.2	23.2	30.8	37.2	56.3	73.9	83.5	34.9	63.1	76.1
3.3	3.1	4.0	6.8	8.2	9.7	10.6	13.9	20.0	28.6	38.2	43.4	43.3	24.1	40.3	43.4
2.6	2.6	2.9	4.6	5.4	6.2	7.9	10.5	17.7	29.7	49.2	77.6	129.6	27.1	65.1	91.0
3.7	4.1	4.2	7.2	7.8	9.5	12.3	15.7	27.9	44.8	71.8	109.1	165.7	37.4	89.1	122.0
1.5	1.0	1.6	1.9	3.0	3.1	3.8	6.7	10.6	19.7	36.0	61.9	115.5	20.2	52.1	76.5
27.0	29.2	33.5	44.4	52.0	58.5	63.6	72.1	102.2	145.8	213.4	291.9	400.9	130.8	253.9	320.0
39.9	44.6	49.4	65.5	75.9	86.2	91.5	100.7	141.0	194.2	283.3	388.9	497.2	169.3	328.2	413.6
13.8	13.6	17.4	23.5	28.5	31.8	37.8	50.4	75.4	113.9	172.2	243.8	363.2	104.9	213.7	276.3
11.0	12.8	14.4	18.4	23.2	29.8	35.5	42.3	62.9	94.0	146.4	211.0	325.6	85.8	182.1	240.5
17.9	21.3	23.0	29.3	36.6	47.3	55.6	63.8	93.7	136.7	204.4	286.3	386.7	116.8	240.6	309.2
4.0	4.1	5.7	7.6	10.1	12.9	16.9	26.0	41.5	65.8	112.2	173.6	301.6	65.0	150.6	208.4
6.4	6.7	7.2	8.8	10.5	12.7	15.0	17.7	23.8	32.0	38.9	28.8	24.2	25.5	34.6	27.6
10.3	10.8	10.8	13.1	14.9	18.0	21.1	25.3	35.0	47.5	58.4	44.9	41.7	37.2	53.5	44.2
2.5	2.5	3.5	4.5	6.1	7.7	9.2	12.0	16.1	21.8	27.5	20.8	17.3	17.7	24.5	19.9
0.5	0.7	0.8	1.0	1.2	1.3	1.8	1.8	2.8	2.9	3.8	4.4	1.4	2.7	3.8	3.7
1.0	1.3	1.5	1.9	2.1	2.4	3.1	3.0	4.4	5.0	6.8	8.0	1.2	4.4	6.7	6.4
0.1	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.6	0.9	1.7	1.5	2.1	2.7	1.4	1.5	2.2	2.4
0.3	0.5	0.4	0.4	0.6	0.5	0.6	0.8	1.1	0.9	1.4	2.6	1.7	1.1	1.8	2.4
0.5	0.8	0.6	0.4	0.8	0.8	1.0	0.9	1.1	1.1	1.5	3.3	－	1.1	1.8	2.5
0.1	0.2	0.2	0.3	0.5	0.3	0.3	0.7	1.1	0.8	1.3	2.3	2.4	1.0	1.7	2.4

表5.16　性・年齢別にみた死因（簡単分類）別死亡率（人口10万対）（つづき）

Table 5.16 Death rates (per 100,000 population) by sex, age and causes of death (the 117 rubrics list of mortality for Japan) : Japan, 1990－con.

平成２年

簡単分類番号 117 rubrics[a] list code	死因・性 Causes of death and sex		総数 Total	0歳[1] Years	1	2	3	4	1～4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～	65～	80～	85～
E107	不慮の墜落	総数T.	3.5	1.0	1.2	1.2	0.5	0.5	0.9	0.9	0.2	0.3	0.4	0.8	0.7	0.8	1.1	1.6	2.4	3.4	4.4	5.6	5.3	9.1	13.6	28.7	63.8	129.6	16.5	48.4	80.7
		男 M.	4.6	1.4	1.4	1.1	0.4	0.6	0.9	1.0	0.2	0.5	0.7	1.4	1.0	1.4	2.0	2.8	4.2	6.3	8.0	9.4	9.2	14.6	20.4	35.1	73.2	117.8	20.2	51.7	83.4
		女 F.	2.4	0.5	1.0	1.4	0.6	0.5	0.9	0.8	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.6	0.5	1.0	2.0	2.4	5.3	9.1	24.9	59.1	134.2	14.0	46.7	79.5
E108	火災及び火焔による不慮の事故	総数T.	1.0	1.1	1.2	0.6	1.1	0.9	1.0	1.0	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.5	0.5	0.7	0.6	0.8	1.0	1.1	1.5	2.5	4.4	8.4	12.1	13.5	4.0	9.9	12.5
		男 M.	1.2	0.8	0.9	0.9	1.6	0.9	1.1	1.0	0.5	0.2	0.2	0.5	0.6	0.6	0.7	0.9	0.8	1.1	1.4	1.8	1.9	3.2	4.7	11.1	20.7	23.3	5.0	14.6	21.3
		女 F.	0.8	1.5	1.5	0.3	0.6	0.9	0.8	1.0	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.4	0.5	0.4	0.6	0.6	0.5	1.2	2.0	4.2	6.8	7.9	9.6	3.3	7.4	8.4
E109	天災	総数T.	0.1	－	0.1	－	－	－	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.4	0.1	0.3	0.2	0.3	0.2
		男 M.	0.1	－	－	－	－	－	－	－	0.1	－	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.4	－	0.2	0.3	0.3
		女 F.	0.1	－	0.2	－	－	－	0.0	0.0	－	0.0	－	－	－	－	0.0	－	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.4	－	0.5	0.2	0.3	0.1
E110	不慮の溺死	総数T.	2.6	2.2	11.5	3.1	2.9	2.8	5.0	4.5	2.0	0.6	0.8	0.9	0.7	0.8	1.1	1.2	1.5	1.5	2.3	2.7	4.6	7.3	12.3	18.7	25.7	31.1	10.3	21.9	27.1
		男 M.	3.2	2.6	12.0	3.3	4.2	4.1	5.8	5.2	3.4	1.1	1.2	1.4	1.2	1.4	1.9	2.0	2.5	2.4	3.8	4.3	6.7	8.3	13.6	21.2	30.1	36.8	11.6	24.8	31.6
		女 F.	1.9	1.8	10.9	2.9	1.5	1.5	4.1	3.7	0.6	0.2	0.3	0.3	0.1	0.3	0.3	0.4	0.6	0.6	0.8	1.2	3.1	6.7	11.4	17.2	23.5	28.9	9.4	20.3	25.0
E111	不慮の機械的窒息	総数T.	2.8	20.2	2.5	1.5	0.5	0.5	1.2	4.8	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.9	1.3	2.2	3.0	5.1	9.1	18.9	32.2	50.4	75.3	16.2	41.6	56.9
		男 M.	3.6	24.2	3.6	2.0	0.6	0.7	1.7	5.9	0.3	0.2	0.1	0.5	0.3	0.3	0.6	0.8	1.3	1.9	3.5	4.4	7.5	14.8	30.3	51.4	81.6	114.2	23.8	64.4	89.0
		女 F.	2.1	16.0	1.3	1.0	0.5	0.3	0.7	3.6	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.3	0.1	0.3	0.6	0.7	0.9	1.6	3.2	5.1	11.3	20.9	35.0	60.1	11.0	29.2	41.8
E112	不慮の打撲	総数T.	0.4	0.2	0.2	－	－	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.5	0.4	0.7	0.9	1.0	0.7	0.8	0.6	0.4	0.8	1.0	0.7	0.6	0.9
		男 M.	0.8	0.2	0.3	－	－	－	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	0.5	0.4	0.6	0.6	0.9	0.8	1.4	1.7	1.9	1.5	1.5	1.3	1.0	1.1	－	1.3	1.0	0.8
		女 F.	0.1	0.2	0.2	－	－	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	－	0.0	0.0	－	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.1	0.1	0.4	0.2	0.1	0.7	1.4	0.2	0.4	0.9
E113	工業性を主とする不慮の事故	総数T.	1.0	0.3	0.6	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.1	0.2	0.5	0.7	0.6	0.8	0.9	1.1	1.6	2.4	2.2	1.5	2.0	1.8	2.1	2.5	4.8	1.9	2.5	3.1
		男 M.	1.7	0.3	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.2	0.1	0.4	0.9	1.2	1.1	1.5	1.7	2.1	3.1	4.4	4.0	2.8	3.7	3.4	4.0	4.0	6.1	3.4	4.2	4.5
		女 F.	0.2	0.3	0.7	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.4	0.4	0.5	0.8	0.7	1.0	1.8	4.3	0.8	1.6	2.5
E114	その他の不慮の事故及び有害作用	総数T.	1.5	0.9	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.4	0.4	0.5	0.6	0.7	1.2	1.6	2.0	2.6	3.2	4.3	6.5	11.5	19.6	42.5	6.8	16.8	25.5
		男 M.	2.0	0.6	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.3	0.1	0.3	0.4	0.7	0.6	0.8	1.1	1.0	2.2	2.6	3.1	4.5	4.9	6.9	9.4	13.7	19.2	45.4	8.5	17.7	25.2
		女 F.	1.0	1.2	0.2	－	0.2	0.3	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.3	0.3	0.6	0.9	0.8	1.9	2.4	4.6	10.1	19.7	41.4	5.7	16.3	25.6
E115	自殺	総数T.	16.4	－	－	－	－	－	－	－	－	0.6	3.8	10.6	13.4	14.2	14.3	16.3	22.0	25.0	25.1	24.5	26.5	34.8	45.5	58.6	70.1	65.0	39.6	62.5	68.8
		男 M.	20.4	－	－	－	－	－	－	－	－	0.7	4.8	14.2	17.5	19.5	20.4	22.4	30.4	33.8	33.8	31.1	32.7	42.1	50.5	69.9	89.9	97.0	46.4	77.3	91.5
		女 F.	12.4	－	－	－	－	－	－	－	－	0.4	2.8	6.9	9.1	8.8	8.1	10.1	13.7	16.4	16.8	18.4	21.8	29.7	42.3	52.0	60.3	52.4	35.0	54.5	58.2
E116	他殺	総数T.	0.6	4.1	0.6	0.5	0.7	0.9	0.7	1.3	0.6	0.2	0.3	0.6	0.4	0.4	0.6	0.7	0.9	0.6	0.8	0.5	0.4	0.9	0.8	0.9	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7
		男 M.	0.7	3.2	0.5	0.8	0.4	1.1	0.7	1.2	0.7	0.2	0.3	0.7	0.5	0.6	0.6	0.9	1.2	0.9	0.9	0.4	0.5	0.9	0.8	0.6	0.7	1.2	0.7	0.7	0.8
		女 F.	0.5	5.0	0.8	0.2	1.1	0.6	0.7	1.5	0.4	0.2	0.2	0.4	0.4	0.2	0.5	0.4	0.6	0.3	0.6	0.7	0.3	0.8	0.8	1.1	0.7	0.5	0.7	0.9	0.7
E117	その他の外因	総数T.	2.2	3.2	1.1	1.2	0.7	0.6	0.9	1.3	0.1	0.2	0.7	1.3	1.7	1.4	1.6	2.1	3.0	3.1	2.9	3.1	2.9	3.7	5.4	7.4	10.1	9.7	4.7	8.4	10.0
		男 M.	2.9	3.8	1.4	1.5	0.9	0.9	1.1	1.7	0.2	0.4	0.9	1.8	2.3	2.0	2.2	3.0	4.5	4.6	4.2	4.4	3.7	4.3	6.2	8.4	12.0	12.3	5.4	9.7	12.0
		女 F.	1.5	2.5	0.8	0.8	0.6	0.3	0.6	1.0	0.1	0.0	0.6	0.8	1.1	0.8	0.9	1.2	1.6	1.6	1.6	1.9	2.3	3.2	4.9	6.9	9.2	8.7	4.2	7.7	9.0
(再掲) 1－26	感染症及び寄生虫症	総数T.	9.8	12.5	3.5	1.8	1.2	0.6	1.7	3.8	0.6	0.3	0.4	0.7	0.9	1.1	1.3	2.1	3.7	5.8	9.7	15.6	26.2	40.7	66.4	100.5	139.0	199.1	56.9	121.0	154.5
		男 M.	11.9	13.4	3.4	1.7	1.5	0.9	1.8	4.0	0.7	0.2	0.5	0.8	1.1	1.5	1.6	2.8	5.3	8.2	13.6	22.3	40.0	62.3	100.6	149.9	189.9	256.6	80.3	168.9	205.1
		女 F.	7.7	11.6	3.6	1.9	0.9	0.3	1.6	3.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.7	1.0	1.5	2.2	3.5	6.0	9.5	15.9	25.8	43.9	71.4	113.8	176.6	41.2	95.1	130.9
5, 6	結核	総数T.	3.0	－	－	－	－	－	－	－	0.0	－	0.0	0.1	0.1	0.2	0.4	0.6	1.2	2.2	3.2	5.5	9.3	13.9	21.2	31.8	33.9	38.7	17.6	33.0	35.1
		男 M.	4.6	－	－	－	－	－	－	－	0.0	－	－	0.1	0.1	0.3	0.5	1.0	2.1	3.6	5.3	8.8	16.2	25.4	41.3	63.1	66.7	76.1	32.1	65.1	68.8
		女 F.	1.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.4	0.8	1.2	2.5	4.2	5.9	7.9	13.4	17.6	24.1	7.9	15.7	19.4
46, 51－52 54－56	心疾患	総数T.	134.8	14.7	5.7	2.8	2.1	1.6	3.0	5.2	0.9	1.3	2.5	4.1	5.6	8.8	12.1	18.7	32.5	51.5	85.2	140.5	232.0	451.6	926.8	1 834.7	3 430.8	6 175.5	921.4	2 709.9	4 138.5
		男 M.	135.7	14.2	5.4	3.0	1.9	2.3	3.1	5.2	1.0	1.6	3.1	5.9	7.8	12.7	17.9	27.4	49.0	77.2	126.6	200.7	322.2	598.5	1 158.5	2 189.5	3 945.2	6 668.3	1 027.1	3 009.4	4 565.9
		女 F.	134.0	15.3	5.9	2.5	2.3	0.9	2.8	5.2	0.9	1.0	1.9	2.3	3.3	4.8	6.2	9.9	16.2	26.4	45.3	84.8	164.1	350.1	774.2	1 626.0	3 176.0	5 982.4	850.3	2 548.2	3 938.7
62, 63, 66	肺炎及び気管支炎	総数T.	60.7	12.1	5.0	2.9	1.5	1.5	2.7	4.5	0.8	0.6	0.7	0.9	1.0	1.2	1.8	2.1	4.2	7.3	15.7	34.5	72.9	187.7	453.4	997.2	1 916.5	3 508.9	463.5	1 502.4	2 327.0
		男 M.	70.0	15.0	5.0	3.6	1.6	2.0	3.0	5.3	1.1	0.5	0.9	1.0	1.0	1.3	1.8	2.9	6.0	10.4	22.7	51.9	113.4	300.5	725.5	1 538.8	2 856.1	5 051.6	640.3	2 165.9	3 356.5
		女 F.	51.8	9.1	5.1	2.1	1.4	1.1	2.3	3.6	0.5	0.7	0.4	0.8	1.0	1.1	1.8	1.4	2.5	4.3	8.9	18.4	42.4	109.8	274.3	678.5	1 451.0	2 904.4	344.6	1 144.0	1 846.0
4, 72	胃腸炎	総数T.	1.3	1.2	0.5	0.2	0.3	0.1	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.4	0.5	0.9	1.4	2.7	5.2	16.3	42.4	111.3	8.8	32.9	60.1
		男 M.	1.1	1.1	0.5	0.2	0.3	0.1	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.4	0.7	1.5	1.7	2.8	4.8	17.0	46.0	127.7	8.1	33.4	64.6
		女 F.	1.4	1.3	0.5	0.3	0.3	－	0.3	0.5	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	1.2	2.7	5.5	15.9	40.6	104.9	9.2	32.7	58.1
79, 80	妊産婦死亡	女[2] F.	0.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0	0.2	0.9	0.7	0.5	0.2	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

注：1)　0歳は出生10万対の死亡率である。
　　2)　女子人口10万対の死亡率である。