

周産期死亡

〔周産期死亡の年次推移〕
〔Trends of perinatal deaths〕

第8章 周産期死亡

Chapter 8 Perinatal deaths

表8.1 年次別にみた性・妊娠満28週以後の死産—早期新生児死亡別周産期死亡数
Table 8.1 Trends of perinatal deaths by sex : Japan

年次 Year	周産期死亡 Perinatal deaths				妊娠満28週以後の死産 Foetal deaths of 28 weeks and over of gestation				早期新生児死亡 Early neonatal deaths		
	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female
1950 昭和 25 年	108 843	59 467	49 047	329	73 659	39 781	33 549	329	35 184	19 686	15 498
51 26	99 865	54 877	44 758	230	67 221	36 518	30 473	230	32 644	18 359	14 285
52 27	91 527	50 222	41 098	207	62 786	34 095	28 484	207	28 741	16 127	12 614
53 28	85 932	47 403	38 380	149	59 195	32 429	26 617	149	26 737	14 974	11 763
54 29	79 776	44 171	35 476	129	55 502	30 475	24 898	129	24 274	13 696	10 578
1955 30	75 918	42 413	33 394	111	53 297	29 650	23 536	111	22 621	12 763	9 858
56 31	75 706	42 264	33 341	101	53 201	29 521	23 579	101	22 505	12 743	9 762
57 32	70 502	39 478	30 927	97	50 894	28 265	22 532	97	19 608	11 213	8 395
58 33	72 625	40 875	31 647	103	53 385	29 851	23 431	103	19 240	11 024	8 216
59 34	69 912	39 336	30 466	110	51 494	28 678	22 706	110	18 418	10 658	7 760
1960 35	66 552	37 455	28 976	121	49 512	27 664	21 727	121	17 040	9 791	7 249
61 36	65 063	37 004	27 930	129	48 184	27 106	20 949	129	16 879	9 898	6 981
62 37	62 650	35 269	27 229	152	46 408	25 809	20 447	152	16 242	9 460	6 782
63 38	60 049	34 052	25 833	164	44 764	25 145	19 455	164	15 285	8 907	6 378
64 39	56 827	31 982	24 706	139	42 151	23 383	18 629	139	14 676	8 599	6 077
1965 40	54 904	31 049	23 712	143	39 955	22 243	17 569	143	14 949	8 806	6 143
66 41	42 583	23 913	18 534	136	30 818	17 030	13 652	136	11 765	6 883	4 882
67 42	50 846	28 672	22 002	172	36 738	20 407	16 159	172	14 108	8 265	5 843
68 43	45 921	26 048	19 680	193	32 228	17 873	14 162	193	13 693	8 175	5 518
69 44	43 419	24 580	18 621	218	30 609	16 948	13 443	218	12 810	7 632	5 178
1970 45	41 917	23 705	17 999	213	29 107	16 011	12 883	213	12 810	7 694	5 116
71 46	40 900	22 890	17 774	236	28 235	15 419	12 580	236	12 665	7 471	5 194
72 47	38 754	21 977	16 567	210	26 329	14 459	11 660	210	12 425	7 518	4 907
73 48	37 598	21 190	16 174	234	25 442	13 934	11 274	234	12 156	7 256	4 900
74 49	34 383	19 332	14 835	216	22 989	12 496	10 277	216	11 394	6 836	4 558
1975 50	30 513	16 996	13 326	191	20 268	10 991	9 086	191	10 245	6 005	4 240
76 51	27 133	15 180	11 791	162	17 741	9 550	8 029	162	9 392	5 630	3 762
77 52	24 708	13 704	10 851	153	16 022	8 581	7 288	153	8 686	5 123	3 563
78 53	22 217	12 391	9 667	159	14 516	7 837	6 520	159	7 701	4 554	3 147
79 54	20 481	11 303	9 016	162	13 580	7 266	6 152	162	6 901	4 037	2 864
1980 55	18 385	10 097	8 123	165	12 231	6 488	5 578	165	6 154	3 609	2 545
81 56	16 531	9 015	7 382	134	10 929	5 791	5 004	134	5 602	3 224	2 378
82 57	15 303	8 378	6 781	144	10 236	5 432	4 660	144	5 067	2 946	2 121
83 58	14 035	7 558	6 368	109	9 464	4 966	4 389	109	4 571	2 592	1 979
84 59	12 998	7 077	5 807	114	8 724	4 642	3 968	114	4 274	2 435	1 839
1985 60	11 470	6 059	5 299	112	7 733	3 992	3 629	112	3 737	2 067	1 670
86 61	10 148	5 362	4 678	108	6 902	3 522	3 272	108	3 246	1 840	1 406
87 62	9 317	5 018	4 206	93	6 252	3 292	2 867	93	3 065	1 726	1 339

Perinatal deaths

表8.2 年次別にみた性・妊娠満28週以後の死産—早期新生児死亡別周産期死亡率¹⁾
(出生千対)
Table 8.2 Trends of perinatal death rates (per 1,000 live births) : Japan

年次 Year	周産期死亡率 Perinatal death rates				妊娠満28週以後の死産比 Foetal death ratio of 28 weeks and over of gestation				早期新生児死亡率 Early neonatal death rates		
	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female
1950 昭和 25 年	46.6	49.4	43.2	...	31.5	33.1	29.6	...	15.1	16.4	13.7
51 26	46.7	50.1	42.9	...	31.4	33.4	29.2	...	15.3	16.8	13.7
52 27	45.6	48.9	42.1	...	31.3	33.2	29.2	...	14.3	15.7	12.9
53 28	46.0	49.5	42.2	...	31.7	33.9	29.2	...	14.3	15.6	12.9
54 29	45.1	48.5	41.3	...	31.4	33.4	29.0	...	13.7	15.0	12.3
1955 30	43.9	47.7	39.7	...	30.8	33.3	28.0	...	13.1	14.3	11.7
56 31	45.5	49.4	41.2	...	31.9	34.5	29.1	...	13.5	14.9	12.1
57 32	45.0	49.0	40.6	...	32.5	35.1	29.6	...	12.5	13.9	11.0
58 33	43.9	48.2	39.3	...	32.3	35.2	29.1	...	11.6	13.0	10.2
59 34	43.0	47.1	38.6	...	31.7	34.3	28.7	...	11.3	12.8	9.8
1960 35	41.4	45.4	37.1	...	30.8	33.5	27.8	...	10.6	11.9	9.3
61 36	40.9	45.3	36.2	...	30.3	33.2	27.1	...	10.6	12.1	9.0
62 37	38.7	42.3	34.7	...	28.7	31.0	26.0	...	10.0	11.4	8.6
63 38	36.2	39.9	32.0	...	27.0	29.5	24.1	...	9.2	10.4	7.9
64 39	33.1	36.2	29.6	...	24.6	26.5	22.3	...	8.5	9.7	7.3
1965 40	30.1	33.2	26.7	...	21.9	23.8	19.8	...	8.2	9.4	6.9
66 41	31.3	33.9	28.3	...	22.6	24.1	20.8	...	8.6	9.8	7.4
67 42	26.3	28.9	23.3	...	19.0	20.6	17.1	...	7.3	8.3	6.2
68 43	24.5	26.9	21.8	...	17.2	18.5	15.7	...	7.3	8.4	6.1
69 44	23.0	25.1	20.4	...	16.2	17.3	14.7	...	6.8	7.8	5.7
1970 45	21.7	23.7	19.3	...	15.0	16.0	13.8	...	6.6	7.7	5.5
71 46	20.4	22.2	18.4	...	14.1	14.9	13.0	...	6.3	7.2	5.4
72 47	19.0	20.9	16.8	...	12.9	13.8	11.8	...	6.1	7.2	5.0
73 48	18.0	19.7	15.9	...	12.2	12.9	11.1	...	5.8	6.7	4.8
74 49	16.9	18.5	15.1	...	11.3	11.9	10.4	...	5.6	6.5	4.6
1975 50	16.0	17.4	14.4	...	10.7	11.2	9.9	...	5.4	6.1	4.6
76 51	14.8	16.1	13.3	...	9.7	10.1	9.0	...	5.1	6.0	4.2
77 52	14.1	15.2	12.7	...	9.1	9.5	8.6	...	4.9	5.7	4.2
78 53	13.0	14.1	11.7	...	8.5	8.9	7.9	...	4.5	5.2	3.8
79 54	12.5	13.4	11.3	...	8.3	8.6	7.7	...	4.2	4.8	3.6
1980 55	11.7	12.4	10.6	...	7.8	8.0	7.3	...	3.9	4.4	3.3
81 56	10.8	11.5	9.9	...	7.1	7.4	6.7	...	3.7	4.1	3.2
82 57	10.1	10.8	9.2	...	6.8	7.0	6.3	...	3.3	3.8	2.9
83 58	9.3	9.7	8.7	...	6.3	6.4	6.0	...	3.0	3.3	2.7
84 59	8.7	9.3	8.0	...	5.9	6.1	5.5	...	2.9	3.2	2.5
1985 60	8.0	8.2	7.6	...	5.4	5.4	5.2	...	2.6	2.8	2.4
86 61	7.3	7.5	7.0	...	5.0	5.0	4.9	...	2.3	2.6	2.1
87 62	6.9	7.2	6.4	...	4.6	4.8	4.4	...	2.3	2.5	2.0

注： 1) 周産期死亡率のうち、妊娠満28週以後の死産については妊娠満28週以後の死産比という。