

1)
表 5.26 悪性新生物の主要部位別にみた性・

男(6-1) 29(B19-b)胃

年 齢	昭和25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	*55年	56年	57年	58年	59年
総 数	46.6	52.2	57.3	59.4	58.8	55.6	53.5	54.1	53.9	53.6	51.7	52.4	52.5
0 ~ 4歳	0.1	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
5 ~ 9	0.1	0.0	—	—	—	—	0.0	0.0	—	0.0	—	—	—
10 ~ 14	0.2	—	0.0	0.0	—	0.0	—	0.0	—	—	—	—	0.0
15 ~ 19	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.3	0.2
20 ~ 24	0.7	0.7	1.1	1.6	1.4	1.3	1.0	0.9	0.7	0.8	0.7	0.7	0.5
25 ~ 29	2.3	2.8	3.1	3.8	3.6	3.0	2.6	3.1	2.3	2.0	2.2	2.4	2.3
30 ~ 34	7.0	7.0	8.0	8.5	8.4	6.7	5.8	5.2	5.7	5.7	5.3	4.7	4.8
35 ~ 39	15.1	17.0	17.0	16.4	15.3	13.4	12.1	10.9	11.5	10.5	9.3	9.1	9.6
40 ~ 44	35.8	36.7	34.7	28.6	27.8	24.4	21.1	20.8	19.3	19.2	19.0	17.7	16.7
45 ~ 49	69.6	73.4	67.2	58.8	52.4	45.0	40.4	40.0	39.4	36.9	34.9	36.1	30.6
50 ~ 54	128.3	128.0	121.9	110.5	93.3	74.0	69.6	70.8	69.8	66.9	61.3	65.0	61.2
55 ~ 59	219.3	211.3	206.2	189.9	159.2	139.5	121.3	114.9	105.5	108.2	103.5	101.9	102.5
60 ~ 64	324.6	336.2	317.8	307.2	267.8	218.3	197.2	194.0	186.4	179.3	167.6	159.4	159.5
65 ~ 69	435.3	456.4	467.2	449.8	412.0	341.1	298.0	288.7	289.0	274.4	260.9	250.0	243.7
70 ~ 74	463.6	546.2	597.8	568.1	545.1	489.1	429.6	422.5	417.0	402.5	371.4	360.2	346.6
75 ~ 79	397.1	509.3	607.6	666.1	640.1	602.0	575.6	585.8	560.7	536.3	507.5	496.8	489.9
80 ~	260.6	330.9	449.9	499.2	539.0	607.6	591.8	612.8	607.1	616.3	589.8	612.7	627.8

女(8-1) 29(B19-b)胃

年 齢	昭和25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	*55年	56年	57年	58年	59年
総 数	28.8	31.7	34.6	35.5	36.7	34.4	33.4	33.8	33.2	32.3	31.7	31.1	31.1
0 ~ 4歳	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 ~ 9	0.1	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 ~ 14	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	0.0	—	—	—	—	0.0	0.0
15 ~ 19	0.2	0.2	0.2	0.2	0.5	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2
20 ~ 24	1.0	1.0	1.3	1.4	1.6	1.4	1.0	1.2	1.1	1.1	0.7	1.1	0.9
25 ~ 29	3.4	3.1	3.7	4.7	5.2	4.6	4.1	4.0	4.0	4.1	3.3	3.1	3.4
30 ~ 34	8.5	8.7	10.3	10.5	9.2	10.1	9.3	7.9	8.1	7.9	7.6	7.0	7.1
35 ~ 39	15.5	17.7	18.2	17.9	16.0	15.0	14.2	13.8	13.5	12.8	12.4	11.7	11.7
40 ~ 44	29.7	29.9	31.2	26.5	25.7	21.4	19.4	21.1	17.9	17.7	17.1	17.0	15.9
45 ~ 49	45.4	44.0	45.0	42.2	37.8	31.2	27.8	26.3	24.8	25.9	23.1	22.4	22.5
50 ~ 54	69.8	69.3	64.7	63.9	53.9	45.1	38.7	37.0	35.6	33.0	32.6	33.5	30.1
55 ~ 59	108.7	104.8	96.7	88.6	82.5	64.0	56.7	54.6	52.9	50.5	46.8	46.2	42.1
60 ~ 64	158.3	153.6	142.1	128.9	119.6	97.2	83.8	79.5	80.9	71.7	71.8	65.2	62.6
65 ~ 69	219.4	223.0	208.7	192.9	177.0	145.6	126.4	123.4	116.5	108.0	102.2	98.1	93.9
70 ~ 74	235.0	264.2	282.8	275.0	253.0	211.3	191.7	188.4	173.9	162.5	154.8	143.8	138.3
75 ~ 79	229.4	284.1	321.3	316.1	317.2	279.0	262.5	270.9	250.9	240.9	222.5	200.7	208.2
80 ~	160.0	228.3	286.5	286.1	300.1	297.9	293.4	301.6	302.7	297.7	288.8	290.2	290.7

注: 1) 表頭の死因名等は第9回簡単分類による。なお、()内は第8回B分類番号である。

2) 31肝臓の昭和25年、30年は、「胆路および肝臓」である。

*55年は、「国勢調査確定数」により再計算したものである。(以下同様)

年齢・年次別死亡率(人口10万対)

男(6-2) 30直腸、直腸S状結腸移行部及び肛門

年 齢	昭和25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	*55年	56年	57年	58年	59年
総 数	2.9	3.1	3.2	4.1	5.0	5.8	6.2	6.8	6.9	7.2	7.1	7.4	7.6
0 ~ 4歳	—	0.0	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 ~ 9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 ~ 14	—	0.0	—	0.0	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—
15 ~ 19	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	—	0.0	0.0	—	0.0	0.0
20 ~ 24	0.1	0.1	0.2	0.6	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1
25 ~ 29	0.6	0.3	0.1	0.5	1.1	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2	0.3
30 ~ 34	0.8	0.6	0.7	0.9	1.2	1.5	1.3	0.8	0.9	0.9	0.7	0.7	0.7
35 ~ 39	1.3	1.2	0.6	1.0	2.1	2.2	2.3	2.1	2.1	1.9	1.3	1.8	1.7
40 ~ 44	1.9	2.3	2.0	1.9	2.8	3.2	3.5	3.0	3.6	2.8	2.4	2.8	3.2
45 ~ 49	4.8	3.8	2.7	4.2	4.4	4.9	5.1	6.4	6.0	5.6	5.7	6.4	5.4
50 ~ 54	7.0	4.9	4.9	6.4	7.1	6.4	8.5	9.1	9.2	9.7	10.0	9.6	9.5
55 ~ 59	11.5	9.6	8.9	10.7	12.0	12.2	11.3	14.8	12.0	14.9	13.7	15.6	15.4
60 ~ 64	17.8	17.2	17.4	17.7	19.2	19.9	19.7	19.8	19.9	20.6	21.7	19.2	22.6
65 ~ 69	25.0	25.8	23.6	29.3	30.5	32.2	29.5	31.8	32.4	32.8	30.4	30.6	32.4
70 ~ 74	34.4	39.2	41.1	39.5	44.1	47.2	47.5	50.3	51.9	48.8	46.7	47.1	45.9
75 ~ 79	38.5	46.2	44.6	52.9	59.5	65.6	67.3	68.2	69.6	71.7	69.7	67.9	68.8
80 ~	19.3	37.0	46.5	67.5	69.4	79.8	85.6	92.6	94.2	96.3	97.9	95.4	92.7

女(8-2) 30直腸、直腸S状結腸移行部及び肛門

年 齢	昭和25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	*55年	56年	57年	58年	59年
総 数	2.5	2.8	3.2	3.6	4.1	4.9	5.0	5.2	5.0	5.3	5.3	5.5	5.5
0 ~ 4歳	0.0	0.0	0.0	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—
5 ~ 9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0
10 ~ 14	—	—	0.0	0.0	—	—	0.0	—	0.0	—	—	—	—
15 ~ 19	—	0.1	0.1	—	0.0	—	—	—	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1
20 ~ 24	0.1	0.2	0.1	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
25 ~ 29	0.4	0.3	0.3	0.6	0.9	0.4	0.5	0.3	0.3	0.1	0.3	0.1	0.1
30 ~ 34	1.0	0.3	0.5	0.9	1.3	1.3	1.0	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6
35 ~ 39	1.7	1.1	1.1	1.2	1.6	2.0	1.6	1.8	1.7	1.8	1.5	1.2	1.1
40 ~ 44	3.0	2.9	2.0	2.3	2.3	2.6	2.9	2.7	2.8	2.6	2.4	2.4	3.2
45 ~ 49	4.5	3.5	4.0	3.9	3.3	4.3	4.1	4.1	4.0	3.8	3.7	4.0	4.4
50 ~ 54	6.9	6.7	6.0	5.6	7.0	6.1	6.3	6.1	6.0	5.8	5.8	6.5	6.4
55 ~ 59	10.2	10.1	9.6	9.2	8.3	9.6	8.4	8.6	7.9	8.5	7.5	8.2	8.5
60 ~ 64	12.6	13.5	13.3	11.6	11.9	12.3	12.0	13.4	11.4	11.7	11.7	12.5	12.1
65 ~ 69	18.2	17.1	18.5	19.9	19.4	18.8	18.2	18.3	15.8	17.3	17.0	17.7	17.2
70 ~ 74	18.6	21.8	29.0	28.5	27.1	30.8	25.5	27.2	26.5	27.1	26.9	22.1	22.6
75 ~ 79	15.3	27.2	33.7	36.5	41.8	41.0	42.1	41.8	40.8	38.8	37.0	40.1	32.5
80 ~	15.8	23.0	28.1	37.1	42.4	53.3	52.3	55.5	53.6	56.9	54.4	56.1	54.5

1)
表 5.26 悪性新生物の主要部位別にみた性・

男(6-3) 31(B19-c)肝

年 齢	昭和25年 ²⁾	30年 ²⁾	35年	40年	45年	50年	53年	54年	※55年	56年	57年	58年	59年
総 数	8.8	11.1	11.3	10.4	11.7	12.4	15.5	16.7	17.5	18.5	20.1	21.6	22.7
0 ~ 4歳	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4
5 ~ 9	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
10 ~ 14	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	—	0.0	—	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
15 ~ 19	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
20 ~ 24	0.2	0.2	0.4	0.2	0.3	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2
25 ~ 29	0.3	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.6	0.5	0.4	0.3	0.5	0.3	0.3
30 ~ 34	1.4	1.4	1.1	0.9	0.9	1.4	1.4	1.2	1.3	1.4	1.4	1.3	1.4
35 ~ 39	2.5	3.7	2.4	2.8	3.1	2.6	2.7	3.0	3.1	3.6	3.1	2.7	3.5
40 ~ 44	7.4	7.7	6.3	6.3	6.5	6.9	7.6	7.2	6.5	6.8	6.7	7.1	6.6
45 ~ 49	13.4	16.1	12.5	13.1	12.5	13.5	19.5	20.8	21.0	19.9	22.3	19.7	19.6
50 ~ 54	27.0	28.7	28.6	20.5	23.7	23.4	29.0	33.4	38.1	40.1	45.2	45.6	48.5
55 ~ 59	38.9	43.1	42.6	33.0	37.4	38.9	47.9	48.4	51.5	54.9	59.3	65.4	68.5
60 ~ 64	61.6	69.7	64.1	53.3	51.0	51.0	63.2	69.1	72.0	70.5	72.1	76.5	79.2
65 ~ 69	79.8	94.6	83.9	71.7	77.2	74.1	81.1	83.6	82.4	91.6	93.1	95.5	101.7
70 ~ 74	79.6	114.7	115.3	90.0	94.5	92.3	102.9	104.2	110.4	107.5	117.0	123.8	119.8
75 ~ 79	84.4	110.8	127.2	114.9	115.5	101.0	118.8	125.8	118.8	125.9	129.4	142.8	139.6
80 ~	51.5	89.1	84.7	112.7	111.7	111.7	117.2	129.3	129.2	126.8	137.1	154.4	159.9

女(8-3) 31(B19-c)肝

年 齢	昭和25年 ²⁾	30年 ²⁾	35年	40年	45年	50年	53年	54年	※55年	56年	57年	58年	59年
総 数	6.1	8.1	7.6	7.0	6.9	6.7	7.4	7.5	7.6	8.0	8.1	8.4	8.7
0 ~ 4歳	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.5	0.3	0.3	0.0
5 ~ 9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	—	0.0	0.0
10 ~ 14	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1
15 ~ 19	—	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
20 ~ 24	0.1	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1
25 ~ 29	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2
30 ~ 34	1.0	1.3	0.7	0.9	0.7	0.3	0.6	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
35 ~ 39	1.5	2.4	2.0	1.5	1.3	1.2	1.0	0.7	1.1	0.9	0.9	1.0	0.7
40 ~ 44	4.8	5.6	4.3	3.0	2.7	2.4	2.2	1.8	2.1	1.5	1.7	1.5	1.5
45 ~ 49	8.2	10.5	7.9	6.5	5.3	4.5	4.1	4.1	3.6	4.4	3.4	3.1	3.2
50 ~ 54	15.9	18.0	13.1	11.0	9.4	7.8	7.1	7.6	6.5	7.3	7.4	7.6	6.9
55 ~ 59	23.2	26.5	20.8	18.0	15.7	13.1	13.6	14.0	13.0	12.3	12.7	13.2	12.5
60 ~ 64	37.6	43.3	36.7	28.3	24.0	20.9	21.9	22.4	20.4	21.8	21.4	22.3	22.7
65 ~ 69	47.1	60.6	49.8	45.4	37.5	32.9	33.4	31.8	31.9	31.9	32.5	31.9	33.4
70 ~ 74	52.1	76.9	70.0	57.5	54.0	47.5	47.5	45.8	47.9	48.2	45.8	47.2	44.2
75 ~ 79	56.9	78.5	80.3	74.8	71.6	59.6	66.0	61.5	63.7	65.1	62.4	63.5	64.9
80 ~	37.7	56.3	69.4	60.5	61.1	62.4	67.8	72.1	69.7	75.5	76.2	72.1	80.4

注：1), 2) 222 ページ同番号の注を参照されたい。

年齢・年次別死亡率(人口10万対) (つづき)

男(6-4) 32(B19-d)肺

年 齢	昭和25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	※55年	56年	57年	58年	59年
総 数	0.8	1.4	2.5	3.6	5.1	5.8	6.9	7.3	7.8	8.3	8.7	8.9	9.2
0 ~ 4歳	—	0.0	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—
5 ~ 9	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—
10 ~ 14	0.0	—	—	—	0.1	0.0	—	—	—	—	—	—	—
15 ~ 19	—	—	0.0	0.1	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
20 ~ 24	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0
25 ~ 29	—	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1
30 ~ 34	0.3	0.3	0.3	0.6	0.6	0.4	0.6	0.6	0.4	0.6	0.6	0.4	0.7
35 ~ 39	0.6	0.6	0.9	0.9	1.4	1.1	1.4	1.4	1.4	1.0	1.4	1.1	1.2
40 ~ 44	1.4	1.5	1.9	1.9	2.4	2.2	2.8	3.0	3.1	2.6	2.3	2.5	2.2
45 ~ 49	1.7	2.3	4.4	4.5	4.2	5.2	5.8	5.3	6.1	5.6	5.0	4.9	5.1
50 ~ 54	2.7	5.0	6.6	9.1	10.1	9.7	10.5	9.7	10.9	12.2	9.8	11.2	10.5
55 ~ 59	4.7	7.0	11.1	13.4	18.2	17.0	17.4	18.4	19.1	18.8	19.4	19.8	18.6
60 ~ 64	6.2	9.3	13.9	20.6	25.7	26.6	26.6	30.6	32.3	28.9	32.5	31.6	32.3
65 ~ 69	4.0	11.8	20.4	25.5	36.9	38.8	45.0	45.9	45.2	49.8	48.8	50.5	48.2
70 ~ 74	3.7	9.9	17.3	30.2	42.6	47.6	55.8	57.5	57.6	63.3	64.8	69.2	68.1
75 ~ 79	1.5	5.6	19.6	28.5	35.2	52.0	63.3	63.3	71.2	76.2	82.8	80.2	81.2
80 ~	2.4	2.3	8.9	20.3	32.0	38.9	51.0	57.6	64.1	67.8	78.9	71.8	83.9

女(8-4) 32(B19-d)肺

年 齢	昭和25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	※55年	56年	57年	58年	59年
総 数	0.5	1.1	1.7	2.6	3.5	4.4	5.0	5.2	5.7	5.9	6.2	6.7	6.7
0 ~ 4歳	—	0.0	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	0.0
5 ~ 9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0
10 ~ 14	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—
15 ~ 19	—	—	0.0	0.0	—	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	—	—
20 ~ 24	0.1	—	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	—	0.1	—	—	0.1
25 ~ 29	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1
30 ~ 34	0.2	0.2	0.4	0.3	0.5	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.1	0.3
35 ~ 39	0.3	0.7	0.4	0.5	0.8	0.6	0.7	0.9	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7
40 ~ 44	0.6	1.5	1.3	1.7	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3	1.6	1.3	1.5	1.4
45 ~ 49	1.0	1.8	2.6	3.0	2.9	3.5	3.0	2.9	3.0	2.9	2.8	3.1	2.7
50 ~ 54	1.1	2.6	5.0	5.3	5.9	6.6	4.9	5.5	5.9	5.8	5.5	6.2	5.4
55 ~ 59	3.0	5.0	7.4	10.3	9.4	10.0	10.8	9.5	9.3	10.0	10.7	10.6	8.9
60 ~ 64	3.3	5.4	8.2	14.0	15.6	15.5	17.2	16.7	17.7	16.1	17.0	16.8	16.0
65 ~ 69	2.4	8.1	12.7	17.2	21.2	23.2	25.1	25.4	26.7	25.5	26.6	26.8	28.0
70 ~ 74	1.6	5.8	11.6	15.9	27.2	31.0	35.1	35.8	40.3	38.1	38.8	37.8	38.7
75 ~ 79	1.4	5.1	9.5	18.5	26.9	36.6	37.0	41.3	42.1	45.9	50.0	51.6	52.8
80 ~	1.2	2.9	5.4	9.5	15.1	24.6	33.9	34.3	39.6	44.2	46.1	55.9	55.3

1)
表 5.26 悪性新生物の主要部位別にみた性・

男(6-5) 33(B19-e)気管、気管支及び肺

年 齢	昭和25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	*55年	56年	57年	58年	59年
総 数	1.9	4.3	7.9	11.2	14.9	19.6	23.8	25.7	27.0	28.9	30.2	31.9	33.8
0 ~ 4歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0
5 ~ 9	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0
10 ~ 14	0.1	0.1	—	0.1	—	—	—	0.0	0.0	—	0.0	0.0	—
15 ~ 19	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0
20 ~ 24	0.1	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1
25 ~ 29	0.2	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4
30 ~ 34	0.1	0.5	0.7	0.8	0.8	0.9	1.0	0.9	0.9	1.1	1.3	1.1	1.2
35 ~ 39	0.4	0.8	1.1	1.8	1.6	1.9	1.7	2.3	2.5	2.2	2.1	2.4	2.7
40 ~ 44	0.9	2.0	2.7	3.6	4.6	4.9	4.6	4.6	5.0	5.2	4.9	4.2	5.3
45 ~ 49	2.1	4.9	7.7	8.5	8.5	11.4	11.5	12.0	11.2	11.5	11.3	11.1	10.7
50 ~ 54	4.9	10.1	15.8	18.7	20.2	20.8	22.7	23.5	26.4	25.6	25.8	26.7	27.3
55 ~ 59	7.7	15.5	30.5	32.0	40.9	43.9	45.6	48.7	48.8	49.1	51.4	54.4	53.8
60 ~ 64	13.7	29.5	46.5	66.3	72.1	79.7	90.5	90.7	96.0	95.1	95.2	97.3	102.2
65 ~ 69	21.9	43.2	71.4	93.1	125.9	139.4	154.9	159.1	157.2	170.2	174.4	172.5	180.9
70 ~ 74	20.4	51.5	86.9	118.5	156.5	210.5	241.6	252.3	252.7	267.9	269.7	272.1	275.7
75 ~ 79	21.3	36.3	81.8	126.1	158.0	238.3	287.6	318.4	329.1	346.4	355.2	371.8	386.9
80 ~	7.2	24.3	55.9	87.0	112.0	173.4	247.5	271.8	298.3	322.7	342.7	377.9	395.5

女(8-5) 33(B19-e)気管、気管支及び肺

年 齢	昭和25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	*55年	56年	57年	58年	59年
総 数	0.8	1.8	3.2	4.6	5.7	7.2	8.8	9.1	9.9	10.3	11.1	11.6	12.3
0 ~ 4歳	—	0.0	0.0	—	—	0.0	0.0	—	0.0	0.0	—	—	—
5 ~ 9	—	0.1	0.0	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—
10 ~ 14	0.1	0.0	0.0	—	0.0	—	0.0	0.0	—	0.0	—	—	—
15 ~ 19	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	0.1
20 ~ 24	0.0	0.1	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
25 ~ 29	0.1	0.2	0.1	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	0.2	0.3	0.4
30 ~ 34	0.2	0.6	0.8	0.9	0.8	0.7	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1.1
35 ~ 39	0.4	1.1	1.3	1.8	1.2	1.7	1.4	1.6	1.7	1.9	1.8	1.9	1.5
40 ~ 44	0.8	1.9	1.8	2.7	2.9	2.4	3.1	2.6	2.9	3.8	3.6	3.4	3.3
45 ~ 49	1.1	3.0	4.9	3.9	5.2	5.4	5.3	6.0	5.1	4.9	5.4	5.4	6.0
50 ~ 54	2.7	4.4	6.4	9.3	8.0	9.4	9.1	8.4	9.6	8.6	9.2	9.3	10.2
55 ~ 59	3.6	6.6	10.5	14.1	14.2	15.9	14.9	15.9	15.9	15.9	15.9	14.7	16.5
60 ~ 64	4.1	9.4	16.7	20.7	24.7	23.3	26.4	24.6	27.4	26.7	27.1	27.0	26.3
65 ~ 69	5.0	13.2	22.1	27.8	32.4	35.8	39.6	41.3	42.1	43.5	42.9	43.9	45.0
70 ~ 74	5.9	14.1	23.3	35.9	41.1	51.1	60.5	58.5	63.7	62.4	70.8	68.6	67.1
75 ~ 79	4.5	9.4	25.4	41.8	46.1	58.5	74.5	76.2	84.4	84.5	88.1	93.8	95.7
80 ~	2.8	5.9	18.6	26.7	40.1	53.8	74.2	77.8	82.6	91.7	96.3	103.6	112.2

注：1) 222ページの注を参照されたい。

年齢・年次別死亡率(人口10万対) (つづき)

男(6-6) 36(B19-h)白血病

年 齢	昭和25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	*55年	56年	57年	58年	59年
総 数	1.8	2.8	3.2	3.7	4.0	4.2	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.8	5.0
0 ~ 4歳	2.4	4.1	4.5	4.4	4.6	3.9	2.9	2.8	2.8	2.7	2.3	2.0	1.9
5 ~ 9	1.5	2.8	2.9	3.7	3.5	3.5	3.6	3.0	3.3	3.1	2.6	2.7	2.3
10 ~ 14	1.5	2.3	2.8	3.0	2.3	2.3	2.1	2.4	2.6	2.7	1.9	2.1	2.1
15 ~ 19	1.7	2.5	2.8	3.3	3.2	2.8	2.8	3.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.0
20 ~ 24	1.2	2.1	2.4	2.7	2.4	2.6	1.7	2.3	2.0	1.9	2.3	1.9	2.0
25 ~ 29	1.3	2.3	2.2	2.6	2.7	2.4	2.7	2.5	2.8	2.0	2.0	2.8	2.0
30 ~ 34	1.7	2.2	2.4	2.4	2.9	3.4	3.2	3.2	2.4	3.0	2.4	3.1	2.7
35 ~ 39	1.7	2.6	2.5	3.2	3.4	3.5	3.2	3.5	3.5	3.1	3.3	3.2	3.1
40 ~ 44	1.9	3.4	3.5	3.0	3.9	4.0	3.7	3.9	4.0	4.2	3.8	3.3	4.1
45 ~ 49	2.1	3.0	3.7	4.6	5.1	4.9	4.6	4.7	4.9	5.2	4.8	4.0	4.8
50 ~ 54	2.3	2.8	4.0	4.9	5.1	5.6	5.0	5.3	5.7	5.5	6.6	6.1	7.7
55 ~ 59	1.9	3.3	5.4	5.2	6.2	6.4	7.9	7.2	7.1	7.1	7.8	7.3	8.2
60 ~ 64	2.5	3.2	4.6	7.1	7.5	8.5	8.5	10.4	8.4	9.4	11.1	10.1	10.5
65 ~ 69	2.0	3.0	5.0	7.0	9.0	10.2	13.8	10.8	12.5	13.3	15.5	14.7	14.4
70 ~ 74	0.7	2.9	5.6	5.2	9.7	11.7	14.3	15.5	16.8	16.1	17.7	17.5	20.4
75 ~ 79	1.9	1.8	3.2	5.1	8.0	13.1	19.2	19.5	19.6	22.2	23.4	22.2	22.5
80 ~	0.8	0.6	3.5	2.3	3.9	9.3	15.7	14.7	20.1	21.0	19.1	23.2	22.8

女(8-6) 36(B19-h)白血病

年 齢	昭和25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	*55年	56年	57年	58年	59年
総 数	1.2	1.8	2.4	2.8	3.0	3.3	3.2	3.4	3.3	3.3	3.5	3.5	3.7
0 ~ 4歳	2.0	2.7	3.7	3.5	3.6	3.1	2.9	2.1	2.0	1.7	1.5	1.8	1.5
5 ~ 9	1.0	1.8	2.2	2.7	2.8	2.7	2.1	2.6	2.3	2.1	2.1	1.6	1.8
10 ~ 14	1.1	1.8	2.1	2.4	2.3	1.9	2.0	1.9	1.9	1.7	1.8	1.4	1.8
15 ~ 19	1.0	1.4	2.0	2.6	2.3	2.2	1.9	1.9	2.2	1.5	1.8	1.8	1.9
20 ~ 24	1.0	1.4	2.1	1.8	2.0	2.0	1.4	1.4	1.7	2.1	1.5	1.4	1.8
25 ~ 29	1.1	1.9	1.7	2.0	1.8	2.1	1.8	2.0	1.5	1.6	1.7	1.7	1.2
30 ~ 34	0.7	1.2	2.6	2.1	1.6	2.5	2.1	1.9	2.2	2.2	2.4	2.1	2.4
35 ~ 39	1.3	1.7	2.4	2.8	2.7	2.4	2.4	2.1	2.5	2.6	2.3	2.5	2.3
40 ~ 44	1.0	2.3	2.6	2.9	3.0	3.1	2.9	3.6	3.4	2.8	2.8	2.6	2.9
45 ~ 49	1.5	2.2	3.3	3.3	4.2	3.5	3.8	3.8	3.3	3.5	3.1	3.9	3.6
50 ~ 54	1.6	1.9	2.3	3.7	2.9	4.1	3.8	3.6	4.5	4.1	3.8	4.5	4.5
55 ~ 59	1.2	2.3	2.9	4.1	5.6	5.6	4.6	5.2	4.3	4.9	5.6	5.5	6.0
60 ~ 64	1.4	1.9	2.9	4.6	5.1	5.4	5.9	7.1	6.0	6.4	5.9	6.6	5.5
65 ~ 69	1.1	1.7	3.3	3.8	5.2	6.8	6.4	7.3	7.2	7.6	7.6	8.9	9.1
70 ~ 74	0.8	1.3	1.8	3.3	5.5	6.4	8.6	9.1	8.4	8.5	10.7	9.1	11.6
75 ~ 79	—	0.4	2.2	3.1	2.6	8.6	9.5	10.4	9.4	11.0	13.5	10.8	13.0
80 ~	—	—	0.7	0.8	2.3	4.3	5.9	7.9	7.8	8.6	10.3	10.9	13.1

1)
表 5.26 悪性新生物の主要部位別にみた性・

女(8-7) 34(B19-f)乳 房

年 齢	昭和25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	*55年	56年	57年	58年	59年
総 数	3.3	3.5	3.5	3.9	4.8	5.8	6.5	6.6	7.0	7.3	7.2	7.3	7.9
0 ~ 4歳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 ~ 9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 ~ 14	—	0.0	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—
15 ~ 19	—	0.0	0.0	0.0	—	—	0.0	—	—	—	—	0.0	0.0
20 ~ 24	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
25 ~ 29	0.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.8	0.7	1.0	1.0	0.7	0.7	0.8
30 ~ 34	1.8	1.8	1.6	1.7	2.0	2.3	2.6	2.5	2.5	2.8	2.7	2.9	2.8
35 ~ 39	3.6	4.3	4.1	4.0	4.2	4.6	4.9	5.0	5.5	5.0	5.2	5.3	5.4
40 ~ 44	7.0	6.4	6.4	6.8	7.3	8.6	8.0	8.9	8.6	8.4	8.5	8.7	9.3
45 ~ 49	9.0	8.7	9.5	9.4	10.7	12.3	12.6	12.9	13.3	13.4	11.8	12.8	13.8
50 ~ 54	10.9	10.1	9.6	12.6	13.1	17.1	16.8	16.5	17.2	18.4	16.7	16.4	18.5
55 ~ 59	13.6	11.6	11.5	12.6	14.3	16.4	18.3	19.8	19.9	20.5	20.5	18.7	21.9
60 ~ 64	15.2	13.6	10.3	11.9	14.0	15.8	17.3	16.2	17.2	21.1	19.4	19.9	19.3
65 ~ 69	15.0	14.7	11.9	12.9	12.6	14.6	17.6	16.9	18.2	17.3	18.5	17.4	18.0
70 ~ 74	14.8	16.9	15.6	12.6	15.2	14.8	15.8	17.1	18.0	17.6	17.5	16.0	18.2
75 ~ 79	17.0	18.4	17.8	12.7	14.2	15.4	17.5	16.0	18.2	17.4	16.4	17.8	18.6
80 ~	15.4	19.5	23.6	18.2	25.5	20.3	22.3	20.8	21.2	21.2	21.4	23.1	22.0

注：1) 222 ページの注を参照されたい。

表 5.27 悪性新生物の主要部位別にみた性・

総 数

基本分類番号	死 因	昭和10年	15年	22年	25年	30年	35年	40年	45年	46年
140-208	悪 性 新 生 物	72.3	70.3	68.4	76.1	81.4	87.3	87.6	86.1	85.4
140-149	口 唇 , 口 腔 及 び 咽 頭	1.1	1.1	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8
150-159	消 化 器 及 び 腹 膜	51.0	50.1	47.9	53.5	57.6	60.3	59.2	50.1	49.6
150	食 道	3.9	3.6	3.1	3.2	3.1	3.2	3.2	3.3	3.3
151	胃	34.6	33.7	32.9	36.9	38.9	39.4	37.6	34.3	33.7
152, 153	十 二 指 腸 , 小 腸 及 び 結 腸	—	—	1.6	1.9	1.8	2.1	2.4	2.8	3.0
153	結 腸	—	—	—	1.7	1.7	1.9	2.3	2.7	2.8
154	直腸, 直腸S状結腸移行部及び肛門	2.2	2.3	2.4	2.7	2.7	2.7	3.1	3.3	3.4
155, 199, 1C	肝	7.9	8.1	6.8	7.3	8.9	8.1	6.9	6.7	6.7
156	胆 囊 及 び 肝 外 胆 管	—	—	—	—	—	1.1	1.6	2.2	2.3
157	脾	0.3	0.3	0.3	0.6	1.2	1.8	2.5	3.1	3.1
160-165	呼 吸 器 及 び 胸 腔 内 臓 器	2.0	2.1	1.9	3.2	4.4	6.4	7.9	9.3	9.3
161	喉	—	—	0.7	0.9	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6
162	気 管 , 気 管 支 及 び 肺	—	—	1.0	1.3	2.8	4.8	6.3	7.3	7.5
170	骨 及 び 関 節 軟 骨	—	—	0.3	0.5	0.8	1.0	0.9	0.7	0.7
172, 173	皮 膚	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5
188, 189	泌 尿 器	—	—	0.7	0.9	1.1	1.5	1.6	1.7	1.6
188	膀 胱	—	—	0.5	—	—	1.0	1.0	1.1	1.0
189, 0, 189, 1	腎	—	—	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5
200-208	リンパ組織及び造血組織	—	—	—	2.4	3.6	4.4	5.1	5.5	5.4
204-208	白 血 病	1.4	1.3	1.1	1.5	2.3	2.9	3.2	3.4	3.3

注：1) 訂正死亡率の基準人口は昭和10年の性別人口である。

2) 表 5.24 の注：1) を参照されたい。

*55年は、「国勢調査確定数」により再計算したものである。(以下同様)

年齢・年次別死亡率(人口10万対) (つづき)

女(8-8) 35(B19-g)子 宮

年 齢	昭和25年	30年	35年	40年	45年	50年	53年	54年	*55年	56年	57年	58年	59年
総 数	19.7	16.0	14.9	13.4	12.2	10.7	9.8	9.6	9.2	9.0	8.6	8.5	8.2
0 ~ 4歳	0.0	0.0	0.0	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—
5 ~ 9	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 ~ 14	—	0.1	—	0.1	—	—	0.0	—	—	0.0	—	—	—
15 ~ 19	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	—	0.1	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0
20 ~ 24	0.8	0.5	0.8	0.6	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.2	0.1
25 ~ 29	3.0	2.3	2.3	1.7	1.2	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.4	0.2	0.3
30 ~ 34	8.8	5.1	4.5	3.8	2.6	1.7	1.2	1.3	1.1	1.1	1.4	1.2	1.0
35 ~ 39	23.5	12.4	9.9	7.3	5.6	2.9	3.1	2.7	2.2	2.8	1.8	1.9	2.0
40 ~ 44	43.8	27.0	19.0	13.7	12.0	7.1	5.7	5.0	4.7	4.2	4.1	3.3	3.5
45 ~ 49	62.7	43.7	34.5	23.5	19.6	14.8	11.5	10.3	9.5	8.8	7.4	7.5	6.8
50 ~ 54	76.8	58.8	46.9	36.5	26.7	22.1	17.9	16.5	14.9	15.2	14.3	13.9	11.6
55 ~ 59	80.3	65.6	55.7	46.6	37.1	28.7	22.8	22.0	21.0	19.8	18.5	18.4	17.0
60 ~ 64	84.1	70.2	64.7	57.0	49.6	36.9	31.4	31.1	27.8	24.2	23.0	20.9	19.9
65 ~ 69	85.5	71.9	68.0	63.3	53.1	47.5	38.9	37.3	35.7	31.8	30.0	29.3	27.5
70 ~ 74	72.2	79.9	71.9	65.5	61.6	57.0	47.4	46.1	43.8	41.9	38.6	39.5	35.9
75 ~ 79	53.6	65.8	71.6	70.2	61.5	59.5	52.4	61.1	54.2	50.9	51.1	46.3	47.3
80 ~	44.2	47.2	49.4	57.0	55.4	55.1	61.9	57.1	60.7	63.3	58.8	56.9	55.5

1)
年次別訂正死亡率(人口10万対)

総 数(つづき)

47年	48年	49年	50年	51年	52年	53年	54年	*55年	56年	57年	58年	59年
85.9	84.8	84.1	82.6	82.8	82.5	82.3	82.8	82.7	82.3	81.1	81.2	81.2
0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
49.2	48.7	48.0	46.2	45.9	45.3	44.4	50.6	50.2	49.7	48.8	48.7	48.5
3.2	3.2	3.1	2.9	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.7	2.7	2.7	2.6
33.0	32.1	31.0	29.5	28.7	27.7	26.5	26.1	25.1	24.2	22.8	22.3	21.7
3.1	3.3	3.4	3.4	3.6	3.7	3.9	3.9	4.1	4.3	4.4	4.5	4.7
2.9	3.1	3.2	3.3	3.5	3.5	3.8	3.7	3.9	4.1	4.2	4.3	4.5
3.3	3.5	3.6	3.4	3.4	3.4	3.4	3.5	3.4	3.5	3.3	3.4	3.4
6.5	6.5	6.3	6.4	6.7	6.8	7.2	7.4	7.5	7.7	8.0	8.3	8.5
2.4	2.5	2.5	2.6	2.8	2.9	3.0	3.0	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6
3.3	3.3	3.4	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	4.0	4.0	4.1	4.2	4.1
9.8	9.8	10.0	10.2	10.5	10.8	11.1	11.2	11.5	11.7	11.9	12.1	12.4
0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
8.1	8.1	8.3	8.6	9.0	9.4	9.7	10.1	10.4	10.7	10.9	11.2	11.5
0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3
0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.9	1.8	1.9	1.9	1.9
1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9
0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9
5.8	5.7	5.7	5.9	6.0	6.1	5.9	5.9	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
3.4	3.4	3.4	3.4	3.5	3.5	3.3	3.3	3.3	3.3	3.2	3.2	3.2