

〔出産時の体重別にみた周産期死亡〕

表 8.4 性・体重別にみた妊娠満28週以後の死産—早期新生児死亡別周産期死亡数・率（性・体重別出生千対）及び百分率

昭和 58 年										
	総 数	1.0Kg 未 満	1.0~1.5	1.5~2.0	2.0~2.5	2.5~3.0	3.0~3.5	3.5~4.0	4.0Kg 以 上	(再掲) 2.5Kg 以 下
周 産 期 死 亡 数 ¹⁾										
総 数	14 035	2 324	2 528	2 277	2 020	2 119	1 747	665	244	9 254
男	7 558	1 139	1 358	1 236	1 094	1 143	988	407	139	4 884
女	6 368	1 136	1 151	1 022	917	972	757	257	104	4 272
妊娠満28週以後の死産	9 464	1 333	1 825	1 650	1 452	1 463	1 103	439	176	6 335
男	4 966	640	927	878	765	763	606	278	100	3 248
女	4 389	644	879	753	678	696	495	160	75	2 989
早期新生児死亡	4 571	991	703	627	568	656	644	226	68	2 919
男	2 592	499	431	358	329	380	382	129	39	1 636
女	1 979	492	272	269	239	276	262	97	29	1 283
周 産 期 死 亡 率 ²⁾										
総 数	9.3	112.5	549.7	184.6	32.6	5.3	2.5	2.4	5.8	107.8
男	9.7	115.3	569.4	194.3	38.0	6.3	2.7	2.5	5.2	120.1
女	8.7	102.9	519.9	171.1	27.7	4.4	2.2	2.2	6.8	94.6
妊娠満28週以後の死産比	6.3	638.1	396.8	133.8	23.4	3.6	1.6	1.6	4.2	73.8
男	6.4	649.7	388.7	138.0	26.6	4.2	1.7	1.7	3.8	79.9
女	6.0	583.3	397.0	126.1	20.4	3.2	1.5	1.4	4.9	66.2
早期新生児死亡率	3.0	474.4	152.9	50.8	9.2	1.6	0.9	0.8	1.6	34.0
男	3.3	506.6	180.7	56.3	11.4	2.1	1.1	0.8	1.5	40.2
女	2.7	445.7	122.9	45.0	7.2	1.3	0.8	0.8	1.9	28.4
百 分 率 ³⁾										
総 数	100.0	16.7	18.2	16.4	14.5	15.2	12.5	4.8	1.8	66.5
男	100.0	15.2	18.1	16.5	14.6	15.2	13.2	5.4	1.9	65.1
女	100.0	18.0	18.2	16.2	14.5	15.4	12.0	4.1	1.6	67.6
妊娠満28週以後の死産	100.0	14.1	19.3	17.5	15.4	15.5	11.7	4.6	1.9	67.1
男	100.0	12.9	18.7	17.7	15.4	15.4	12.2	5.6	2.0	65.5
女	100.0	14.7	20.1	17.2	15.5	15.9	11.3	3.7	1.7	68.2
早期新生児死亡	100.0	22.1	15.7	14.0	12.7	14.6	14.4	5.0	1.5	65.1
男	100.0	19.6	16.9	14.1	12.9	14.9	15.0	5.1	1.5	64.2
女	100.0	25.4	14.0	13.9	12.3	14.3	13.5	5.0	1.5	66.3

注：1) 性・体重ともに不詳を含む。

2) 周産期死亡率 = $\frac{\text{年間の性・体重階級別周産期死亡数}}{\text{年間の性・体重階級別出生数}} \times 1000$

3) 体重不詳を除き算出した。

〔母の年齢（5歳階級）別にみた周産期死亡〕

表 8.5 母の年齢別にみた性・妊娠満28週以後の死産—早期新生児死亡別周産期死亡数及び率（母の年齢・性別出生千対）

昭和 58 年									
母の年齢	総 数			妊娠満28週以後の死産			早期新生児死亡		
	総 数 ¹⁾	男	女	総 数 ¹⁾	男	女	総 数	男	女
周 産 期 死 亡 数									
総 数 ¹⁾	14 035	7 558	6 368	9 464	4 966	4 389	4 571	2 592	1 979
～19歳	282	141	141	194	88	106	88	53	35
20～24	2 519	1 398	1 105	1 675	907	752	844	491	353
25～29	5 897	3 183	2 667	3 977	2 056	1 874	1 920	1 127	793
30～34	3 779	2 014	1 733	2 530	1 326	1 172	1 249	688	561
35～39	1 204	642	550	852	471	369	352	171	181
40～44	289	145	143	220	110	109	69	35	34
45～	12	6	6	10	6	4	2	—	2
周 産 期 死 亡 率									
総 数	9.3	9.7	8.7	6.3	6.4	6.0	3.0	3.3	2.7
～19歳	15.4	14.9	16.0	10.6	9.3	12.0	4.8	5.6	4.0
20～24	9.2	9.9	8.2	6.1	6.4	5.6	3.1	3.5	2.6
25～29	8.1	8.5	7.5	5.5	5.5	5.3	2.6	3.0	2.2
30～34	9.4	9.7	8.9	6.3	6.4	6.0	3.1	3.3	2.9
35～39	15.5	16.1	14.5	11.0	11.8	9.8	4.5	4.3	4.8
40～44	35.6	34.5	36.6	27.1	26.2	27.9	8.5	8.3	8.7
45～	48.6	44.8	53.1	40.5	44.8	35.4	8.1	—	17.7

注：1) 性・年齢ともに不詳を含む。

〔単産—複産・出産順位別にみた周産期死亡〕

表 8.6 単産—複産・出産順位¹⁾別にみた妊娠満28週以後の死産—早期新生児死亡別周産期死亡数及び率（単産—複産・出産順位別出生千対）

昭和 58 年									
出産順位	総 数			妊娠満28週以後の死産			早期新生児死亡		
	総 数 ²⁾	単 産	複 産	総 数 ²⁾	単 産	複 産	総 数	単 産	複 産
周 産 期 死 亡 数									
総 数 ²⁾	14 035	13 080	955	9 464	8 837	627	4 571	4 243	328
第1児	6 090	5 935	155	4 199	4 104	95	1 891	1 831	60
2	4 615	4 210	405	2 880	2 605	275	1 735	1 605	130
3	2 233	1 971	262	1 547	1 376	171	686	595	91
4	687	600	87	521	462	59	166	138	28
5～	410	364	46	317	290	27	93	74	19
周 産 期 死 亡 率									
総 数	9.3	8.8	50.8	6.3	5.9	33.4	3.0	2.8	17.5
第1児	9.5	9.3	40.9	6.5	6.4	25.0	2.9	2.9	15.8
2	7.9	7.3	52.7	4.9	4.5	35.8	3.0	2.8	16.9
3	9.6	8.7	51.0	6.7	6.1	33.3	3.0	2.6	17.7
4	19.3	17.7	50.1	14.6	13.6	34.0	4.7	4.1	16.1
5～	40.0	37.1	104.5	31.0	29.6	61.4	9.1	7.6	43.2

注：1) 出産順位の児数は、同じ母の出産した児の数であって妊娠満20週以後の死産胎を含む。

2) 総数には出産順位不詳を含む。