

〔出産時の体重別にみた周産期死亡〕

表 8.4 性・体重別にみた妊娠満28週以後の死産—早期新生児死亡別周産期死亡数・率(性・体重別出生千対)及び百分率

昭和57年

	総 数	1.0 Kg 未 満	1.0~1.5	1.5~2.0	2.0~2.5	2.5~3.0	3.0~3.5	3.5~4.0	4.0 Kg 以 上	(再掲) 2.5 Kg 以 下
周 産 期 死 亡 数 ¹⁾										
総 数	15 303	2 341	2 769	2 477	2 250	2 304	1 951	807	262	9 966
男	8 378	1 174	1 514	1 381	1 237	1 276	1 085	487	154	5 379
女	6 781	1 114	1 232	1 068	997	1 018	865	319	108	4 465
妊娠満28週以後の死産	10 236	1 384	1 919	1 748	1 608	1 571	1 252	524	186	6 751
男	5 432	671	1 001	946	850	856	677	306	109	3 518
女	4 660	660	895	774	742	705	574	217	77	3 111
早 期 新 生 児 死 亡	5 067	957	850	729	642	733	699	283	76	3 215
男	2 946	503	513	435	387	420	408	181	45	1 861
女	2 121	454	337	294	255	313	291	102	31	1 354
周 産 期 死 亡 率 ²⁾										
総 数	10.1	1 255.9	615.2	204.7	37.2	5.8	2.8	2.8	5.9	118.1
男	10.8	1 313.2	641.8	224.7	43.8	7.1	3.0	2.9	5.5	134.2
女	9.2	1 148.5	575.2	179.3	30.9	4.7	2.5	2.6	6.7	100.9
妊娠満28週以後の死産比	6.8	742.5	426.3	144.4	26.6	4.0	1.8	1.8	4.2	80.0
男	7.0	750.6	424.3	153.9	30.1	4.8	1.9	1.8	3.9	87.7
女	6.3	680.4	417.8	129.9	23.0	3.3	1.7	1.8	4.8	70.3
早 期 新 生 児 死 亡 率	3.3	513.4	188.8	60.2	10.6	1.9	1.0	1.0	1.7	38.1
男	3.8	562.6	217.5	70.8	13.7	2.4	1.1	1.1	1.6	46.4
女	2.9	468.0	157.3	49.4	7.9	1.4	0.8	0.8	1.9	30.6
百 分 率 ³⁾										
総 数	100.0	15.4	18.3	16.3	14.8	15.2	12.9	5.3	1.7	65.7
男	100.0	14.1	18.2	16.6	14.9	15.4	13.1	5.9	1.9	64.7
女	100.0	16.6	18.3	15.9	14.8	15.1	12.9	4.7	1.6	66.4
妊娠満28週以後の死産	100.0	13.6	18.8	17.2	15.8	15.4	12.3	5.1	1.8	66.2
男	100.0	12.4	18.5	17.5	15.7	15.8	12.5	5.6	2.0	65.0
女	100.0	14.2	19.3	16.7	16.0	15.2	12.4	4.7	1.7	67.0
早 期 新 生 児 死 亡	100.0	19.3	17.1	14.7	12.9	14.8	14.1	5.7	1.5	64.7
男	100.0	17.4	17.7	15.0	13.4	14.5	14.1	6.3	1.6	64.3
女	100.0	21.9	16.2	14.2	12.3	15.1	14.0	4.9	1.5	65.2

注：1) 性・体重ともに不詳を含む。

2) 周産期死亡率 = $\frac{\text{年間の性・体重階級別周産期死亡数}}{\text{年間の性・体重階級別出生数}} \times 1000$

3) 体重不詳を除き算出した。

〔母の年齢(5歳階級)別にみた周産期死亡〕

表 8.5 母の年齢別にみた性・妊娠満28週以後の死産—早期新生児死亡別周産期死亡数及び率(母の年齢・性別出生千対)

昭和57年

母の年齢	総 数			妊娠満28週以後の死産			早期新生児死亡		
	総 数 ¹⁾	男	女	総 数 ¹⁾	男	女	総 数	男	女
周産期死亡数									
総 数 ¹⁾	15 303	8 378	6 781	10 236	5 432	4 660	5 067	2 946	2 121
～19歳	314	174	137	204	115	86	110	59	51
20～24	2 668	1 477	1 175	1 749	953	780	919	524	395
25～29	6 575	3 569	2 939	4 376	2 304	2 005	2 199	1 265	934
30～34	4 168	2 314	1 810	2 814	1 482	1 288	1 354	832	522
35～39	1 196	634	555	825	436	382	371	198	173
40～44	324	179	139	242	127	109	82	52	30
45～	18	10	8	15	8	7	3	2	1
周産期死亡率									
総 数	10.1	10.8	9.2	6.8	7.0	6.3	3.3	3.8	2.9
～19歳	18.8	20.0	17.1	12.2	13.2	10.7	6.6	6.8	6.4
20～24	9.7	10.4	8.8	6.3	6.7	5.8	3.3	3.7	2.9
25～29	8.8	9.3	8.1	5.9	6.0	5.5	3.0	3.3	2.6
30～34	10.3	11.2	9.2	7.0	7.2	6.5	3.4	4.0	2.6
35～39	18.4	19.0	17.5	12.7	13.0	12.0	5.7	5.9	5.5
40～44	41.7	44.9	36.7	31.1	31.9	28.8	10.6	13.0	7.9
45～	67.2	64.5	70.8	56.0	51.6	61.9	11.2	12.9	8.8

注：1) 性・年齢ともに不詳を含む。

〔単産—複産・出産順位別にみた周産期死亡〕

表 8.6 単産—複産・出産順位¹⁾別にみた妊娠満28週以後の死産—早期新生児死亡別周産期死亡数及び率(単産—複産・出産順位別出生千対)

昭和57年

出産順位	総 数			妊娠満28週以後の死産			早期新生児死亡		
	総 数	単 産	複 産	総 数	単 産	複 産	総 数	単 産	複 産
周産期死亡数									
総 数 ²⁾	15 303	14 210	1 093	10 236	9 544	692	5 067	4 666	401
第1児	6 585	6 388	197	4 459	4 343	116	2 126	2 045	81
2	5 059	4 604	455	3 189	2 911	278	1 870	1 693	177
3	2 436	2 154	282	1 702	1 512	190	734	642	92
4	770	647	123	545	459	86	225	188	37
5～	453	417	36	341	319	22	112	98	14
周産期死亡率									
総 数	10.1	9.5	57.5	6.8	6.4	36.4	3.3	3.1	21.1
第1児	10.2	10.0	50.7	6.9	6.8	29.8	3.3	3.2	20.8
2	8.5	7.8	58.4	5.3	4.9	35.7	3.1	2.9	22.7
3	10.6	9.6	54.7	7.4	6.7	36.9	3.2	2.9	17.9
4	22.3	19.7	71.2	15.8	14.0	49.8	6.5	5.7	21.4
5～	43.4	41.7	82.6	32.6	31.9	50.5	10.7	9.8	32.1

注：1) 出産順位の児数は、同じ母の出産した児の数であって妊娠満28週以後の死産胎を含む。

2) 総数には出産順位不詳を含む。